

Katalog der aus dem paläarktischen Faunengebiet beschriebenen Säugetiere (einschließlich der Grenzformen).

Von
Dr. W. Kobelt.

Als Desideratenverzeichnis herausgegeben
von der
Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft.
1896.

(Die **fettgedruckten** Arten sind in der Sammlung vorhanden).

Erste Ordnung: Simiae.¹⁾

Familie Simiidae.

Unterfamilie Cercopithecinae.

Gattung *Semnopithecus* Cuv.

- schistaceus* Hodgs. (*petrophilus*
Hodgs., *nepalensis* Hodgs.) Nepal.
roxellanae M.-E. Mupin.

Gattung *Macacus* Lacép.

- lasiotus* Gray Szé-tschuün, China.
tcheliensis M.-E. Tsche-li, China.
pelops Hodgs. Nepal.
thibetanus M.-E. Mupin.

¹⁾ Diese wie die fünf ersten Ordnungen überhaupt im Anschluß an die Kataloge von Dr. L. Trouessart bearbeitet.

Gattung **Pithecius** Blainv.*Inuus* Geoffr.*speciosus* F. Cuv. Japan.*sylvanus* L. (*caudatus* Geoffr.) Algerien, Marokko, Gibraltar.

Zweite Ordnung: Chiroptera.

Erste Abteilung: Megachiroptera.

Familie Pteropodidae.

Gattung **Cynopterus** Cuv.*Cynonycteris* Ptrs., *Xantharpyia* Fitz.*aegyptiacus* Geoffr. . . . Ägypten, Syrien.*geoffroyi* Temm. . . . Palästina.

Zweite Abteilung: Microchiroptera.

Familie Rhinolophidae.

Gattung **Rhinolophus** E. Geoffroy.*curiale* Blas. . . . Mittelmeerländer, Kleinasien.*blasii* Ptrs. (*clivosus* Blas. nec*Crschm.*) Südeuropa, Nordafrika, Klein-
asien; nördlich bis Istrien.*hipposideros* Bchst. (*hippocrepis*Herm., *trihastatus* Geoffr.) . . Europa, Vorderasien.*ferrum equinum* Schreb. (*uni-**hastatus* Geoffr.) . . . Mittel- und Südeuropa.*tragatus* Hodgs. . . . Nepal, Indien.*fumigatus* Rüpp. . . . Ägypten, Nordostafrika.*nippon* Temm. . . . Japan.Gattung **Triaenops** Dobs.*persicus* Dobs. . . . Schiras.Gattung **Phyllorhina** Bp.*tridens* Geoffr. . . . Ägypten.

Familie Nycteridae.

Gattung **Nycteris** Geoffr.*hispida* (Schreb.) Ptrs. . . . Ägypten, ganz Afrika.*thebaica* Geoffr. . . . Ägypten.*albiventer* A. Wagn. . . . Ägypten.

Familie Emballonuridae.

Gattung Rhinopoma E. Geoffroy.

- microphyllum* E. Geoffroy . . . Ägypten, Kordofan, Nordostafrika.
hardwickei Gray Palästina, Vorder- u. Hinterindien, Südchina.

Gattung Taphozous E. Geoffroy.

(*Saccolaimus* Fitz.)

- nudiventris* Crschm. Vorderasien, Ägypten, Nordostafrika.

Gattung Nyctinomus E. Geoffroy.

- cestonii* Savi Südeuropa, Nordafrika.
nigrogriseus Schneid. Schweiz.
rüppelli Temm. Ägypten, Nordostafrika.
aegyptiacus E. Geoffroy Ägypten, Nordostafrika.
pumilus Crschm. Ägypten, Afrika.

Familie Vespertilionidae.

Gattung Synotus Keys. Bl.

- barbastellus* Schreb. (*daubentonii* Bell, *communis* Gray) Süd- und Mitteleuropa bis Südschweden, Nordafrika, Abessynien.
darjelingensis Hodgs. Yarkand, Vorderindien.

Gattung Plecotus Geöffr.

- auritus* L. Ganzes Gebiet.
otus Boie (*cornutus* Faber) . . Jütland.
brerimanus Jenyns England.
bonapartei Gray (nec Savi) . . Mittelmeerländer.
peroni Is. Geöffr. Mittelmeerländer.
aegyptiacus Is. Geöffr. . . . Ägypten, Nordostafrika.
christi Gray Palästina.
leucophaeus Severtz. Turkestan, Persien.
haemochrous Hodgs. Nepal.

Gattung *Otonycteris* Ptrs.

hemprichi Ptrs. Ägypten, Transkaspien.

Gattung *Vesperugo* Keys. Bl.

serotinus Schreb. (*noctula* E.)

Geoffroy)	Europa, Asien, Afrika und Nord- und Mittelamerika.
<i>isabellinus</i> Temm.	Europa.
<i>turcomanus</i> Eversm.	Centralasien.
<i>mirza</i> Fil. (<i>bottae</i> Ptrs.)	Persien.
<i>schiraziensis</i> Dobs.	Persien.
<i>borealis</i> Nilss.	Nord- und Mitteleuropa.
<i>kuhl</i> Nilss. nec Natt.	Sibirien, Rußland.
<i>discolor</i> Natt.	Ganzes Gebiet.
<i>aristippe</i> Bp.	Italien.
<i>leucippe</i> Bp.	Italien, Mittelmerländer.
<i>noctula</i> Schreb.	Ganzes Gebiet.
<i>leisleri</i> Kuhl (<i>pachygnathus</i> Michah.)	Mitteleuropa, Mittelasien.
<i>maurus</i> Blas.	Südeuropa.
<i>savii</i> Bp. (<i>bonapartei</i> Savi)	Italien.
<i>darwini</i> Tomes	Kanarien.
<i>pulverulentus</i> Ptrs.	China.
? <i>krascheninikowi</i> Eversm.	Ural, Nordostasien.
<i>pipistrellus</i> Schreb.	Europa, Nordafrika.
- <i>brachyotus</i> Baillon	Nordfrankreich.
<i>nigricans</i> Géné	Südfrankreich.
<i>ursula</i> A. Wagn.	Nordafrika, Ägypten.
<i>griseus</i> (<i>Kerivoula</i>) Gray	Nordafrika, Ägypten.
<i>ubramus</i> Temm. (<i>pipistrelloides</i> Kuhl)	Europa und Asien bis Hinterindien.
<i>nathusii</i> Keys. Blas.	Italien.
<i>blythi</i> A. Wagn.	Innerasien.
<i>fuliginosus</i> Hodgs.	Nepal, Himalaya.
<i>micropus</i> Hutt.	Persien.
? <i>akokomuli</i> Temm.	Japan.
<i>kuhl</i> Natt. (<i>pipistrellus</i> Bp.)	Mittelmerländer, Vorderasien.
<i>aleythoë</i> Bp.	Süditalien.
<i>marginatus</i> Rüpp.	Nordafrika.

<i>canus</i> Blyth	Vorderasien.
<i>maderensis</i> Dobs.	Madera, Kanaren.
<i>temminckii</i> Crschm. (<i>rippelli</i> Fischer)	Nordostafrika, Ägypten.
<i>schliefeni</i> Ptrs.	Ägypten, Nordostafrika.

?Gattung Amblyotus Kol.

<i>atratus</i> Kol.	Sudeten.
-----------------------------	----------

Gattung Scotophilus Dobs.

<i>fulvus</i> Horsf.	Afghanistan.
------------------------------	--------------

Gattung Vespertilio L.

<i>capaccinii</i> Bp.	Südeuropa.
<i>longipes</i> Dobs.	Kaschmir.
<i>dasyeneme</i> Boie (<i>limnophilus</i> Temm.)	Europa, Südsibirien.
<i>daubentonii</i> Leisl.	Ganzes Gebiet.
<i>daridii</i> Ptrs.	Peking.
<i>emarginatus</i> Geoffr.	Mittel- und Südeuropa.
<i>ciliatus</i> Blas.	Italien, Galizien.
<i>desertorum</i> Dobs.	Belutschistan.
<i>nattereri</i> Kuhl	Mitteleuropa.
<i>bechsteini</i> Leisl.	Mittel- und Südeuropa.
<i>murinus</i> Schreb. (<i>myotis</i> Belst.)	Ganzes Gebiet.
<i>chinensis</i> Tomes	China.
<i>formosus</i> Hodgs.	China bis Himalaya.
<i>mystacinus</i> Leisl.	Europa, Nord- und Mittelasien.
<i>collaris</i> Meissner	Deutschland.
<i>schinzi</i> Brehm	Sachsen.
<i>uigricans</i> Fatio	Schweiz.
<i>humeralis</i> Baill.	Nordfrankreich.
<i>brandti</i> Eversm.	Sibirien.
<i>siligorensis</i> Hodgs.	Nepal, Himalaya.
<i>muricola</i> Hodgs.	Nepal, Himalaya.
<i>moupinensis</i> M.-E.	Mupin.

Gattung Miniopterus Bp.

<i>schreibersi</i> Natt.	Südeuropa, Vorderasien.
<i>ursinii</i> Bp.	Mittelmeirländer.
<i>blepotis</i> Temm.	Ostasien.

Dritte Ordnung: Insectivora.

Familie Tupaiidae.

Gattung *Tupaia* Raffl.

chinensis Anderss. West-Yünnan.

Familie Macroscelidae.

Gattung *Macroscelides* A. Sm.

rozeti Duvern. Nordafrika.

Familie Erinaceidae.

Gattung *Erinaceus* L.

<i>europaeus</i> L.	Europa, Vorderasien.
<i>sibiricus</i> Erxl.	Ural, Sibirien.
<i>concolor</i> Martin.	Kleinasien.
<i>auritus</i> Pall.	Südrußland, Vorder- und Centralasien.
<i>hypomelas</i> Brdt.	Daurien, Turkestan.
<i>pectoralis</i> Hgl.	Sinaihalbinsel, Nordost-ägypten.
<i>megalotis</i> Blyth	Afghanistan.
<i>platyotis</i> Sund. (<i>aethiopicus</i> var.)	Ägypten.
<i>libycus</i> Ehrbg.	Nordägypten, Arabien.
<i>aegyptius</i> E. Geoffroy	Nordägypten.
<i>algirus</i> Duvern.	Algerien.
<i>deserti</i> Loche	Nördliche Sahara.
<i>macracanthus</i> Blanf.	Persien, Karamanien.
<i>niger</i> Blanf.	Südarabien.
<i>dealbatus</i> Swinh.	Nordchina.
<i>albulus</i> Stol.	Yarkand.
<i>pruneri</i> A. Wagn.	Ägypten, Kordofan, Sennaar.

Familie Soricidae.

Gattung *Crocidura* Wagl.

<i>crassicauda</i> Ehrbg. (<i>caeruleoceans</i> Shaw var.)	Palästina, Ägypten, Arabien.
<i>duvernoyi</i> Fitz.	Oberägypten.

<i>murina</i> Schreb. (<i>myosurus</i> Pall.)	China.
<i>temminckii</i> Fitz.	Japan.
<i>griffithi</i> Horsf.	Afghanistan.
<i>etrusca</i> Savi	Mittelmeerländer.
<i>agilis</i> Loche	Nordafrika.
<i>lasiura</i> Dobs.	Amurland.
? <i>servicea</i> Hedenb.	Oberägypten.
<i>dzi-neznini</i> Temm.	Japan.
<i>umbrina</i> Temm.	Japan.
<i>attenuata</i> M.-E.	Mupin.
<i>leucodon</i> Herm. (<i>micrurus</i> Fatio)	Ganzes Gebiet.
<i>chrysotorax</i> Dehne	Deutschland.
<i>hydruntina</i> Costa	Süditalien.
? <i>güldenstädtii</i> Pall.	Transkaukasien.
? <i>pusilla</i> Gmel.	Nordpersien.
<i>araneus</i> Schreb.	Ganzes Gebiet.
<i>thoracica</i> (Savi) Bp.	Italien.
<i>pachynurus</i> Küst.	Sardinia.
<i>mauritanica</i> Pomel	Nordafrika.
<i>fumigata</i> Fil.	Transkaukasien, Persien.
<i>suareolens</i> Pall.	Südrußland, Krim.

Gattung Nectogale M.-E.

<i>elegans</i> M.-E.	Mupin.
----------------------	--------

Gattung Diplomesodon Brdt.

<i>pulchellus</i> Leht.	Südostrußland, Centralasien.
-------------------------	------------------------------

Gattung Sorex L.

<i>alpinus</i> Schinz	Pyrenäen, Alpen, Karpathien?
	Apennin.
<i>antinorii</i> Bp.	Apennin.
<i>intermedius</i> Corn.	Lombardei.
<i>cylindricauda</i> M.-E.	Mupin.
<i>vulgaris</i> L. (<i>tetragonurus</i> Herm.)	Ganzes Gebiet.
<i>fodiens</i> Behst.	Deutschland.
<i>eremita</i> Behst.	Deutschland.
<i>cunicularia</i> Behst.	Deutschland.
<i>pallidus</i> Fitz.	Oesterreich.

<i>coronatus</i> Millet	Westfrankreich.
<i>concinnus</i> Wagl.	Bayern.
<i>rhinolophus</i> Wagl.	Bayern.
<i>eastaneus</i> Jenyns	England.
<i>labiosus</i> Jenyns	England.
<i>pygmaeus</i> Pall.	Nord- und Mitteleuropa, Sibirien.
<i>pumilus</i> Nilss.	Südschweden.
<i>rusticus</i> Jenyns	England.
<i>hibernicus</i> Jenyns	Irland.
<i>gmelini</i> Pall.	Südrussland.
<i>quadraticauda</i> M.-E.	Mupin.
<i>unguiculatus</i> Dobs.	Amurland, Sachalin.

Gattung *Crossopus* Wagl.

<i>fodiens</i> Pall. (<i>daubentonii</i> Erxl., <i>bicolor</i> Shaw, <i>hygrophilus</i> Pall.)	Ganzes Gebiet.
<i>carinatus</i> Herm.	Elsaß.
<i>remifer</i> E. Geoffroy	Nordfrankreich, Belgien, Deutschland.
<i>ciliatus</i> Sow.	Westeuropa.

Gattung *Anurosorex* M.-E.

<i>squamipes</i> M.-E.	Mupin, Setchuan.
--------------------------------	------------------

Familie Talpi ae.

Gattung *Uropsilus* M.-E.

<i>soricipes</i> M.-E.	Mupin.
--------------------------------	--------

Gattung *Urotrichus* Temm.

<i>talpooides</i> Temm.	Japan.
---------------------------------	--------

Gattung *Mygale* Cuv.

<i>moschata</i> (L.) Pall. (<i>muscovita</i> E. Geoffroy)	Don, Wolga, Ural, Central- asien.
<i>pyrenaica</i> E. Geoffroy	Pyrenäen, Nordspanien, Nordportugal.

Gattung Scaptonyx M.-E.

- fusicauda* M.-E. Westchina.

Gattung Seaptochirus M.-E.

- moschatus* M.-E. Mongolei, Nordwestchina.
davidianus M.-E. Akbès, Syrien.

Gattung Talpa L.

- longirostris* M.-E. Innerchina.
europaea L. Europa, Nordasien.
caeca Savi Südfrankreich, Italien, Syrien.
leptura Thomas China.
mizura Gthr. Japan.

Gattung Mogera Pomel.

- wogura* Temm. Japan, Amurländer.
robusta Nehring Südostsibirien.

Vierte Ordnung: Nager, Rodentia.**Erste Abteilung: Glires.****Familie Sciuridae.****Gattung Pteromys Cuv.**

- volans* L. (*Sciuropterus*) . . . Nordeuropa, Nordasien.
russicus Tiedem. Europäisches Russland.
sibericus Desm. Sibirien.
momoga Temm. Japan.

Gattung Sciurus L.

- lis* Temm. Japan.
davidianus M.-E. Peking.
vulgaris L. Europa, Nordasien.
niger Erxl. Europa, Nordasien.
alpinus F. Cuv. Alpen, Pyrenäen.
italicus Bp. Italien, Griechenland.
calotus Hodgs. Sibirien, China.
varius Pall. Kamtschatka.
caucasicus Pall. Kaukasus.

<i>anomalus</i> Güldst.	Georgien.
? <i>persicus</i> Erxl.	Persien.
<i>historicus</i> Gray	Kleinasien.

Gattung Xerus Hempr. Ehrbg.

<i>getulus</i> L.	Marokko, Algerien?
<i>trivittatus</i> Gray	Mogador.
<i>syriacus</i> Hempr. et Ehrbg.	Vorderasien.
<i>russatus</i> A. Wagn.	Palästina.
<i>fulvus</i> Blanf.	Persien.

Gattung Tamias III.

<i>asiaticus</i> Gmel. (<i>striatus</i> Pall.)	.	.	Nordschweden, Nordrußland,
nec L., <i>pallasi</i> Baird)	.	.	Sibirien, Japan, Nordamerika.
<i>uthensis</i> Pall.	.	.	Ostsibirien.

Gattung Spermophilus F. Cuv.

<i>empetra</i> (Pall.) Schreb.	.	.	Sibirien.
<i>phaeognathus</i> Rich.	.	.	Asiatisches Ufer der Beringsstraße.
<i>kennicoti</i> Roos	.	.	? Kamtschatka.
<i>eversmanni</i> Brdt. (<i>altaicus</i> Eversm.)	.	.	Sibirien.
<i>citillus</i> L. (<i>germanicus</i> Briss.)	.	.	Osteuropa von Böhmen und Schlesien ab, Sibirien.
<i>undulatus</i> Temm.	.	.	"
<i>flavescens</i> Pall.	.	.	"
<i>guttatus</i> (Pall.) Temm.	.	.	Südrußland, Sibirien bis zur Lena.
<i>leucostictus</i> Brdt.	.	.	Westsibirien.
<i>dauricus</i> Brdt.	.	.	Daurien.
<i>fulvus</i> Leht.	.	.	Südrußland, Sibirien, Centralasien.
<i>turcomanus</i> Eichw.	.	.	Transkaspien.
<i>concolor</i> Is. Geoffr.	.	.	Persien.
<i>leptolactylus</i> Leht.	.	.	Transkaspien.
<i>rufescens</i> Keys. Bl. (<i>undulatus</i> Eversm.)	.	.	Südural.

<i>erythrogenys</i> Brdt.	Altaigebiet.
<i>musicus</i> Ménétr.	Kaukasus, Georgien.
<i>xanthoprymnus</i> Benn.	Kleinasien, bis Turkestan.
<i>mugosaricus</i> Leicht. (<i>brericauda</i> Brdt.)	Südrussland bis Turkestan, Sibirien, Mongolei.
<i>intermedius</i> Brdt.	Sibirien.
<i>mongolicus</i> M.-E.	Mongolei.
<i>alaschanus</i> Przw.	Alaschan.
<i>obseurus</i> Przw.	Tibet.

Gattung Arctomys Schreb.

<i>marmotta</i> L.	Alpen, Tatra.
<i>hemachalanus</i> Jerdon	Tibet.
<i>aureus</i> Blanf.	Buchara.
<i>robustus</i> M.-E.	Mupin.
<i>bobac</i> Pall.	Asien bis zum Dniepr.
<i>baibacinus</i> Brdt.	Altai.
<i>himalayanus</i> Hodgs.	Himalaya bis Turkestan.
<i>tataricus</i> James.	Turkestan.
<i>dichrous</i> Anders.	Afghanistan.
<i>camtschaticus</i> Brdt.	Kamtschatka.

Familie Castoridae.**Gattung Castor L.**

<i>fiber</i> L.	Europa, Vorderasien, Sibirien, Nordamerika.
------------------------	-----------	--

Familie Myoxidae.**Gattung Myoxus Schreb.**

<i>glis</i> L.	Mitteleuropa bis zum Kau- kasus.
-----------------------	-----------	-------------------------------------

Gattung Muscardinus Kaup.

<i>arellanarius</i> L.	Mittel- und Südeuropa.
-------------------------------	-----------	------------------------

Gattung Eliomys A. Wagn.

<i>nitela</i> Pall. (<i>quercinus</i> L.)	. . .	Mitteleuropa.
<i>dryas</i> Schreb.	Osteuropa, Sibirien.
<i>nitidulus</i> Pall.	Kaukasus.

<i>pictus</i> Blanf.	.	.	.	Persien.
<i>elegans</i> Temm. (<i>lasiotis</i> Thom.)	.	.	.	Japan.
<i>melanurus</i> Wagn.	.	.	.	Palästina, Sinaihalbinsel.
<i>mumbyanus</i> Pomel	.	.	.	Algerien.

Gattung Bifa Lat.

<i>lerotina</i> Lat.	.	.	.	Algerische Sahara.
----------------------	---	---	---	--------------------

Familie Muridae.**Gattung Sminthus Keys. Bl.**

<i>vagus</i> L.	.	.	.	Osteuropa.
<i>betulinus</i> Pall.	.	.	.	Osteuropa.
<i>subtilis</i> Pall.	.	.	.	Osteuropa.
<i>lineatus</i> Leht. (<i>loriger</i> Nordm.)	.	.	.	Sibirien.

Gattung Gerbillus Desm.

<i>indicus</i> Hardw.	.	.	.	Vorderindien bis Syrien.
<i>taeniurus</i> Wagn.	.	.	.	Mesopotamien, Syrien.
<i>persicus</i> Blanf.	.	.	.	Persien.
<i>robustus</i> Rüpp. (nec Wagner neque Loche)	.	.	.	Ägypten, Nilgebiet.
<i>aegyptius</i> Desm. (<i>gerbillus</i> Oliv.)	.	.	.	Ägypten bis Senegambien.
<i>olivieri</i> Cuv.	.	.	.	Ägypten.
<i>dasypurus</i> Wagn.	.	.	.	Arabien, Somaliland.
<i>longicaudus</i> Wagn.	.	.	.	Ägypten.
<i>nanus</i> Blanf.	.	.	.	Belutschistan.
<i>selysi</i> Pomel	.	.	.	Algerische Sahara.
<i>guyoni</i> Loche	.	.	.	Algerische Sahara.
<i>richardi</i> Loche	.	.	.	Algerische Sahara.
<i>schousboei</i> Loche	.	.	.	Algerische Sahara.
<i>renaulti</i> Loche	.	.	.	Algerische Sahara.
<i>campestris</i> Loche	.	.	.	Algerische Sahara.
<i>deserti</i> Loche	.	.	.	Algerische Sahara.
<i>gerbei</i> Loche	.	.	.	Algerische Sahara.
<i>minutus</i> Loche (nec Blainv.)	.	.	.	Algerische Sahara.

Gattung Rhombomys Wagn.

(Meriones Brdt.).

<i>shawi</i> Duvern.	.	.	Nordafrika.
<i>opimus</i> Leht. (<i>pallidus</i> Wagn.)	.	.	Südostrußland, Transkaspien, Südsibirien.

<i>crassus</i> Sund.	Sibirien.
<i>crythrurus</i> Gray (nec Jerdon)	Kleinasien bis Afghanistan.
<i>hurianiae</i> Jerdon	Beludschistan, Vorderindien.
<i>tamaricinus</i> Pall. (nec Eversm.)	Südostrußland, Transkaspien.
<i>pyramidum</i> Geoffr.	Oberägypten, Nubien.
<i>meridianus</i> Pall.	Transkaspien.
<i>longipes</i> Pall.	Transkaspien.
<i>fulvus</i> Eversm.	Transkaspien.
<i>caucasicus</i> Brdt.	Kaukasus.
<i>unguiculatus</i> M.-E.	Nordchina, Mongolei.
<i>psammophilus</i> M.-E.	Nordchina, Mongolei.
<i>cryptorhinus</i> Blanf.	Turkestan.
<i>collum</i> Severtz.	Turkestan.
<i>melanurus</i> Rüpp. (<i>libycus</i> Lcht.)	Sinaihalbinsel, libysche Wüste.
<i>nitidus</i> Wagn.	Ägypten.
<i>longifrons</i> Lat.	Sahara.

Gattung Psammomys Crschm.

<i>obesus</i> Rüpp.	Nordafrika bis Ägypten.
<i>myosurus</i> Wagn.	Syrien.
<i>roudairei</i> Lat.	Sahara.

Gattung Pachyuromys Lat.

<i>duprasi</i> Lat.	Algerische Sahara.
---------------------	--------------------

Gattung Nesokia Gray.

<i>indica</i> var. <i>griffithi</i> Horsf.	Afghanistan, Indien.
<i>huttoni</i> Blyth	Afghanistan, Beludschistan, Indien.
<i>scullyi</i> W.-Mas.	Turkestan, Kaschgar.
<i>boettgeri</i> Radde Walt.	Transkaspien.
<i>brachyura</i> Przw.	Centralasien.

Gattung Cricetus Cuv.

<i>frumentarius</i> Pall. (<i>cricetus</i> L.,	
<i>vulgaris</i> Desm.)	Mitteleuropa vom Rhein bis zum Ob.
<i>arenarius</i> Pall.	Südrußland, Sibirien.
<i>songarus</i> Pall.	Südsibirien, Turkestan.

<i>eversmanni</i> Severtz.	West-Turkestan.
<i>aceedula</i> Pall.	Südostrußland.
<i>migratorius</i> Pall.	Erzerum?
<i>murinus</i> Pall.	Turkestan, Sarepta?
<i>nigricans</i> Brdt.	Südosteuropa, Balkanhalbinsel, Kleinasien, Kaukasus.

Gattung *Cricetulus* M.-E.

<i>phaeus</i> Pall. (<i>isabellinus</i> de Fil.)	Südrussland bis Turkestan.
<i>fulvus</i> Blanf.	Turkestan.
<i>furunculus</i> Pall.	Daurien.
<i>griseus</i> M.-E.	Mongolei.
<i>obscurus</i> M.-E.	Nordchina.
<i>longicaudatus</i> M.-E.	Nordchina.
<i>auratus</i> G. R. Waterh.	Aleppo.
? <i>fuscatus</i> Brdt.	?

Gattung *Mus* L.

<i>caraco</i> Pall.	Ostsibirien, Nordwestchina.
<i>decumanus</i> Pall.	Ganzes Gebiet.
<i>rattus</i> L.	Ganzes Gebiet.
<i>latipes</i> Benn.	Kleinasien.
<i>alexandrinus</i> Ehrbg.	Mittelmeerländer.
<i>tectorum</i> Savi	Italien, Südspanien.
<i>humiliatus</i> M.-E.	Nordchina.
<i>griseipictus</i> M.-E.	China.
<i>ouang-thomae</i> M.-E.	Mupin.
<i>variegatus</i> E. Geoffroy (<i>gigas</i> Gray)	Ägypten, Nilgebiet, Arabien.
<i>niloticus</i> E. Geoffroy	Ägypten.
<i>barbarus</i> L.	Nord- und Ostafrika.
<i>mystacinus</i> Danford	Kleinasien.
<i>chamaeropsis</i> Loche	Südalgerien.
<i>reboudi</i> Loche	Algerien.
<i>gentilis</i> Brants	Ägypten, Abessynien.
<i>nezumi</i> Temm.	Japan.
<i>molossinus</i> Temm.	Japan.
<i>plumbeus</i> M.-E.	Peking.
<i>musculus</i> L.	Ganze Erde.
<i>incertus</i> Savi	Italien.

<i>poschiavinus</i> Fatio	Puschlav.
<i>azoricus</i> Schinz	Azoren.
<i>algirus</i> Pomel	Algerien.
<i>hagi</i> G. R. Waterh.	Marocco.
<i>abbotti</i> G. R. Waterh.	Kleinasien.
<i>hortulanus</i> Nordm. (<i>nordmanni</i> Keys. Blas.)	Südrußland.
<i>argenteus</i> Temm.	Japan.
<i>sylvaticus</i> L.	Europa, Vorderasien.
<i>islandicus</i> Thien.	Island.
<i>erythronotus</i> Blanf.	Persien, Turkestan.
<i>bactrianus</i> Blyth	Vorderasien bis Indien.
<i>pachycercus</i> Blanf.	Turkestan.
<i>sublimis</i> Blanf.	Yarkand.
<i>confucianus</i> M.-E.	Mupin.
<i>chevrieri</i> M.-E.	Mupin.
<i>flavipectus</i> M.-E.	Mupin.
<i>praetextus</i> Brants	Syrien, Palästina, Arabien.
<i>orientalis</i> Crschm.	Ägypten, Nilgebiet, Arabien.
<i>wagneri</i> Eversm.	Turkestan bis zur Wolga.
<i>agrarius</i> Pall.	Mitteleuropa.
<i>minutus</i> Pall.	Europa, Sibirien.
<i>pygmaeus</i> M.-E.	Mupin.
<i>spretus</i> Lat.	Algerien.

Gattung Acomys Is. Geoffr.

<i>cahirinus</i> E. Geoffroy	Ägypten, Nilgebiet.
<i>dimidiatus</i> Rüpp.	Ägypten, Nilgebiet.
<i>hispidus</i> Brants	Sinaihalbinsel.
<i>russatus</i> Wagner	Sinaihalbinsel.

Gattung Evotomys Coues.

(Hypudaeus Keys. Bl., nec Ill.)

<i>rutilus</i> Pall.	Nordeuropa, Nordasien, Nordamerika.
<i>glareolus</i> Schreb	Mitteleuropa.
<i>riparius</i> Yarr.	England.
<i>rubidus</i> Baillon	Nordostfrankreich.
<i>fulvus</i> Mill.	West- und Südfrankreich.

<i>rufescens</i> Selys	Belgien.
<i>hercynicus</i> Mehl.	Deutschland.
<i>russatus</i> Radde	Südostsibirien.
<i>nageri</i> Schinz	Schweiz.
<i>bicolor</i> Fatio	Schweiz.
<i>rufocaninus</i> Sund.	Nordsibirien, Lappland.

Gattung Arvicola Lacép.

(Hypudaeus Ill.)

amphibius L.	Europa, Nordasien.
<i>persicus</i> Fil.	Persien.
<i>paludosus</i> L. (ater Maeg.) . . .	Nordeuropa.
<i>pertinax</i> Savi	Norditalien.
<i>musignani</i> Mandr.	Südeuropa.
<i>terrestris</i> L.	Ganzes Gebiet.
<i>argentoratensis</i> Desm.	Elsaß, Jura.
monticola Selys	Pyrenäen.
<i>nivalis</i> Martin (<i>alpinus</i> Wagn., <i>nivicola</i> Schinz)	Alpen der Schweiz.
<i>lebruni</i> Cresp. (<i>leucurus</i> Gerbe)	Pyrenäen, Seealpen.
<i>petrophilus</i> Wagn.	Bayrische Alpen.
ratticeps Keys. Bl.	Nordeuropa, Sibirien.
<i>medius</i> Nilss.	Nordschweden.
<i>alliarinus</i> Pall.	Sibirien.
<i>macrotis</i> Radde	Sibirien.
<i>stoliczkanus</i> Blanf.	Turkestan.
<i>mandarinus</i> M.-E.	Nordchina.
<i>blythi</i> Blanf.	Turkestan.
<i>melanogaster</i> M.-E.	Tibet.
<i>montebelli</i> M.-E.	Japan.
<i>mongolicus</i> Radde	Mongolei.
<i>amurensis</i> Schrenck	Amurland.
<i>maximowiczi</i> Schrenck	Amurland.
agrestis L.	Europa, Sibirien.
<i>insularis</i> Nilss.	Gotland.
<i>neglectus</i> Jen. (<i>britannicus</i> Selys)	England, Schottland.
<i>campestris</i> Blas.	Deutschland.
arvalis Pall.	Mittel- und Südeuropa.
<i>arenicola</i> Selys	Belgien.

<i>rufescens-fuscus</i> Schinz	Alpen, Oberitalien.
<i>mystacinus</i> Fil.	Persien.
<i>saxatilis</i> Pall.	Ostsibirien.
<i>socialis</i> Pall.	Südrussland, Persien.
<i>astracanensis</i> Desm.	Astrachan.
<i>syriacus</i> Brants	Syrien.
<i>cineraceens</i> Wagn.	Syrien.
<i>gregalis</i> Pall.	Ostsibirien.
<i>güntneri</i> Danf. et All.	Kleinasien.
<i>obscurus</i> Eversm.	Sibirien.
<i>oeconomus</i> Pall.	Sibirien.
<i>nebrodensis</i> Mina	Madonien, Sicilien.
<i>subterraneus</i> Selys	Mitteleuropa.
<i>selysi</i> Gerbe	Südfrankreich.
<i>savii</i> Selys	Südfrankreich, Italien.
<i>gerbei de l'Isle</i>	Westfrankreich.
<i>pyrenaicus</i> Selys	Pyrenäen.
<i>incertus</i> Selys	Pyrenäen.
<i>ibericus</i> Gerbe	Spanien.
<i>lusitanicus</i> Gerbe	Portugal.
<i>tianschanicus</i> Przw.	Thianschan.
<i>brandti</i> Przw.	Centralasien.
<i>robustus</i> Przw.	Centralasien.
<i>strauchi</i> Przw.	Centralasien.

Gattung *Myodes* Pall.

<i>obensis</i> Brants	Polargebiet.
<i>migratorius</i> Leht.	Sibirien.
<i>brandti</i> Radde	Ostsibirien.
<i>luteus</i> Eversm.	Uralsteppe.
<i>lemnus</i> Pall.	Lappland.
<i>schisticolor</i> Lillj.	Lappland.

Gattung *Cuniculus* Wagl.

<i>torquatus</i> Pall.	Polargebiet.
<i>lenensis</i> Pall.	Sibirien an der Lena.
<i>lagurus</i> Pall.	Sibirien.

Gattung *Ellobius* Fischer.

<i>talpinus</i> Pall.	Orenburger Steppe, südl. Ural, Transkaspien.
--------------------------------------	---

- rufescens* Severtz. Turkestan.
tancrei Blas. Altai.

Gattung *Siphneus* Brants.

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <i>aspalax</i> Pall. | Südsibirien, Mongolei. |
| <i>dybowskii</i> Cherskey | Ostsibirien |
| <i>intermedius</i> Scully | Afghanistan. |
| <i>armandi</i> M.-E. | Mongolei, Nordwestchina. |
| <i>fontainieri</i> M.-E. | Peking, Nordchina. |
| <i>spilurus</i> M.-E. | Nordchina. |
| <i>fuscocephalus</i> Blyth | Afghanistan, Persien? |

Familie Spalacidae.

Gattung *Rhizomys* Gray.

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| <i>sinensis</i> Gray | Mittelchina. |
| <i>vestitus</i> M.-E. | Mupin. |

Gattung *Spalax* Güldst.

- | | |
|---------------------------------|---|
| <i>typhlus</i> Pall. | Südosteuropa, Balkanhalbinsel, Vorderasien. |
| <i>xanthodon</i> Nordm. | Kleinasien. |
| <i>pallasi</i> Nordm. | Syrien. |

Familie Dipodidae.

Gattung *Dipus* Gmel.

- | | |
|---|------------------------------------|
| <i>sagitta</i> Pall. (<i>orientalis</i> Erxl.) . . | Nordasien bis zur Wolga. |
| <i>proximus</i> Fairm. | Uralsteppe. |
| <i>lagopus</i> Leht. | Turkestan. |
| <i>aegyptius</i> Hasselq. | Nordafrika bis zur Sinaihalbinsel. |
| <i>gerboa</i> Ol. | Nordafrika. |
| <i>mauritanicus</i> Duv. | Nordafrika. |
| <i>deserti</i> Loche | Sahara. |
| <i>darricarreri</i> Lat. | Algerien. |
| <i>hirtipes</i> Leht. | Arabien, Ägypten. |
| <i>macrotarsus</i> Wagn. | Vorderasien. |
| <i>loftusi</i> Blanf. | Mesopotamien, Südpersien. |
| <i>telum</i> Leht. | Wolga, Transkaspien, Südsibirien. |

Gattung Alactaga F. Cuv.

<i>tetradactylus</i> Lcht.	Agypten, Libysche Wüste.
<i>jaculus</i> Pall. (<i>alactaga</i> Ol.)	Vom Don bis zum Altai.
<i>decumanus</i> Lcht.	Von der Wolga bis zum Amur.
<i>vexillarius</i> Eversm.	Transkaspien.
<i>aulacotis</i> Wagn.	Arabien.
<i>spiculum</i> Lcht.	Sibirien.
<i>annulatus</i> M.-E.	Mongolei.
<i>elater</i> Lcht.	Kirgisensteppe.
<i>saltator</i> Eversm.	Altai.
<i>aeontion</i> Pall. (<i>pygmaeus</i> Ill.)	. .	Sibirien.
<i>halticus</i> Illig.	Sibirien.
<i>indicus</i> Gray	Südpersien, Afghanistan.
<i>bactrianus</i> Blyth	Afghanistan.

Gattung Euchoreutes Schl.

<i>naso</i> Schl.	Yarkand.
-------------------	-----------	----------

Gattung Platyceromys Brdt.

<i>platyurus</i> Lcht.	Turkestan.
------------------------	-----------	------------

Familie Octodontidae.**Gattung Ctenodactylus Gray.**

<i>gundi</i> Pall. (<i>massonii</i> Gray)	. .	Nordafrika.
--	-----	-------------

Gattung Massoutieria Lat.

<i>mzabi</i> Lat.	Sahara.
-------------------	-----------	---------

Familie Hystricidae.**Gattung Hystrix L.**

<i>cristata</i> L.	Nordafrika, Süditalien, Vorderasien bis Transkaspien.
<i>leucurus</i> Sykes	Turkestan bis Indien.

Familie Lagomyidae.**Gattung Lagomys G. Cuv.**

<i>ogotona</i> Pall.	Ostsibirien.
<i>alpinus</i> Pall.	Sibirien, Kamtschatka.
<i>hyperboreus</i> Pall.	Tschuktschenland.

<i>pusillus</i> Pall.	Wolga bis Ob.
<i>nepalensis</i> Hodg.	Tibet.
<i>tibetanus</i> M.-E.	Mupin.
<i>ladacensis</i> Gthr.	Ladak, Ostturkestan.
<i>roylei</i> Ogilb.	Turkestan bis Nordindien.
<i>hodgsoni</i> Blyth	Afghanistan.
<i>auritus</i> Blanf.	Yarkand.
<i>macrotis</i> Gthr.	Turkestan.
<i>griseus</i> Blanf.	Kuenluen.
<i>rutilus</i> Severtz.	Turkestan.
<i>rufescens</i> Gray	Persien, Afghanistan.
<i>litoralis</i> Ptrs.	Tschuktschenland.
<i>erythrotis</i> Büchl.	Centralasien.
<i>dauricus</i> Büchn.	Daurien.
<i>melanostomus</i> Büchl.	Centralasien.
<i>rufus</i> Przw.	Centralasien.
<i>koslowi</i> Przw.	Centralasien.

Familie Leporidae.

Gattung *Lepus* L.

<i>variabilis</i> Pall.	Nordeuropa, arktisches Gebiet.
<i>canescens</i> Nilss.	Südschweden.
<i>hibernicus</i> Yarr.	Irland.
<i>alpinus</i> Schinz	Alpen, Pyrenäen.
<i>mandschuricus</i> Radde	Südostsibirien.
<i>brachyurus</i> Temm.	Japan.
<i>timidus</i> L.	Mittel- und Südeuropa.
<i>campicola</i> Schimp.	Italien.
<i>hybridus</i> Pall.	Astrachan.
<i>mediterraneus</i> Wagn.	Mittelmeerländer.
<i>meridionalis</i> Gerv.	Corsika.
<i>granatensis</i> Schimp.	Südspanien.
<i>judaeae</i> Gray	Palästina.
<i>craspedotis</i> Blanf.	Belutschistan.
<i>lehmanni</i> Severtz.	Turkestan.
<i>pamirensis</i> Gthr.	Pamir.
<i>yarkandensis</i> Gthr.	Yarkand.
<i>stoliczkanus</i> Blanf.	Turkestan.

<i>hypisbius</i> Blanf.	Turkestan.
<i>tibetanus</i> Waterh.	Tibet.
<i>tolai</i> Pall.	Südsibirien.
<i>oeostolus</i> Hodgs.	Nepal, Himalaya.
<i>pallipes</i> Hodgs.	Tibet, Turkestan.
<i>omanensis</i> Thomas	Arabien.
<i>ruficaudatus</i> Is. Geoffr. (<i>macrotis</i> Hodgs.)	Afghanistan, Vorderindien.
<i>sinensis</i> Gray	China.
<i>aegyptius</i> E. Geoffroy	Ägypten, Nubien.
<i>syriacus</i> Hempr. et Ehrbg.	Syrien, Kleinasien.
<i>sinaiticus</i> Hempr. et Ehrbg.	Sinaihalbinsel, Südpalästina.
<i>arabicus</i> Hempr. et Ehrbg.	Arabien.
<i>isabellinus</i> Crschm.	Sahara, Ägypten.
<i>pylzowi</i> Przw.	Tibet.

Gattung Cuniculus Gray.

<i>cuniculus</i> L.	Südeuropa, Nordafrika.
<i>algirus</i> Lereb.	Algerien.

Fünfte Ordnung: Carnivora.**Familie Ursidae.****Gattung Ursus L.**

<i>maritimus</i> (<i>Thalassiarctos</i>) L.	.	.	Polargebiet.
<i>arctus</i> L.	.	.	Europa, Nordasien, Nordamerika.
<i>pyrenaicus</i> Schinz	.	.	Pyrenäen, Nordspanien.
<i>collaris</i> Cuv.	.	.	Rußland.
<i>longirostris</i> Eversm. (<i>cadaverinus</i> Pall.)	.	.	Nordeuropa.
<i>syriacus</i> Ehrbg.	.	.	Libanon.
<i>thibetanus</i> G. Cuv.	.	.	Himalaya, Centralasien.
<i>gedrosianus</i> Blanf.	.	.	Belutschistan.
<i>isabellinus</i> Horsf.	.	.	Himalaya.
<i>pruinosus</i> Blanf.	.	.	Belutschistan.
<i>leuconyx</i> Severtz.	.	.	Turkestan.
<i>lagomyarius</i> Przw.	.	.	Tibet.
? <i>croatheri</i> Schinz	.	.	Atlas.

Gattung *Aeluropus* M.-E.

- melanoleucus* M.-E. Mupin.

Gattung *Aelurus* F. Cuv.

- fulgens* F. Cuv. Himalaya, Tibet.

Familie Mustelidae.

Gattung *Meles* Storr.

- taxus* Bodd. Europa, Nordafrika.
canescens Blanf. Vorderasien.
anakuma Temm. (*amurensis* Schrenck) Japan, Amurgebiet.
leucurus Hodgs. Peking bis Hinterindien, Tibet.
albogularis Blyth / *leucolaemus* M.-E. /
obscurus M.-E.). Mongolei, Südchina, Tibet.

Gattung *Zorilla* Is. Geoffr.

- libyca* Hempr. et Ehrbg. (*vaillanti* Loche) Nordafrika, Vorderasien, Nilgebiet bis Abessynien.

Gattung *Gulo* Storr.

- luscus* L. Polargebiet.

Gattung *Martes* Ray.

- abietum* Ray (*martes* L.) . . . Europa, Nordasien.
altaicus Pall. Südsibirien.
fagorum Ray (*foina* Briss.) . . Europa und Asien bis Südchina.
zibellina L. Sibirien, Amurland, Nordjapan.
flavigula Bodd. (*hardwickei* Horsf.) Tibet, Südchina.
melampus Temm. Japan.

Gattung *Vison* Gray.

- lutreola* L. Nordeuropa, Nord- u. Mittelasien, Nordamerika.
sibiricus Pall. Sibirien.

<i>mupinensis</i> M.-E.	.	.	.	Mupin.
<i>canigula</i> Hodgs.	.	.	.	Tibet.
<i>hodgsoni</i> Gray	.	.	.	Afghanistan.
<i>subhemachalanus</i> Hodgs.	.	.	.	Tibet. Nepal.
<i>itatsi</i> Temm.	.	.	.	Japan.
<i>davidianus</i> M.-E.	.	.	.	Kiengsi. China.

Gattung Foetorius Keys.

(Putorius Cuv.)

<i>putorius</i> L. (<i>typus</i> Cuv.)	.	.	Europa, Asien bis Mittelchina.
<i>furo</i> L.	.	.	Südeuropa.
<i>eversmanni</i> Less.	.	.	Sibirien, Centralasien.
<i>sarmaticus</i> Pall.	.	.	Südosteuropa, Vorderasien.

Gattung Mustela Nilss.

<i>erminea</i> L.	.	.	Europa, Asien bis Mittelchina, Japan, Nordamerika.
<i>numidica</i> Puch. (<i>africana</i> Pom.)	.	.	Nordafrika, Malta.
<i>vulgaris</i> Briss.	.	.	Europa, Asien, Japan, Nordamerika.
<i>boccamela</i> Behst.	.	.	Mittelmeerländer.
<i>subpalmata</i> Ehrbg.	.	.	Ägypten.
<i>altaica</i> Pall.	.	.	Südsibirien.
<i>intermedia</i> Severtz.	.	.	Turkestan.
<i>stoliczkana</i> Blanf.	.	.	Chinesisches Turkestan.
<i>fontana</i> M.-E.	.	.	Mupin.
<i>alpina</i> Radde	.	.	Ostsibirien.

Gattung Lutronectes Gray.

<i>whiteleyi</i> Gray	.	.	Japan.
-----------------------	---	---	--------

Gattung Lutra Erxl.

<i>vulgaris</i> Erxl.	.	.	Ganzes Gebiet.
<i>angustifrons</i> Lat.	.	.	Algerien.

Gattung Enhydris Fischer.

<i>marina</i> Steller ¹⁾	.	.	Beringsmeer.
-------------------------------------	---	---	--------------

¹⁾ Nur als Skelett vorhanden.

Familie Canidae.**Gattung Canis L.**

<i>alpinus</i> Pall. nec Forsyth Major	Südsibirien.
<i>lupus</i> L.	Europa, Sibirien bis zum Altai.
<i>lycaon</i> Erxl.	Pyrenäen.
<i>laniger</i> Hodgs. (<i>chaneo</i> Gray) .	Tibet.
<i>hodophylax</i> Temm.	Japan.
<i>ekloni</i> Przw.	Tibet.
<i>aureus</i> (<i>Lupulus</i>) L.	Südosteuropa, Vorderasien.
<i>anthus</i> (<i>Lupulus</i>) L.	Nordafrika.

Gattung Nyctereutes Temm.

<i>viverrinus</i> Temm. (<i>procyonoides</i> Gray)	Ostsibirien, Amurland, Japan, Nordchina.
---	--

Gattung Vulpes Briss.

<i>vulgaris</i> Briss.	Ganzes Gebiet.
<i>melanogaster</i> Bp.	Italien.
<i>niloticus</i> Geoffr.	Ägypten.
<i>atlanticus</i> Wagn. (<i>algeriensis</i> Loche, <i>mediterraneus</i> Autor.)	Nordafrika.
<i>montanus</i> Pearson	Centralasien.
<i>griffithi</i> Blyth	Afghanistan.
<i>lagopus</i> (<i>Leucocyon</i>) L.	Arktisches Gebiet.
<i>corsac</i> (<i>Fennecus</i>) L.	Asien bis zur Wolga.
<i>karagan</i> (F.) Erxl.	Turkmenensteppe bis zum Ural.
<i>canus</i> (F.) Blanf.	Belutschistan.
<i>fumeticus</i> (F.) Rüpp.	Vorderasien, Ägypten, Nordafrika.
<i>leucopus</i> (F.) Blyth	Persien, Tibet, Pandschab.
<i>zerdo</i> (F.) Zimm.	Nordafrika, Sinaihalbinsel.
<i>ferrilatus</i> (F.) Hodgs.	Tibet.

Familie Hyaenidae.**Gattung Hyaena Zimm.**

<i>striata</i> Zimm.	Nordafrika, Vorderasien bis Turkestan, Indien, Afrika.
------------------------------	--

Familie Viverridae.**Gattung Genetta G. Cuv.**

<i>vulgaris</i> Lesson	Nordafrika, Südspanien, Südfrankreich.
<i>afra</i> F. Cuv.	Nordafrika.
<i>bonapartei</i> Loche	Nordafrika.

Gattung Herpestes III.

<i>pharaonum</i> Lacép. (<i>ichneumon</i> L.)	Nordafrika, Ägypten.
<i>widdringtoni</i> Gray	Südspanien, Marokko.
<i>numidicus</i> (<i>Mangusta</i>) Cuv. . .	Algerien.
<i>persicus</i> Gray (= <i>aureopunctatus</i> Hodgs. var.)	Persien, Afghanistan.
<i>urva</i> Hodgs.	Südasien, Afghanistan.

Familie Felidae.**Gattung Cynaelurus Wagl.**

<i>jubatus</i> Schreb.	Afrika, Vorderasien b. Indien.
--------------------------------	--------------------------------

Gattung Felis L.**a) Untergattung Uncia Schreb.**

<i>leo</i> L.	Nordafrika, Mesopotamien.
<i>persica</i> Sws.	Persien, Indien; Lykien?
<i>tigris</i> L.	Centralasien, China.
<i>pardus</i> L.	Nordafrika, Vorderasien; Afrika und Indien.
<i>tulliana</i> Val.	Kleinasien.
<i>uncia</i> Schreb. (<i>irbis</i> Ehrbg.) . .	Südsibirien.
<i>superba</i> Przw.	Tibet.
<i>humilis</i> Przw.	Tibet.
<i>diardi</i> Desm. (<i>macroscelis</i> Gray) .	Hinterindien, Südchina bis Mupin.

b) Untergattung Felis s. str.

<i>libyca</i> Oliv. (<i>caffra</i> Desm.) . . .	Vorderasien, Nordafrika, Sardinien?
<i>chaus</i> Rüpp. nec Güldst. . . .	Syrien, Sinaihalbinsel.
<i>manul</i> Pall.	Nordchina bis zum Ural.
<i>tristis</i> M.-E.	Setschuan, China.

<i>scripta</i> M.-E.	Setschuan, Mupin.
<i>chaus</i> Güldst. nec Rüpp. (<i>catolynx</i> Pall.)	Ägypten bis Centralasien.
<i>catigata</i> Temm.	Vorderasien.
<i>caudata</i> Gray (<i>servalina</i> Güldst.)	Uralo-kaspische Steppe, Turkestan.
<i>shawiana</i> Blanf.	Turkestan.
<i>catus</i> L.	Europa, Westasien.
<i>serval</i> L.	Nordafrika, Sahara.

Gattung Lynxus Gray.*(Lynx Geoffr.)*

<i>caracal</i> Güldst.	Vorderasien, Nordafrika.
<i>cerraria</i> Temm.	Ural, Persien.
<i>borealis</i> Temm. (<i>canadensis</i> Desm.)	Skandinavien, Nordamerika.
<i>pardina</i> Temm.	Südeuropa, Kleinasien.
<i>lynx</i> L.	Nord- und Mitteleuropa.
<i>aygar</i> Przw.	Tibet.
<i>unicolor</i> Przw.	Tibet.

Sechste Ordnung: Pinnipedia.**Familie Trichechidae.****Gattung Trichechus L.**

<i>rosmarus</i> L.	Nördliches Eismeer.
--------------------	---------------------

Familie Phocidae.**Gattung Phoca Gray.**

<i>vitulina</i> L.	Atlantischer Ocean.
<i>caspica</i> Nilss.	Kaspisches Meer, Uralsee, Baikalsee.
<i>groenlandica</i> Müll.	Nördliches Eismeer.
<i>foetida</i> Müll.	Nördliches Eismeer.

Gattung Halichoerus Nilss.

<i>grypus</i> Nilss.	Atlantischer Ocean.
----------------------	---------------------

Gattung Cystophora Nilss.

<i>cristata</i> Erxl.	Atlantischer Ocean.
<i>dimidiata</i> Crschm.	Atlantischer Ocean.

Gattung Calocephalus F. Cuv.

- annellatus* Nilss. Ostsee.
barbatus (*Erignathus*) Müll. . . Nordatlantischer Ocean.

Gattung Pelagius F. Cuv.

- monachus* F. Cuv. (*albiventer*
 Bodd.) Mittelmeer.

Siebente Ordnung: Ungulata.**Erste Abteilung: Perissodactyla.****Familie Equidae.****Gattung Equus L.**

- hemionus* Pall. Transkaspien bis Vorder-
 indien.
przewalskii Poliakoff Centralasien.
onager Briss. Vorderasien.

Zweite Abteilung: Artiodactyla ruminantia.**Tribus Cavicornia.****Familie Bovidae.****Gattung Bison Sund.**

- europaeus* Sund. (*bonasus* L.) . Litthauen, Kaukasus.

Gattung Poëphagus Wagn.

- grunniens* L. Tibet.

Gattung Oryx Blainv.

- ? *leucoryx* Pall. Sahara, Arabien.
beatrix Gray Südarábien.

Gattung Addax (Raf.) Gray.

- nasomaculatus* Gray Sahara, Nubien.

Gattung Gazella Blainv.

- dorcas* L. Nordafrika.
arabica Ehrbg. Arabien, Vorderasien bis
 Indien.
mhorr Benn. ? Marrokko.
kerella Pall. (*corinna* Loche) . . Algerien.
loderi Thos. Sahara.

<i>rufina</i> Thos.	Sahara.
<i>museatensis</i> Brooke	Südarabien.
<i>subgutturosa</i> GÜldst.	Persien, Kleinasien, Transkaspien.

Gattung Saiga Gray.

<i>tatarica</i> L. (<i>saiga</i> Pall.)	.	.	.	Südrussland, Sibirien.
--	---	---	---	------------------------

Gattung Pantholops Hodgs.

<i>hodgsoni</i> Abel	Tibet.
----------------------	---	---	---	---	--------

Gattung Alcelaphus Blainv.

<i>bubalis</i> Pall. (<i>Bubalus mauritanicus</i> Rüpp.)	Sahara, Nordafrika.
---	---	---	---	---	---------------------

Gattung Nemorhaedus H. Sm.

<i>goral</i> Hardw.	Himalayagebiet.
---------------------	---	---	---	---	-----------------

<i>crispus</i> (<i>Kemas</i>) Temm.	Japan.
---------------------------------------	---	---	---	---	--------

Gattung Rupicapra H. Sm.

<i>tragus</i> Gray	Alpen, Karpathen.
<i>pyrenaica</i> Schinz	Pyrenäen, Nordspanien.

Gattung Capra L.

<i>ibex</i> L.	Alpengebiet.
----------------	---	---	---	---	--------------

<i>bedien</i> Wagn. (<i>sinaitica</i> Hempr.)	Sinaihalbinsel, Vorderasien.
--	---	---	---	---	------------------------------

<i>pyrenaica</i> Schinz (<i>hispanica</i> Sch.)	Pyrenäen, Südspanien, Serra de Gredos und Portugal.
--	---	---	---	---	---

<i>aegagrus</i> Gmel.	Archipel, Vorderasien.
-----------------------	---	---	---	---	------------------------

<i>picta</i> Ehrh.	Antimelos.
--------------------	---	---	---	---	------------

<i>dorcas</i> Reich	Giura.
---------------------	---	---	---	---	--------

<i>amalthea</i> Maltz.	Kreta.
------------------------	---	---	---	---	--------

<i>caucasica</i> GÜldst.	Kaukasus.
--------------------------	---	---	---	---	-----------

<i>sibirica</i> Meyer (<i>himalayana</i> Schinz)	Altai bis Himalaya.
---	---	---	---	---	---------------------

<i>daurica</i> Sternd.	Kaschmir.
------------------------	---	---	---	---	-----------

<i>falconeri</i> Wagn. (<i>megaceros</i> Hutt.)	Afghanistan, Kaschmir.
--	---	---	---	---	------------------------

Gattung Procapra Hodgs.

<i>jemuina</i> Hodgs. (<i>Thar</i>)	Himalaya.
---------------------------------------	---	---	---	---	-----------

<i>picticauda</i> Hodgs.	Tibet.
--------------------------	---	---	---	---	--------

<i>jayakari</i> Thos.	Oman.
-----------------------	---	---	---	---	-------

Gattung **Ovis L.**

<i>musimon</i> Schreb.	.	Sardinien, Korsika.
<i>tragelaphus</i> Desm.	.	Nordafrrika.
<i>ophion</i> Blyth (<i>cyprinus</i> Blas.)	.	Cyperm.
<i>gmelini</i> Blyth (? <i>orientalis</i> Gmel., <i>anatolicus</i> Val.)	.	Kleinasien, Persien.
<i>polii</i> Blyth	.	Pamir, Nordtibet.
<i>karelini</i> Severtz.	.	Alatau.
<i>argali</i> Pall. (<i>arkal</i> Brdt.)	.	Südsibirien, südöstliche Mongolei.
<i>heinsi</i> Severtz.	.	Tokmak.
<i>nigrimontanus</i> Severtz.	.	Karatau.
<i>niricola</i> Eschr.	.	Kamtschatka.
<i>dalailamae</i> Przw.	.	Tibet.
<i>hodgsoni</i> Blyth (<i>ammonoides</i> Hodgs.)	.	Tibet.
<i>brookei</i> Ward (= <i>hodgsoni</i> × <i>rignei</i>)	.	Kuenluen.
<i>rignei</i> Blyth (<i>cycloceros</i> Hutt.)	.	Westl. Himalaya bis Persien.
<i>blanfordi</i> Hume	.	Afghanistan.
<i>nahura</i> Hodgs. (<i>Pseudois</i>)	.	Tibet.
<i>burrhel</i> Blyth	.	Himalaya.
<i>darwini</i> Przw.	.	Tibet.

Tribus Solidicornia.

Familie **Cervidae.**Gattung **Moschus.**

<i>moschiferus</i> L.	.	Asien, nördlich des Himalaya, Sibirien.
-----------------------	---	--

Gattung **Cervus L.**

<i>davidianus</i> (<i>Elaphurus</i>) M.-E.	.	Mandschurei.
<i>sika</i> Schleg. (<i>schlegeli</i> Heude. ¹⁾	.	Japan, China.
<i>mantschuricus</i> Swinh.	.	Mandschurei.
<i>elaphus</i> L.	.	Europa, Kleinasien, Sibirien.
<i>corsicus</i> Bp. (<i>barbarus</i> Benn.)	.	Korsika, Nordafrika.

¹⁾ P. Heude hat *Cervus sika* zu einer eigenen Gattung *Sika* erhoben, in welcher er 37 Arten unterscheidet, die aber meistens noch nicht genügend charakterisiert und nirgends abgebildet sind.

<i>unicolor</i> Behst.	.	.	.	Himalaya.
<i>cashmirianus</i> Falc.	.	.	.	Kaschmir.
<i>mural</i> Ogilb.	.	.	.	Persien.
	<i>caucasicus</i> (<i>caspicus</i> Brooke?)	.	.	Transkaukasien.
<i>eustephanus</i> Blanf.	.	.	.	Thianschan.
<i>xanthopygus</i> M.-E.	.	.	.	Innerasien.
<i>lühderi</i> Bolau	.	.	.	Amurland.
<i>dybowskii</i> Tacz.	.	.	.	Centralchina.
<i>affinis</i> Hodgs.	.	.	.	Himalaya.
<i>albirostris</i> Przw.	.	.	.	Tibet.
<i>durauceci</i> Cuv.	.	.	.	Himalaya.
<i>kopschii</i> Swinh.	.	.	.	Centralchina.

Gattung Dama H. Sm.

<i>dama</i> L. (<i>vulgaris</i> Gray)	.	.	Südosteuropa.
	<i>mesopotamica</i> Brook.	.	Vorderasien.

Gattung Hydropotes Swinh.

<i>inermis</i> Sws.	.	.	Inseln des Yang-tse-kiang, Korea.
---------------------	---	---	--------------------------------------

Gattung Capreolus H. Sm.

<i>capreolus</i> L.	.	.	Europa, Vorderasien.
<i>pygargus</i> Pall.	.	.	Sibirien.
<i>magnus</i> Przw.	.	.	Innerasien.

Gattung Alces H. Sm.

<i>machilis</i> Ogilb.	(<i>antiquorum</i> Rüpp.)	.	Skandinavien, Rußland.
------------------------	-------------------------------	---	------------------------

Gattung Rangifer H. Sm.

<i>tarandus</i> L.	.	.	Boreales Gebiet.
--------------------	---	---	------------------

Familie Camelidae.**Gattung Camelus L.**

<i>bactrianus</i> L.	.	.	Innerasien.
----------------------	---	---	-------------

Dritte Abtheilung: Artiodactyla non ruminantia.**Familia Suidae.****Gattung Sus L.**

<i>scrofa</i> L. <i>fera</i>	.	.	Ganzes Gebiet.
<i>lencomystax</i> Temm.	.	.	Japan, Mandschurei.

Achte Ordnung: Cetacea.

Familie Delphinidae.

Gattung *Monodon* L.

monoceros L. Arktische Meere.

Gattung *Delphinapterus* Lacép.

leucas Pall. Arktisches Meer.

rhinodon Cope

deeliris Cope

angustatus Cuv.

Gattung *Phocaena* Cuv.

communis Cuv. Nordatlantischer Ocean.

Gattung *Neomeris* Gray.

phocaenoides Cuv. (*melas* Schleg.) Japanisches Meer.

Gattung *Orcinus* Gray.

gladiator L. Alle Meere.

Gattung *Pseudorca* Reinh.

crassidens Ow. Europäische Meere.

Gattung *Globiceps* Cuv.

melas Traill Alle Meere.

Gattung *Grampus* Gray.

griseus Cuv. Atlantisches und Mittelmeer.

Gattung *Lagenorhynchus* Gray.

albirostris Gray Nordatlantischer Ocean.

Gattung *Delphinus* L.

dolphin L. Mittelmeer und Atlantischer Ocean.

Gattung *Tursiops* Gerv.

tursio Bonn. Nordatlantischer Ocean.

Die nicht fettgedruckten Arten fehlen in dem Museum der Senckenbergischen Gesellschaft und ihre Erwerbung wird angestrebt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bericht über die Senckenbergische
naturforschende Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1896

Band/Volume: [1896](#)

Autor(en)/Author(s): Kobelt Wilhelm

Artikel/Article: [Katalog der aus dem paläarktischen Faunengebiet
beschriebenen Säugetiere 73-103](#)