

Diagnosen neuer Staphylinen aus dem
Mittelmeer - Faunengebiet
von M. Quedenfeldt*).

1. *Ilyobates crassicornis* n. sp.

Niger, nitidus, subtiliter griseo-pubescent, antennis longioribus crassis, thorace elytris pedibus anoque rufis, thorace transverso aequali, lateribus rotundato, parce subtilissime-, elytris hoc vix longioribus, dense subtilius-, abdomine minus crebre, paulo fortius-punctatis. Unum specimen.

Long. 3 mm.

Patria: Marocco (Marocco urbs).

2. *Quedius Eppelsheimi* n. sp.

Nigro-subaeneus, nitidus, pedibus testaceis, tibiis posterioribus infuscatis, antennis elytrisque fuscis, his viridi-submican-tibus, thorace transverso longioribus, dense punctatis, scutello laevigato, elytris abdomineque attenuato iridescente lateribus den-sius flavo-pubescentibus. Unum specimen.

Long. 7 mm.

Patria: Hispania mer. (Algeciras in Andalusia).

Ich beeubre mich, diese Art dem vortrefflichen *Staphylinen*-Kenner Herrn Dr. E. Eppelsheim zu Grünstadt in Baiern zu dediciren, wel-cher dieselbe zuerst als neu erkannte.

3. *Quedius iridicolor* n. sp.

Niger, nitidus, antennis, pedibus abdominisque segmentorum marginibus rufis, capite transversim orbiculato thoracis fere lati-tudine, elytris castaneis, hoc paulo longioribus dense punctatis, scutello laevi, abdomine versicolore anterius densius, postice par-cijs punctato. Unum specimen.

Long. $7\frac{1}{2}$ mm.

Patria: Marocco (Tetuan).

*) Ausführlicheres über die hier diagnosticirten Arten, sowie über *Echidnoglossa ventricosa mihi* (cfr. Berl. entom. Zeitschr. Jahrgang 1881, Heft II, pag. 293) denke ich in einem der nächsten Hefte dieser Zeitschrift gelegentlich einer Besprechung sämmtlicher von mir in Spa-nien und Marocco 1880—1881 gesammelter *Staphylinen* zu geben.

4. *Ocyphus Milleri* n. sp.

Apterous, niger, vix nitidus, dense subtiliter punctatus, capite thoraceque transversim quadratis fulvo-, elytris opacis, thorace paulo brevioribus abdomineque griseo-pubescentibus, ore, antennis pedibusque rufis.

Long. 16 mm.

Patria: Syria.

Ich erlaube mir, diese Art nach dem ausgezeichneten Coleopterologen Herrn L. Miller in Wien zu benennen, von welchem ich ein Pärchen derselben mit der vorstehenden Vaterlandsangabe erhielt.

5. *Philonthus sanguinipennis* n. sp.

Niger, nitidus, antennis pedibusque piceis, elytris sanguineis, densius minus subtiliter punctatis, abdomine creberrime subtilius subaequaliter punctato, dense fulvo-pubescente; thorace subquadrato seriebus dorsalibus 4 punctatis, (punctis in margine antico exceptis).

Long. 8 mm.

Patria: Marocco (flumen Tenfift prope urbem Marocco; Urica, vicus in monte Atlante).

6. *Philonthus brunneipennis* n. sp.

Gracilis, niger, nitidus, antennis basi pedibusque piceo-testaceis, elytris rufo-brunneis abdomineque dense punctatis, dense griseo-pubescentibus; capite rotundato, thorace subquadrato seriebus dorsalibus 4 punctatis, (punctis in margine antico exceptis).

Long. 6 mm.

Patria: Marocco (Tanger).

7. *Xantholinus linearis* var. *Maghrebinus* n. v.

Statura speciminum X. linearis graciliorum, capite nigro, thorace, antennis pedibusque rufis, elytris testaceis, abdomine piceo.

Long. 6 mm.

Patria: Marocco (Jebel Hadid prope urbem Mogador).

8. *Othius pilifer* n. sp.

Niger, nitidus, elytris piceis, antennis, pedibus anoque rufis, capite breviter ovali thoraceque parce nigro-pilosus, elytris abdomineque densius fulvo-pubescentibus, illis thorace parum longioribus minus crebre sat fortiter punctatis. Unum specimen.

Long. 7 mm.

Patria: Marocco (Tetuan).

9. *Othius paralleliceps* n. sp.

Niger, nitidus, pilosus, antennis elytrisque brunneis, pedibus anoque rufis; capite thoracis longitudine oblongo-quadrato lateribus parallelis, vertice lateribusque densius minus fortiter punctato, elytris thorace vix longioribus dispersim punctatis.

Long. $9\frac{1}{2}$ —11 mm.

Patria: Hispania mer. (Algeciras in Andalusia) Marocco (Tetuan).

10. *Compsochilus Weberi* n. sp.

Niger, subnitidus, parcus pubescens, ore, antennarum basi pedibusque fusco-testaceis, elytris piceis, anterius seriatim, postice irregulariter punctatis, thorace parum longioribus, hoc subquadrato, basin versus angustato, lateribus parce sat fortiter punctato.

Long. $2\frac{3}{4}$ mm.

Patria: Marocco (Tanger; Casablanca).

Ich erlaube mir, diese Art nach Herrn Th. Weber, kaiserlich deutschem Minister-Residenten in Tanger, zu benennen, welchem ich für seinen, an dem Verlauf meiner Reise in Marocco genommenen regen Antheil grossen Dank schulde.

11. *Compsochilus filiformis* n. sp.

Gracilis, piceus, parce pubescens, thorace rufo-brunneo, elytris fusco-testaceis, ore, antennarum basi, pedibus anoque rufis; thorace elongato postice medio breviter carinato; elytris hoc paulo longioribus subtiliter seriatim punctatis. Unum specimen.

Long. $1\frac{3}{4}$ mm.

Patria: Hispania mer. (Algeciras in Andalusia).

12. *Stenus Dobberti* n. sp.

Steno flavipedi Steph. proximus, sed alatus, major, robustior, elytris longioribus, basi latioribus, minus nitidus, nigro-subaeneus. Capite, thorace elytrisque dense fortiter-, abdomine subtilius punctatis, parce subtiliter pubescentibus; pedibus, palpis antennisque flavis, his articulo primo obscuro.

Long. 4 mm.

Patria: Marocco (Casablanca).

Herrn Dr. G. Dobbert in Casablanca freundschaftlichst gewidmet.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berliner Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1881

Band/Volume: [26](#)

Autor(en)/Author(s): Quedenfeldt Max

Artikel/Article: [Diagnosen neuer Staphylinen aus dem Mittelmeer - Faunengebiet 181-183](#)