

Zwei neue Anthiciden (Coleoptera) von Chinchoxo in Westafrika.

Von

H. J. Kolbe.

Zu den bereits im I. Hefte des gegenwärtigen Jahrgangs dieser Zeitschrift aufgeführten neuen Arten von Chinchoxo treten noch die Diagnosen von 2 Anthiciden-Species. Diese beiden noch unbeschriebenen Arten schliessen sich an die übrigen Afrikaner derselben Artengruppe enge an; sie gehören zu *Aulacoderus*, einem Subgenus von *Anthicus*. Die Arten sind characterisirt durch das gemeinsame Merkmal, dass beiderseits das Halsschild tief ausgehöhlt und vor dem Hinterende mit einer durchgehenden, tiefen Querfurche versehen ist. So geringfügig ein solches Merkmal auch erscheint, so ist demselben doch eine Bedeutung beizumessen, da alle Arten von Europa bis Madagascar darin übereinstimmen. Bisher war *Aulacoderus* nur in einigen Arten von dem Continente Afrika (Südafrika), sowie in einer Art aus Europa bekannt. Auch unter den von Hildebrandt in Madagascar gesammelten Coleopteren finde ich 1 oder 2 Species dieser Artengruppe, über die noch nichts geschrieben ist.

Aulacoderus guineensis n. sp.

Testaceus, nitidus, leviter velutinus, capite piceo vel nigro, laevissimo, antennis testaceis, ad apicem leviter incrassatis; thorace longitudine latitudinem paulo superante, ad latera antierius leviter ampliatis, ante marginem posticum coarctato; elytris ad latera parum ampliatis, obsolete punctatis, sutura, macula utrinque basali, fasciaque suffusa, extrinsecus abbreviata, transversali mediana fuscis; pectore antico et pedibus testaceo-ferrugineis, illo in medio et parte postica abdomineque, ano excepto ferrugineo, nigropiceis, nitidissimis. — Long. 2 mm.

Patria: Guinea inferior. Capta specimina 2.

Scheint am nächsten mit *Aulacoderus flavopictus* Laf. (Caput b. sp.) verwandt zu sein.

Aulacoderus lyonichoides n. sp.

Piceo-ater, subnitidus, leviter velutinus, capite thoraceque nigris, hujus latitudine longitudinem superante, ad latera antierius haud parum ampliato, ante marginem posticum coarctato; antennis testaceis, versus apicem piceis vel atris, articulo ultimo sat incrassato; elytris obsolete punctatis, ad latera parum ampliatis, piceis, maculis utrinque duabus magnis, flavopallidis; pedibus fuscatis, genibus tarsisque testaceis; corpore subtus piceo-nigro, nitido, sericeo. — Long. 2—2¹/₂ mm.

Patria: Guinea inferior. Capta specimina 2.

Dem *A. guineensis* nahe verwandt, doch dunkler gefärbt, die Makeln auf einen kleineren Raum beschränkt, das Halsschild deutlich breiter als lang, die Unterseite seidenhaarig.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berliner Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: [27](#)

Autor(en)/Author(s): Kolbe H. J.

Artikel/Article: [Zwei neue Anthiciden \(Coleoptera\) von Chinchoxo in Westafrika. 277-278](#)