## Zwei neue Anthiciden (Coleoptera) von Chinchoxo in Westafrika.

Von H. J. Kolbe.

Zu den bereits im I. Hefte des gegenwärtigen Jahrgangs dieser Zeitschrift aufgeführten neuen Arten von Chinchoxo treten noch die Diagnosen von 2 Anthiciden-Species. Diese beiden noch unbeschriebenen Arten schliessen sich an die übrigen Afrikaner derselben Artengruppe enge an; sie gehören zu Aulacoderus, einem Subgenus von Anthicus. Die Arten sind characterisirt durch das gemeinsame Merkmal, dass beiderseits das Halsschild tief ausgehöhlt und vor dem Hinterrande mit einer durchgehenden, tiefen Querfurche versehen ist. So geringfügig ein solches Merkmal auch erscheint, so ist demselben doch eine Bedeutung beizumessen, da alle Arten von Europa bis Madagascar darin übereinstimmen. Bisher war Aulacoderus nur in einigen Arten von dem Continente Afrika (Südafrika), sowie in einer Art aus Europa bekannt. Auch unter den von Hildebrandt in Madagascar gesammelten Coleopteren finde ich 1 oder 2 Species dieser Artengruppe, über die noch nichts geschrieben ist.

## Aulacoderus guineensis n. sp.

Testaccus, nitidus, leviter velutinus, capite picco vel nigro, laevissimo, antennis testaccis, ad apicem leviter incrassatis; thorace longitudine latitudinem paulo superante, ad latera anterius leviter ampliato, ante marginem posticum coarctato; elytris ad latera parum ampliatis, obsolete punctatis, sutura, macula utrinque basali, fasciaque suffusa, extrinsecus abbreviata, transversali mediana fuscis; pectore antico et pedibus testaceo-ferrugineis, illo in medio et parte postica abdomineque, ano excepto ferrugineo, nigropiceis, nitidissimis. — Long. 2 mm.

Patria: Guinea inferior. Capta specimina 2.

Scheint am nächsten mit Aulacoderus flavopictus Laf. (Caput b. sp.) verwandt zu sein.

## Aulacoderus lyonichoides n. sp.

Picco-ater, subnitidus, leviter velutinus, capite thoraceque nigris, hujus latitudine longitudinem superante, ad latera anterius haud parum ampliato, ante marginem posticum coaretato; antennis testaceis, versus apicem piceis vel atris, articulo ultimo sat incrassato; elytris obsolete punctatis, ad latera parum ampliatis, piceis, maculis utrinque duabus magnis, flavopallidis; pedibus fuscatis, genubus tarsisque testaceis; corpore subtus piceonigro, nitido, sericeo. — Long. 2—2½ mm.

Patria: Guinea inferior. Capta specimina 2.

Dem A. guineensis nahe verwandt, doch dunkler gefärbt, die Makeln auf einen kleineren Raum beschränkt, das Halsschild deutlich breiter als lang, die Unterseite seidenhaarig.

## ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berliner Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: 27

Autor(en)/Author(s): Kolbe H. J.

Artikel/Article: Zwei neue Anthiciden (Coleoptera) von Chinchoxo in

Westafrika. 277-278