

## Ueber einige für die Mark Brandenburg neue oder bisher in derselben selten beobachtete Käfer.

Von *M. Quedenfeldt*.

---

*Callisthenes reticulatus* F. Von Herrn Stimming bei Brandenburg a. H. in einigen Exemplaren gesammelt. In der Sammlung des Herrn Dr. Thieme sah ich ein Stück mit der Vaterlandsangabe: Jüterbog.

*Carabus auratus* L. Diese, bekanntlich vorzugsweise im westlichen Deutschland heimische Art kam dem entsprechend früher auch nur in den westlichsten Theilen der Mark (ausser in der Altmark östlich der Elbe, bei Havelberg, Friesack etc.) vor; beiläufig bemerkt, lebt sie nie auf Sandboden. Allerdings war sie in früheren Jahren als grosse Seltenheit und nur in einzelnen Stücken schon einige Male bei Berlin (Tempelhof, Tegel) beobachtet worden. Seit einigen Jahren wird nun der Käfer im Frühjahr in der Brieselanger Forst alljährlich in grossen Mengen gesammelt, scheint sich also dort vollständig eingebürgert zu haben. Es ist somit in der Mark Brandenburg eine Wanderung und allmälige Verbreitung dieser Art von Westen nach Osten nachgewiesen und in der norddeutschen Tiefebene ist Berlin wohl zur Zeit der östlichste Punkt ihres Vorkommens. In Schlesien hingegen kommt sie nach Letzner bei Görlitz (nicht selten), Löwenberg (nahezu 3 Grad östlicher, als Berlin gelegen), nach Redtenbacher in Oesterreich auf den Vorbergen des Wiener Schneeberges (selten) vor.

*Bembidion 8-maculatum* Goeze (Sturmi Panz.). In dem Brieselanger Forst von Herrn Nadlermeister Kläger gefunden.

*Patrobis septentrionis* Dej. Am Rande der Pfütze bei der Restauration Finkenkrug von mehreren hiesigen Sammlern gefunden.

*Dyschirius chalcicus* Er. Salzstelle bei Nauen (Habelmann).

*Gyrinus bicolor* Payk. Von Herrn Studiosus Kläger bei Berlin gesammelt.

*Homalota indocilis* Heer. Von mir im botanischen Garten gesiebt.

*Myllaena gracilis* Matth. Bei Eberswalde von mir gefunden.

*Quedius longicornis* Kr. 1 Ex. im Finkenkruge von Herrn Schrickel gefunden.

*Q. vexans* Epp. Bei Wilmersdorf von Herrn Habelmann gesammelt.

*Q. fumatus* Er. Bei Eberswalde von mir im Januar gesiebt.

*Q. nigriceps* Kr. Im Finkenkruge von Herrn Moritz gesiebt.

*Q. obliteratus* Er. 2 Ex. von mir in der Berliner Gegend gesammelt.

*Staphylinus latebricola* Grav. Von Herrn Schrickel, Moritz und mir in Käfergräben im Brieselang (Juni) gesammelt.

*St. fulvipes* Scop. Von Herrn Rost im sog. Blumenthalwalde gleichfalls in Käfergräben in mehreren Stücken gefunden. von denen eines in meinen Besitz übergegangen ist.

*Hesperus rufipennis* Grv. Im Thiergarten in hohlen Eichen (Prof. Dr. Fischer): in der Hasenhaide am ausfliessenden Saft (Habelmann).

*Philonthus salinus* Kiesw. Salzstelle bei Nauen unter trockenem Kuhmist in Anzahl (Habelmann).

*Ph. rubripennis* Kiesw. Eberswalde (Habelmann).

*Ph. rufimanus* Er. Am Elbufer bei Tangermünde in der Altmark von mir gesammelt.

*Ph. fuscus* Grav. Von meinem Vater einmal im botan. Garten unter loser Rinde in grosser Anzahl gefunden.

*Xantholinus glabratus* Grav. Botanischer Garten und Felder um Schöneberg (Q.)

*X. collaris* Er. ist wohl aus der märkischen Fauna auszuschneiden.

*Medon apicalis* Kr. 1 Ex. im bot. Garten gesiebt (Q.)

*Paederus ruficollis* F. Sehr häufig am Ufer eines See's in der sog. Duberau bei Königs-Wusterhausen. (Weise. Habelmann etc.). Das mir bekannte nördlichste Vorkommen dieser Art in Deutschland. Ohne Zweifel ist der Käfer durch Verschleppung — am wahrscheinlichsten wohl durch Sumpfvögel — an jenen abgelegenen See in der Duberau gekommen, wofür mir namentlich der Umstand zu sprechen scheint, dass der bekanntlich keineswegs lokal vorkommende, sondern von Mittel-Deutschland an im ganzen Süden (bis Kleinasien und Nordafrika) weit verbreitete, überall häufige Käfer bisher an keinem anderen Punkte der Mark aufgefunden worden ist.

*Stenus guttula* Müller. Eberswalde (Q.)

*St. pubescens* Steph. Gleichfalls bei Eberswalde von mir in einigen Stücken am Ufer eines Baches im feuchten Moose gefunden.

*St. picipennis* Er. An eisenhaltigem Wasser von mir bei Eberswalde gesammelt.

*St. nitidiusculus* Steph. Ebenda von Herrn Habelmann und mir gefunden.

- Bledius pygmaeus* Er. var. *Baudii* Fauv. Von Herrn Habelmann in der Nähe des Kreuzberges auf Lehmboden gefunden.
- Trogophloeus arcuatus* Steph. Eberswalde (Q.)
- Olophrum consimile* Gyll. 1 Ex. von mir bei Eberswalde im Januar gesiebt. (Von Fauvel bestimmt.) Bisher aus Deustehland nur von den Ostseeküsten bekannt.
- Homalium concinnum* Marsh. 1 Ex. in der Markgrafen-Strasse an einem Hause emporkriechend gefunden. (Moritz).
- H. testaceum* Er. Im Finkenkrug aus einer faulen Rüster gesiebt. (Habelmann.)
- H. salicis* Gyll. Von Herrn Pastor Schmidt bei Klosterfelde zahlreich in Baumblüthen gefunden.  
(Die genannten Staphylinen haben fast alle Herrn Dr. Eppelsheim zur Begutachtung vorgelegen.)
- Eumicrus rufus* Müll. Bisher in der Mark nur sehr einzeln und selten beobachtet. Im botanischen Garten an der Unterseite von Brettern, die auf mit Lohe gemischter Erde lagen, im Mai in grosser Anzahl von mir gefunden: daselbst fanden sich gleichfalls sehr zahlreich *Xanthol. fulgidus* F., *Sunius angustatus* Payk., *Stenus cautus* Er. u. a.
- Aulonium trisulcum* Fourc. Von Herrn Strahl im Finkenkrug an einer Rüsterklafter gefunden.
- Pediacus dermestoides* F. Hasenhaide (Prof. Dr. Fischer).
- Laemophloeus corticinus* Er. In der Hasenhaide unter Kiefernrinde (Prof. Fischer.)
- Saprinus lautus* Er. Herr Moritz sammelte diese seltene Art im Schönhauser Park zahlreich an Schirmpilzen.
- Abraeus globosus* Hoffm. Finkenkrug (Q.)
- A. parvulus* Aub. Bei Tegel an einer Eiche. (Habelmann.)
- Ceruchus chrysomelinus* Hohenw. (*tarandus* Panz.) 1 Ex. von Prof. Dr. Fischer in der Stadthaide bei Guben gefunden. Das Vorkommen dieser, sonst meist in Gebirgswäldern heimischen Art bei Guben scheint sehr bemerkenswerth; ich würde dasselbe anzweifeln, wenn nicht der Finder selbst der Gewährsmann wäre.
- Aesalus scarabaeoides* Panz. Bei Guben an alten Eichenzäunen von Herrn Prof. Fischer in Mehrzahl gesammelt.
- Trox cadaverinus* Ill. Finkenkrug (Habelmann).
- Tropinota hirta* Poda. Guben (Prof. Fischer): bei Köpenick auf Compositen (Thieme).
- Dicerca berolinensis* Herbst. Bei Eberswalde an Buchenklättern von H. Habelmann gesammelt.
- Eurythyrea austriaca* L. Nach Herrn Habelmann bei Eberswalde an Eichen von einem dortigen Sammler gefunden.

*E. scutellaris* Oliv. Bei Wendisch-Buchholz von Herrn Rector Gleissner gefunden.

*Buprestis (Ancylocheira) splendida* Payk. Dieser seltene Käfer wurde vor längeren Jahren in einem Exemplar innerhalb der Stadt vom verstorbenen Herrn Hofrath Völcker gefunden (das Ex. ging in die Sammlung des Herrn Prof. Dr. Fischer hieselbst, dann in den Besitz des Herrn Ribbe in Dresden über und befindet sich jetzt in der dortigen Museumssammlung.)

*Phaenops cyanea* F. Von mir auf einem Holzplatz in der Bülow-Strasse gefunden. Brieselang (Habelmann).

*Anthaxia nitidula* L. Guben (Prof. Fischer).

*A. morio* F. Eberswalde (Weise).

*A. nigritula* Ratzeb. Pichelsberg (Habelmann).

*Chrysobothris Solieri* Lap. Einmal im Juli von mir in Mehrzahl an Kiefernholz bei Pichelswerder gesammelt; auch von anderen hiesigen Sammlern, aber meist einzeln, im Grunewalde etc. gefunden.

*Coraeus rubi* L. In der Wuhlhaide an Eichenklaffern (Moritz).

*Agrilus subauratus* Gebl. Finkenkrug auf Zitterpappelgesträuch. (Habelmann).

*A. pratensis* Ratzeb. Wie der Vorige.

*Trachys fragariae* Bris. Bei Eberswalde von Herrn Lehrer J. Weise aufgefunden.

*Melasis buprestoides* L. Bei Eberswalde an Buchenklaffern (Habelmann).

*Tharops melasoides* Lap. Desgl.

*Dromaeolus barnabita* Villa. Ein Ex. im Thiergarten im Fluge, in der Nähe grosser Eichen, vom verst. Herrn Lehrer Hensel im Juni gefangen.

*Dirrhagus pygmaeus* F. Im Finkenkrug von Herrn Baron von Türkheim und Herrn Dr. Thieme unter Eichen gekäschert, von mir daselbst vom Gebüsch geklopft.

*Anchastus acuticornis* Germ. Eberswalde an Eichen und Buchen von Hrn. Lithograph Fischer u. A. gefunden.

*Ischnodes sanguinicollis* Panz. Desgl. Auch in einer hohlen Rüster in Wilmersdorf von Herrn Dr. Thieme gefunden.

*Megapenthes lugens* Redt. Finkenkrug auf blühendem Hollunder (Fischer u. Habelmann).

*Elater (Ampedus) Megerlei* Lac. Finkenkrug an Linden und Rüstern.

*Limonius violaceus* Müll. Bei Eberswalde in einer rothfaulen Eiche wenige Ex. (Fischer, Habelmann).

*Corymbites globicollis* Germ. Eberswalde; unter Buchen am Grase.

zu vielen hundert Expl. von verschiedenen hiesigen Entomologen gesammelt.

*Prionocyphon serricornis* Müll. An der Nuthe bei Potsdam von Herrn J. Weise gekäschert.

*Bruchus (Ptinus) coarcticollis* Sturm. 3 Ex. zu verschiedenen Zeiten im Brieselang von Kiefern geklopft. (Weise).

*Tenebrio picipes* Herbst. In Eichen im Wildpark bei Potsdam und im Schönhauser Park. (Weise).

*Orchesia fasciata* Payk. Finkenkrug (Prof. Fischer).

*Abdera trigutatta* Gyll. Von Herrn Lithogr. Fischer auf einem Holzplatze bei Berlin, von Herrn Kupferstecher Habelmann bei Königs-Wusterhausen gefunden.

*Hypulus bifasciatus* Fabr. Guben (Prof. Fischer).

*Sitaris analis* Schaum. Köpenick (Habelmann), Guben (Prof. Fischer).

*Lissodema cursor* Gyll. 2 Ex. in Brieselang an Rüstern von Herrn Weise gefunden.

*Salpingus foveolatus* Ljungh. Hasenhaide (Habelmann, Prof. Fischer).

*Gasterocercus depressirostris* F. Wuhlheide an Eichenklaftern in grosser Zahl. (Moritz).

*Camptorrhinus statua* Rossi. Bei Eberswalde an Eichen und Klafterholz. (Habelmann).

*Dorytomus validirostris* Gyllh. Im bot. Garten unter Rinde (Q).

*Anthonomus cinctus* Redtb. Bei Eberswalde von mir gesiebt.

*Grammoptera variegata* Germ. Am Wege zwischen Finkenkrug und Brieselang von Herrn Dr. Thieme gekäschert.

*Molorchus Marmottani* Bris. (*discicollis* Heyd.) Bei Guben von Herrn Prof. Dr. Fischer gesammelt.

*Axinopalpus gracilis* Kryn. Von den Herren Dr. Kraatz und Lithograph Fischer in je einem Stück innerhalb der Stadt („Unter den Linden“) gefunden, von Herrn Baron von Harold im Charlottenburger Schlosspark von Gebüsch geklopft.

*Notorrhina muricata* Schönh. Von den Herren Kupferstecher Tiefenbach, Habelmann und Fischer auf einem (jetzt längst bebauten) Holzplatz vor dem Halleschen Thor in Anzahl, von Herrn Weise 1 Ex. im Grunewald, von Prof. Fischer 1 Ex. auf einem anderen Holzplatze gefunden.

*Callidium ueneum* Dej. (*dilatatum* Payk.) Hasenhaide (Habelmann), Thiergarten (Prof. Fischer).

*Clytus tropicus* Panz. An Eichenklaftern in der Duberau bei Königs-Wusterhausen. (Weise).

142 *M. Queedenfeldt: üb. einige f. d. M. Brandenb. neue etc. Käfer.*

*Liopus punctulatus* Payk. Im Brieselang von verschiedenen hiesigen Sammlern gefunden; nach Herrn Dr. Thieme ausschliesslich auf halbdürrem Reisig der Zitterpappeln.

*Hoplosia fennica* Payk. Von Herrn Dr. Thieme und anderen Sammlern im Brieselang in Mehrzahl gesammelt; lebt ausschliesslich auf dürrer Lindenholz, insbesondere an den abgestorbenen Zweigen dieses Baumes.

*Mesosa curculionides* L. Finkenkrug (Weise, Dr. Thieme).

*M. nebulosa* F. An Lindenstämmen im Brieselang, auch im Thiergarten (Thieme).

*Agapanthia lineatocollis* Don. Auf Kletten am Wege zwischen Finkenkrug und Brieselang. (Thieme).

*Opsilia chlorizans* Chev.? (non *molybdaena* Dalm.) Auf *Achillea millefolium* 2 Ex. auf dem Köpenicker Kirchhofe (Habelmann).

*Cryptocephalus signatus* Laich. Palais-Wiesen bei Potsdam (Weise).

*Chrysomela marginalis* Duft. Im Grunewald von Herrn Weise, im Finkenkrug von Herrn Ludy gesammelt.

*Cassida berolinensis* Suffr. Hasenhaide (Prof. Fischer).

*Hippodamia 7-maculata* Degeer. Auf feuchten Wiesen bei Eberswalde von Herrn Weise gekäschert.



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berliner Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1884

Band/Volume: [28](#)

Autor(en)/Author(s): Quedenfeldt Max

Artikel/Article: [Ueber einige für die Mark Brandenburg neue oder bisher in derselben selten beobachtete Käfer. 137-142](#)