

Tomonotus Theresiae sp. n.

Statura majore. Antennae unicolores, fuscae. Vertex parum declivis, antice late truncatus. Pronotum compressiusculum, disco pallide testaceo, carina acuta, lobis deflexis piceis. Elytra tota dense fusco-conspersa, vena intercalata a vena radiali sat remota, vena axillari libera. Alae cinnabarinæ, fascia marginali lata, nigra, lobum alnarem longum emittente. Pectus atrum nitidum. Femora postica superne haud excisa, extus fusca, pallide trifasciata, intus excepta fascia apicali subtota atra. Tibiæ posticæ atræ, basi pallide annulatae. Tarsi postici pallidi. ♀.

long. corporis 32 mm.	long. femor. post. 16,5 mm.
" pronoti 6,5 mm.	" tibiær. post. 14,5 mm.
" elytrorum 28 mm.	

Brunner, Mai 1895.

Eine von Ihrer Kgl. Hoheit Prinzessin Therese von Bayern gelegentlich einer Reise in Nordamerika auf der Prairie bei Fort Yates, Standing Rock Reservation der Sioux-Indianer in Nord-Dakota gefangene und von Brunner-Wattenwyll beschriebene neue Species der Gattung *Tomonotus* und der Gruppe der Acridier.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berliner Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1894

Band/Volume: [40](#)

Autor(en)/Author(s): Brunner

Artikel/Article: [Tomonotus Theresiae sp n. 277](#)