

Une nouvelle espèce d'Éciton.

Par le Docteur F. Santschi, Kaïrouan (Tunisie).

Avec 1 Fig.

Éciton latidens n. sp. ♂. Long. 18 mill.

Voisin de *quadriglume* Em. Noir. Dents des mandibule et joues d'un brun rougeâtre sombre. Funicule, tarsi, bord des segments du gastre d'un brun un peu jaunâtre. Pilosité roussâtre sur les mandibules le dessous du corps le bord inférieur des pattes et brunâtre sur les deux derniers segments du gastre, longue partout sauf sur le dos du thorax où elle est plus courte, cette pilosité fait défaut ailleurs. Une pubescence fine, adjacente, roussâtre sur le funicule, plus longue soyeuse à reflet d'un brun un peu olivâtre sur le gastre. Assez finement ponctu-réticulé. Mat sauf une bande étroite, lisse et luisante sur le bord postérieur des segments du gastre.

Tête environ deux fois aussi large que haute. Les yeux grands débordent les angles postérieurs et sont distants du bord antérieur de la tête de moins de l'épaisseur de la base du scape, plus larges en avant qu'en arrière, ovoïdes (plutôt elliptique chez *quadriglume* Em.)

Les ocelles grands, les latéraux très rapprochés leur intervalle égale à peine, en largeur leur diamètre. Antennes épaisses; le scape dépasse un peu le bord postérieur. 2^{ème} article du funicule 2½ fois aussi long qu'épais, pas plus long que le quatrième. Mandibule plus large au milieu que chez *quadriglume*, la dent apicale fortement recourbée en dedans; le bord interne présente entre la dent médiane et la base de la dent apicale un angle saillant qui manque chez *quadriglume*. Une petite dent à très large base et dirigée un peu en arrière occupe le milieu du tiers basal des mandibules. Thorax court plus court que chez *quadriglume* et *Buchelli*. Le scutellum est moins bimamelonné que chez *quadriglume* mais l'épinothum est aussi anguleux et presque aussi fortement bordé de chaque côté de la face déclive. Milieu du pédicule convexe dans les deux tiers postérieurs avec le bord assez fortement relevé, moins cependant que chez *quadriglume* et *Buchelli*, son bord postérieur presque vertical avec un angle mousse non prolongé en arrière, armure génitale retractée.

Quoique voisin de *quadriglume*, il en diffère nettement par sa taille plus petite, sa couleur, l'absence de poils sur les scapes la forme des mandibules et du pédicule. Guyane (St. Laurent du Maroni). Le Moult reçue de Mr J. de Gaulle.

Éciton (Acamatus) maxilosum Em. ♂. Un peu plus petit que le type de l'amazone. (Long 13.5 mill. aile antérieurs 13 mill.)

Guyane (Cayenne) reçue de Mr J. de Gaulle.



a. *Ecton quadriglume* Em.
b. *Ecton latidens* n. sp.
Mandibules.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berliner Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: [56](#)

Autor(en)/Author(s): Santschi Felix

Artikel/Article: [Une nouvelle espèce d'Eciton. 113](#)