

Die deutschen Vertreter der Gattung *Phimodera* (Hem. Het. Pent.)

(7. Beitrag zur Kenntnis der Hemipteren-Fauna Deutschlands).

Von F. Schumacher, Berlin.

Die Durchsicht eines umfangreichen Materials an *Phimodera*, welches den Kgl. Zoolog. Museen Berlin und Breslau, der Kollektion Breddin, Konow und Schirmer entstammt, setzt mich in den Stand, einige neue Tatsachen bekannt zu geben. Es zeigte sich, daß in Deutschland außer den bisher bekannten 3 Arten noch eine vierte bisher unbeobachtete hinzukommt, nämlich *Ph. nodicollis* Germ. Ich habe hier auf eine Wiedergabe resp. Revision der Literaturangaben aus Deutschland verzichtet, da ich bei einer größeren lokalfaunistisch-biologischen Arbeit darauf zu sprechen komme und habe mich auf die zuverlässigen Angaben in Reuters Monographie der Gattung *Phimodera* beschränkt. Da in Deutschland die Vertreter der Gattung *Phimodera* nur ganz sporadisch und selten gefunden wurden, möchte ich mich an alle Sammler mit der ergebenden Bitte wenden, mir ihr *Phimodera*-Material zur gefl. Ansicht zu übersenden.

1. *Phimodera flori* Fieb.

Westpreußen: Danzig, v. Siebold.

Brandenburg: Berlin, Stal sec. Reuter.

2. *Phimodera humeralis* Dalm.

a. forma *dorsigera* Reut.

Brandenburg: Berlin, 1 Exempl. ♂.

Berlin, Stal sec. Reuter.

Schlesien: Scholtz, 2 Exempl. ♀♀.

Andere Varietäten, beispielsweise „var.“ *dalmanni* Reut. dürften bei näherem Zusehen in Deutschland kaum fehlen.

3. *Phimodera nodicollis* Germ. Neu für Deutschland.

forma *typica*.

Schlesien: Rotermond, 1 Exemplar ♂.

Karlowitz, 19. VII. 1836, 1 Exemplar ♂.

Sehr interessantes Vorkommen dieser südosteuropäischen Art. Der nächste Fundort liegt in Podolien.

4. *Phimodera galgulina* H. Sch.

a. forma *pallida* Reut.

Brandenburg: Berlin, sec. Reuter, 6 Exemplare.

Berlin, v. Baerensprung, zahlreiche Exemplare.

b. forma *grisesceus* Reut.

Brandenburg: Berlin, v. Baerensprung, zahlreiche Exemplare.

Müggelsee, sec. Reuter*)

Müggelsee, 23. IV. 93, Schrickel.

Müggelsee, 28. VI. 85, coll. Breddin.

Müggelsee, coll. Schirmer.**)

Mecklenburg: Rostock, coll. Konow.

Hamburg: sec. Reuter.

c. forma *konovi* Reut.

Brandenburg: Berlin, v. Baerensprung, 2 Exemplare.

Müggelsee, 28. VI. 85, coll. Breddin, 1 Exempl.

Müggelsee, coll. Schirmer,**) 1 Exempl.

Mecklenburg: Fürstenberg, coll. Fokker sec. Reuter, 1 Exempl.

d. forma *denigrata* nov.

Oberseite vollständig tiefschwarz, nur die äußerste Spitze der Vorderecke des Pronotums, der sichtbare Teil des Coriums und die Tuberkeln am Rande des Abdomens sind gelbgrau gefärbt. Unterseite braun, schwarz punktiert. Beine schwarz. Schenkel am Ende mit hellem Fleck, Schienen mit hellem Ring.

Brandenburg: Müggelsee, coll. Schrickel, 1 Exempl. ♂.

*) In Reuters Monographie 1906, S. 40 und 41 steht „Müggd“. Es ist dies ein Fehler, entstanden durch undeutliche Schrift auf den Fundortsetiketten. Es soll heißen „Müggel“.

***) In Deutsch. Entom. Zeitschrift 1911, kürzlich fälschlich als *Ph. humeralis* Dalm aufgeführt. (Siehe das Verzeichnis von Hemipteren Brandenburgs aus der Kollektion Schirmer).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berliner Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: [56](#)

Autor(en)/Author(s): Schumacher F.

Artikel/Article: [Die deutschen Vertreter der Gattung Phimodera \(Hem. Het. Pent.\) 149-150](#)