© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Botanische Gärten und Institute.

Van Ermengem, Le laboratoire d'hygiène et bactériologie de l'Université de Gand. Avec plan. (Le Mouvement hygiénique. [Bruxelles.] 1886. No. 7.)

Sammlungen.

Wittrock, Veit et **Nordstedt, Otto,** Algae aquae dulcis exsiccatae praecipue Scandinavicae quas adjectis algis chlorophyllaceis et phycochromaceis distribuerunt . . . adjuvantibus J. Arechavaleta, C. A. Berg, S. Berggren, E. Bornet, Ch. Flahault, M. Foslie, H. Groves, A. Hansgirg, F. Hauck, C. J. Johanson, W. Joshua, G. Lagerheim, A. Löfgren, P. Richter, John Roy, N. Wille, Fr. Wolle. Fasc. 15 (nrs. 701—750); Fasc. 16 (nrs. 751—800); Fasc. 17 (nrs. 801—850). Stockholmiae 1886.

Diese 3 Fascikel enthalten 210 Nummern und, die Doubletten einbegriffen, 252 Exemplare. Von den darin enthaltenen Algen sind aus Schweden 58 Nrn., Norwegen 4, Dänemark 1, Deutschland 1, Oesterreich 43, Frankreich 11, England und Schottland 25, Nord-Amerika 3, Jamaica 1 (No. 776 b), Brasilien 2 (No. 765 c, 839), Uruguay 18 (No. 702, 704—706, 710, 710$^1/_2$, 711 a u. b, 717, 735—738, 743, 745, 753 c, 763 b, 787, 790 c), Birma 1 (No. 813). Ausgegeben sind in den 3 Fascikeln:

701. Coleochaete pulvinata A. Br. 702. Bulbochaete setigera (Roth) Ag. 703. B. crassiuscula Nordst. (aus England, bisher nur aus Bohuslän in Schweden bekannt) und B. polyandra Clev., in der Zelle unter dem Oogonium steht die Scheidewand gewöhnlich sehr hoch. 704. Oedogonium capilliforme Kütz., Wittr. β australe Wittr. nov. var. mit mehr kugeligen Oogonien, mit kürzeren Antheridienzellen. 705. Oed. Borisianum (Le Cl.) Wittr., idioandrospor, mit etwas kleineren Oogonien. 706. Oed. Arechavaleta Wittr. nov. spec., von Oed. crassiusculum Wittr. durch kleinere, kugelige Oogonien und Oosporen verschieden; Oed. Landsboroughi (Hass.) Wittr. mit (beinahe) kugeligen Oosporen, die das Oogonium nicht ausfüllen. 707. Oed. oblongum Wittr. 708. Oed. intermedium Wittr. nov. sp., von Oed. crispum durch beinahe kugelige, verkehrt eiförmige Oogonien, die sich mit einem Loch öffnen, verschieden. 709. Oed. cymatosporum Wittr. et Nordst. 710. Chaetophora Cornu Damae (Roth) Ag. β draparnaldioides Nordst. et Wittr. nov. var., nach dem äusseren Ansehen einer Draparnaldia täuschend ähnlich; Lager stielrund, Zweige am Ende kaum erweitert. 711. Ch. tuberculosa (Roth) Ag. f. incrustata. 712. Draparnaldia glomerata (Vauch.) Ag. mit Dauersporen. 713. Stigeoclonium uniforme (Ag.) Rab. 714.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Botanisches Centralblatt

Jahr/Year: 1886

Band/Volume: 28

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: Botanische Gärten und Institute 86