© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

×× Oelzellen nicht über das Pallisaden- oder Schwammgewebe hinausreichend.
— Krystalldrusen im Mesophyll reichlich: *Cr. grewiaefolius* Müll. Arg.
—— Krystalldrusen im Mesophyll spärlich: *Cr. oxyphyllus* Müll. Arg.

(Fortsetzung folgt.)

Druckfehler-Berichtigung.

In No. 5, p. 131, Zeile 21 v. o. muss es statt *Inlocroton Julocroton* heissen; p. 134, Zeile 7 v. o. ist vor *Putranjiva* der * zu streichen; p. 137, Zeile 31 v. o. muss es statt *muscricapus muscicapus* heissen; p. 138, Zeile 18 v. o. muss lauten: Fig. 5a—b u. Fig. 7, und in der folgenden Zeile muss dann Fig. 7 fortfallen.

Gelehrte Gesellschaften.

Gerock, J. E., Frühjahrsversammlung der Philomathischen Gesellschaft in Bitsch (Lothringen) am 18. Mai 1895. (Mittheilungen der Philomathischen Gesellschaft in Elsass-Lothringen. Jahrg. III. 1895. Heft 2. p. 1—4.)

Botanische Gärten und Institute.

Jahresbericht des Naturhistorischen Museums in Lübeck für das Jahr 1894. 18 pp. Lübeck 1895.

Klein, Ludwig, Fünfter Bericht über die Thätigkeit der Grossherzoglich badischen landwirthschaftlich-botanischen Versuchsanstalt zu Karlsruhe in den Jahren 1888—1894 und (zum Theil) 1895, erstattet an das Grossherzogliche Ministerium des Innern. 4°. 182 pp. Karlsruhe (typ. G. Braun) 1896.

Instrumente, Präparations- und Conservations-Methoden etc.

Miyoshi, M., Anwendung japanischer Soja und deren Gemisch für Pilzculturen. (The Botanical Magazine. Vol. IX. Tokyo 1895. No. 104.)

Nach den Versuchen des Verf.'s bildet Soja in Folge des zu reichen Gehaltes an Kochsalz und der Armuth an Kohlehydraten keinen besonders geeigneten Nährstoff für Pilze; immerhin konnten jedoch verschiedene Schimmelpilze in 5—20% Lösungen derselben zur vollen Fructification gebracht werden. *Saprolegnia ferax* bildete innerhalb einer 2% Lösung einen üppigen Rasen. Sehr geeignet zur Cultur von Schimmelpilzen fand Verf. ein Gemisch von 20 Theilen Soja, 25 Theilen conc. gekochtem Zwiebelsaft, 5 Theilen Rohrzucker und 50 Theilen destill. Wasser. Schliesslich wird noch erwähnt, dass alle darauf untersuchten Schimmelpilze von 1—2% Sojalösungen chemotropisch angelockt werden.

Zimmermann (Berlin).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Botanisches Centralblatt

Jahr/Year: 1896

Band/Volume: 65

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: Gelehrte Gesellschaften. 297