© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

A. assimulans B. f. 109, 207; H. anfangs glockenförmig, dann ausgebreitet, oft mit etwas vertiefter M., 80 br., anfangs gelblichweiss, mit gelbröthlicher M., später dunkler, bis graubraun, hygrophan; St. dunkelrothbraun, nur ganz ob. gelblich, 100 h., 8 br., unt. verdickt oder verdünnt, hohl; L. g., anfangs weisslich, dann grau, angewachsen, etwas abgerundet oder herablaufend; Spst. violett, braunviolett; Sp. s. blass violett, 8 : 3,4, länglich rund; Herbst; Föhrenstümpfe; IV b Mödishofen; dem *A. elaeodes* Fr. v.

A. populinus B. f. 43; H. 70 br., halbkugelig, sich verflachend mit wenig gebuckelter oder eingedrückter M., von dieser aus nachlässig faserig schuppig, matt braunröthlich, gelbbräunlich, gegen die R. hin meist heller; St. 60 h., 12 br., weiss, weisslich, faserig, voll, später hohl; Fl. weisslich; L. g., schmutzig lila, grauröthlich, graubraunröthlich; Spst. purpurbraun, violett-rothbraun; Sp. 7,9 : 4, lichtbraun, braun, abgerundet dreieckig, keilförmig; Herbst; an Stümpfen von italienischen Pappeln; IV a Lechauen; IV b Dasing, IV c; dem *A. pyrotrichus* Holmsk v.

A. instratus B. f. 110; H. halbkugelig, dann ausgebreitet, 45 br., matt, dunkel purpurbraun; St. weiss, seidig glänzend, 70 h., 5 br., röhrig hohl, die Höhlung mit wässerigem Mark angefüllt; L. nicht g., angeheftet, aufgeblasen, 10 br., röthlichbraun, dann violettbraun; Fl. weisslich, dann nässlich bräunlich; Spst. violettbraun, schwarzbraun; Sp. abgerundet dreieckig, keilförmig, 8 : 4, braun; Herbst; im Innern faulender Pappelstümpfe; IV a, Göggingen; dem *A. populinus* v.

A. marcessibilis B. f. 209; H. stumpf, kugelförmig, dann gewölbt ausgebreitet, 20 br., mit Schleierfetzen am R., blass bis sattgrau, weisslich verbleichend; St. 80 h., ob. 2 br., nach unt. allmählich bis zu 6 verdickt, weiss, seidenglänzend, hohl; L. g., graubraun, grauviolett, mit weiss bestäubtem R.; Sp. 14 : 6, länglich rund, meist mit einem kurz zugespitzten Ende; Herbst; IV a, Siebentischwald bei Augsburg. dem *A. piluliformis* Bull. v.

(Schluss folgt.)

Botanische Gärten und Institute.

Notizblatt des königl. botanischen Gartens und Museums zu Berlin. Bd. II. No. 16. gr. 8°. p. 219—251. Leipzig (Wilh. Engelmann) 1899. M. 1.—

Notizblatt des königl. botanischen Gartens und Museums zu Berlin. Appendix V. Index seminum in horto botanico reg. Berolinensi anno 1898 collectorum. gr. 8°. 15 pp. Leipzig (Wilh. Engelmann) 1899. M. —.40.

Vladescu, M., V. catalog de seminte recoltate la gradina botanica a Universitatei din Bucuresci in anul 1898. 8°. 58 pp. Bucuresci 1899.

Wettstein, R. von, Der botanische Garten und das botanische Institut der k. k. deutschen Universität in Prag. (Oesterreichische botanische Zeitschrift. Jahrg. XLIX. 1899. No. 2. p. 41—51. Mit 3 Plänen und 2 Ansichten.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Botanisches Centralblatt

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: 77

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: Botanische Gärten und Institute. 402