

adriatischen) beeinflusst. In der den Monat beschließenden Periode (20. bis 30.) kommt zum allergrößten Teile teilweise gleichmäßig verteilter, teilweise hoher Luftdruck (der erstere häufiger) zur Herrschaft, bis zum 25. kaltes, von da bis zum Schlusse sehr kühles Wetter, der ganzen Periode fast trockenes Wetter bringend.

Der Herbst des Jahres 1910 war kühl und niederschlagsreich. Seine mittlere Luftwärme blieb mit 0.4° C unter der normalen (8.2° C). Sein Niederschlag hielt sich mit 41.8 Millimeter über dem normalen (283.1 mm).

Phil. Wilhelm Huditz,

Beobachter an der meteorologischen Station Klagenfurt.

I. Nachtrag zum Verzeichnisse der bisher in Kärnten beobachteten Käfer.

Von Theodor Prossen.

(1. Fortsetzung.)

Pselaphidae.

Trimium Emonae Rtt. Auch im Dobratschgebiete (Villach, Nötsch), selten.

Euplectus brunneus Grimm. Auch bei Eisenkappel, Unterdrauburg, St. Paul im Lavanttal, selten.

— **Duponti* Aub. Dobratsch, subalpin unter Fichtenrinde, selten.

— **piceus* Motsch. Bei Eisenkappel und Unterdrauburg, selten.

— *nanus* Reichb. Auch bei St. Johann (Villach), selten.

— *sanguineus* Denny. Findet sich bei Grafenstein in den Nestern der *Formica fuliginosa*.

— **Spinolae* Aub. Schatzmayr fing 1 Stück dieser seltenen Art bei Fürnitz.

Biblopectus minutissimus Aub. Diese südliche Art siebte Fortsrat Gobanz bei Eisenkappel.

Bibloporus bicolor Denny. Verbreitet, doch nirgends häufig.

- Trichonyx sulcicollis* Reichb. Auch bei Villach von Schatzmayr gesammelt.
- Amauronyx* **Maerkeli* Aub. Villach, Klagenfurt, Eisenkappel, Unterdrauburg, mehr minder selten.
- Bratisus* **formicarius* Aub. Mallnitz, bei *Lasius brunneus*, 2 Stück.
- Batrisodes* **venustus* Reichb. Vereinzelt bei Arnoldstein, Klagenfurt und Unterdrauburg.
- **adnexus* Hampe. Mallnitz, sehr selten.
- Brachygluta Lefebvrei* Aub. Auch bei Villach, selten.
- *xanthoptera* Reichb. Auch im oberen Gailtale.
- *tristis* Hampe. In Oberkärnten und Eisenkappel, nicht selten.
- **Klimschi* Holdh. Das typische Stück fing E. Klimsch im Metnitztale, doch ist die Art nach Mitteilung E. Klimsch' im oberen Gailtale viel häufiger. Schatzmayr fing ein Stück bei Warmbad Villach.
- Reichenbachia juncorum* Leach. Auch im Gurktale und bei Unterdrauburg.
- Bryaxis* **longicornis* Leach. Schatzmayr fing ein Stück beim Warmbade Villach.
- Bythinus* **Heydeni* Rtt. Von A. Gobanz bei Eisenkappel gesammelt.
- **Erichsoni* Kiesw. Wie vorige Art.
- *muscorum* Kiesw. Auch in Oberkärnten gefunden.
- **macropalpus* Aub. Von Forstrat Gobanz bei Villach gesammelt.
- **Burrelli* Denny. Bei Unterdrauburg, selten.
- *Brusinae* Rtt. Im Gailtale und bei Heiligengeist (Dobratsch), mehr minder selten.
- **Stussineri* Rtt. St. Johann bei Villach und Eisenkappel, sehr selten.
- Pselaphus dresdensis* Hbst. Auch im Mölltale (Winklern), nicht sehr selten.
- Tyrus mucronatus* Panz. Findet sich in Oberkärnten an verschiedenen Orten, mehr minder selten.
- **Tillyi* Schatzmayr. Am Fuße des Mittagkogels bei Rat-

nitz unter Fichtenrinde in einem ♀ Stücke in Gesellschaft der *Formica fuliginosa* entdeckt. (Münch. Koleopt. Ztg., II., 213.)

Clavigeridae.

Claviger testaceus Preysl. Findet sich bei Eisenkappel und Unterdrauburg oft in größerer Zahl in den Nestern der *Lasius flavus*. Wahrscheinlich auch an anderen Orten.

Scydmaenidae.

Euthia plicata Gyll. Auch in der Sattnitz bei Klagenfurt mehrmals.

— **linearis* Muls. Eisenkappel.

*Cephenium *majus* Rtt. Bei Eisenkappel und Unterdrauburg, nicht selten.

*Neuraphes *rubicundus* Schaum. Von Gobanz bei Villach gesammelt, sehr selten.

— **coronatus* Sahlbg. Wie vorige Art.

— *semicastaneus* Rtt. Von Gobanz bei Obervellach gefangen.

— **Emonae* Rtt. Im Catal. aus Kärnten angeführt.

— *ornatus* Rtt. Diese seltene Art ist im ganzen Lande verbreitet.

— *nodifer* Rtt. Auch bei Eisenkappel.

— *geticus* Saulcy. Bei Unterdrauburg, sehr selten.

— **Hopffgarteni* Rtt. Im Catal. Coleopt. Europ. aus Kärnten und Kroatien angeführt.

— **nigrescens* Rtt. Diese südungarische Art wurde bei Villach von Gobanz gefangen; sehr selten.

*Stenichnus *pusillus* Müll. Bei Villach, Klagenfurt und Grafenstein gesammelt.

Euconnus claviger Müll. Außer im oberen Gailtale und bei Villach auch bei Klagenfurt, an letzterem Orte seltener.

— **intrusus* Schaum. Die von Ganglbauer beschriebene Form *Birnbacheri* ist als Monstrosität zu dieser Art gestellt.

— *similis* Weise. Scheint im ganzen Lande mehr minder häufig.

Silphidae.

- Choleva* **Sturmi* Bris. Bei Sachsenburg und St. Paul im Lavantale, selten.
- Nargus* **badius* Strm. In der Umgebung von Villach, sehr selten.
- Catops* **nigricans* Spence. Bei Kraßnitz (Gurktal) zwei Stücke gesammelt.
- Ptomaphagus* **sericatus* Chaud. Bei Villach, ein Stück.
- Colon latum* Kr. Auch bei Eisenkappel.
- **clavigerum* Hbst. Verbreitet, mehr minder selten.
- *affine* Strm. **var. confusum* Bris. Unter der Stammform.
- *murinum* Kr. An der Gail und Drau (Rosental), auch Eisenkappel, mehr minder selten.
- **fuscicorne* Kr. Bei Unterdrauburg, selten.
- **armipes* Kr. Bei Eisenkappel und Klagenfurt, selten.
- **angulare* Er. Bei Eisenkappel, sehr selten.
- *brunneum* Ltr. **var. episternale* Czwal. Bei Eisenkappel, vereinzelt.
- **appendiculatum* Sahlb. In der Sattnitz (Klagenfurt), selten. Auch die **var. fulvum* Fleisch.
- **viennense* Hbst. Vereinzelt im ganzen Lande.
- Silpha obscura* L. **var. costata*. Bei Klagenfurt unter der Stammform, hie und da.
- *granulata* Thunb. Auch bei Villach, vereinzelt.
- *tyrolensis* Laich. Am Tauern bei Mallnitz.
- Phosphuga atrata* **a. brunnea* Hbst. Bei Eisenkappel und St. Paul im Lavantale unter der Stammform, selten.
- Pteroloma* **Forsstroemi* Gyll. Von E. Klimsch in geringer Zahl in den Metnitztaler Bergen gefangen.

Liodidae.

- Triarthron* **Maerkeli* Schmidt. Bei Eisenkappel von Forstrat Gobanz erbeutet.
- Hydnobius* **multistriatus* Gyll. Bei Klagenfurt, in den Karawanken (Eisenkappel) und Unterdrauburg, mehr minder selten.

Hydnobius punctatus *var. *intermedius* Thoms. Unter der Stammform, verbreitet.

Liodes **brunnea* Strm. Sattnitz bei Klagenfurt, sehr selten.

— **clavicornis* Rye. Eisenkappel.

— **flavescens* Schmidt. Bei Unterdrauburg, sehr selten.

— **curta* Fairm. Mit voriger Art.

— **calcarata* Er. *var. *picta* Reiche. Hie und da unter der Stammform.

— **rubiginosa* Schmidt. Auch (nach Mitteilung E. Klimesch) im Maltatale.

— — *var. *dilaticollis* Fleisch. Ebendort, häufiger als die Stammform.

— **ovalis* Schmidt. Im ganzen Lande, mehr minder selten.

— **hybrida* Er. Eisenkappel.

— **Brandisi* Holdh. Diese in Bosnien und der Herzegowina entdeckte Art fing Freund Schatzmayr am Dobratsch, subalpin.

— **Skalitzkyi* Ganglb. In den Dolomiten entdeckt. Von Schatzmayr auch am Dobratsch, subalpin.

— **Ganglbaueri* Holdh. Wie vorige Art.

— **rotundata* Er. Findet sich auch im Gailtale, bei Eisenkappel und Unterdrauburg.

— **carpathica* Ganglb. Diese in den Karpathen entdeckte Art sammelte E. Klimesch im oberen Gailtale in Anzahl.

— **parvula* Sahlb. Auch bei Klagenfurt.

Cyrtusa **subtestacea* Gyll. Bei Klagenfurt, vereinzelt.

— **minuta* Ahrens. Auch in Oberkärnten (Gail- und Drautal), nicht selten.

— **pauvilla* Schmidt. Im oberen Gailtale, häufig.

Agathidium laevigatum Er. Auch bei Klagenfurt.

— **confusum* Bris. Eisenkappel, selten.

Clambidae.

Calyptomerus **dubius* Marsh. Eisenkappel.

Leptinidae.

Leptinus **testaceus* Müller. Im Eggerloche (Dobratsch) in wenigen Stücken gefangen.

Corylophidae.

Sacium brunneum Bris. Auch bei Eisenkappel von Gobanz gefangen.

Sericoderus **lateralis* Gyll. Bei Villach, Eisenkappel, Unterdrauburg, überall vereinzelt.

Orthoperus **brunnipes* Gyll. Bei Eisenkappel.

Trichopterygidae.

Ptenidium **laevigatum* Er. Bei Eisenkappel, sehr selten.

— **Brisouti* Matth. Bei Unterdrauburg, ein Stück.

— **punctatum* Gyll. Eisenkappel.

Euryptilium **saxonicum* Gillm. Von Gobanz bei Eisenkappel gesiebt.

Ptinella **aptera* Guér. Im oberen Gailtale, unter Buchenrinde, oft in großer Zahl.

— — **var. ratisbonensis* Gillm. Unter der Stammform.

— **tenella* Er. Mit voriger Art, nicht selten.

— — **var. biimpresa* Rtt. Unter der Stammform.

Pteryx **Schatzmayri* Rtt. n. sp. Von Schatzmayr am Dobratsch, subalpin, in mehreren Stücken unter Rinde entdeckt.

Nephanes **Titan* Newm. Bei Unterdrauburg, sehr selten.

Micrus **filicornis* Fairm. Von Gobanz bei Eisenkappel erbeutet.

Scaphidiidae.

Scaphosoma **subalpinum* Rtt. Im oberen Gailtale, nicht selten.

Histeridae.

Hister **hellus* Truqui. Bisher nur bei Villach und Unterdrauburg in wenigen Stücken gesammelt.

— *ventralis* Mars. Auch bei Klagenfurt und Grafenstein.

— **funestus* Er. Bei Villach und Klagenfurt, vereinzelt.

Paromalus **complanatus* Panz. Im oberen Gailtale unter Buchenrinde, nicht selten.

- Saprinus* **lautus* Er. Bei Sachsenburg, selten.
 — **specularis* Mars. Am Gurkufer bei Grafenstein wiederholt gesammelt. Auch im Gailtale nicht selten.
 — **rugiceps* Duft. Auch am Gurkufer bei Grafenstein.
Plegaderus **saucius* Er. Von Gobanz bei Villach gesammelt.
Abraeus **granulum* Er. Bei Unterdrauburg, vereinzelt.

Hydrophilidae.

- Helophorus* **brevitarsis* Kuw. Von Holler am Obir hochalpin gesammelt.
 — **brevipalpis* Bed. Mit voriger Art.
 — — **var. montenegrinus* Kuw. Bei Unterdrauburg (Gobanz).
 — **granularis* L. **var. opacus* Kuw. Von Gobanz bei Eisenkappel gesammelt.
 — **viridicollis* Steph. Auf der Petzen, in einem Wassertümpel, bei 1700 m.
 — **quadrisignatus* Bach. Mit voriger Art.
 — **pumilis* Er. Bei Unterdrauburg.
Hydrochus **elongatus* Schall. Bei Unterdrauburg und St. Paul im Lavantale, in Wassertümpeln, häufig.
Ochthebis **granulatus* Muls. An der Gail, nicht selten.
 — **exsculptus* Germ. Auch bei Eisenkappel.
 — **nobilis* Villa. An der Gail, nicht selten.
 — **metallescens* Rosh. Bei Eisenkappel, selten.
 — **foveolatus* Germ. Seisera, Gailtal, Eisenkappel, mehr minder häufig.
 — — **var. pedicularis* Kuw. Am Seiserabach, unter der Stammform.
Hydraena *riparia* Kug. **var. ♀ sternalis* Rey. Findet sich im Gailtale nicht selten, in Gesellschaft der sehr häufigen Stammform.
 — **morio* Kiesw. Gailtal, nicht selten.
 — **nigrita* Germ. Wie vorige Art.
 — **angustata* Sturm. An der Gail, nicht selten.
 — **lapidicola* Kiesw. In Oberkärnten an Waldbächen, nicht selten, auch bei Eisenkappel.

- Hydraena gracilis* Germ. *var. ♀ *emarginata* Ganglb. Findet sich mit der Stammform bei Eisenkappel und Unterdrauburg.
- **atricapilla* Waterh. Im Gailtale und bei Unterdrauburg, vereinzelt.
- **pygmaea* Waterh. Gailtal, Unterdrauburg, mehr minder häufig.
- Hydrous aterrimus* Eschsch. Auf der Napoleonwiese bei Villach in einem Teiche, auch am Wörthersee (Loretto), vereinzelt.
- Hydrophilus caraboides* L. *var. *intermedius* Muls. Bei Weidmannsdorf, unter der Stammform.
- Anacaena globulus* Payk. *var. *nitidior* Kuw. Umgebung von Klagenfurt, an Waldbächen.
- *limbata* F. *var. *ochracea* Steph. Sattnitz bei Klagenfurt, nicht selten.
- Philydrus minutus* F. Bei Weidmannsdorf, häufig. Im ersten Verzeichnisse mit *Cymbiodyta marginella* F. verwechselt.
- **coarctatus* Grell. In der Glanfurt, selten.
- **fuscipennis* Thoms. Bei Klagenfurt, vereinzelt.
- **quadripunctatus* Hbst. In der Glanfurt bei Klagenfurt, wenige Stücke.
- *testaceus* F. *var. *lineatus* Kuw. Bei Klagenfurt, selten.
- Helochares griseus* F. Hie und da in Gesellschaft von *lividus* Forst., doch seltener als dieser.
- Laccobius nigriceps* Thoms. Auch bei Grafenstein, mehrmals.
- — *var. *maculiceps* Rottbg. Ebendort, mit der Stammform.
- **sinuatus* Motsch. Von Holler bei Weidmannsdorf gesammelt.
- **scutellaris* Motsch. Im ganzen Lande verbreitet, überall selten.
- **alternus* Motsch. Am Ossiachersee und an der Gail, mehr minder häufig.
- Limnebius papposus* Muls. In ganz Kärnten an stehenden Gewässern, häufig.

- Limnebius* **aluta* Bedel. In der Sattnitz und Glanfurt, nicht selten.
 — *picinus* Marsh. Auch bei Klagenfurt (Glanfurt, Weidmannsdorf), nicht selten.
Cercyon littoralis Gyll. Bei Villach, selten.
 — **lugubris* Oliv. Bei Unterdrauburg.
 — *haemorrhoidalis* F. **var. erythropterus* Muls. Hie und da unter der Stammform.
 — *melanocephalus* L. **var. rubripennis* Kuw. Wie vorige Art.
 — *quisquilius* L. **var. Mulsanti* Ganglb. Unter der Stammform, selten.
Cryptopleurum **crenatum* Panz. Vereinzelt im ganzen Lande.

Cantharidae.

- Homaligus fontisbellaquei* Geoffr. **var. monochloros* Torre. Hie und da vereinzelt unter der Stammform.
Dictyopterus rubens Gyll. Auch bei Eisenkappel und Unterdrauburg.
Cantharis **pulicaria* F. Am Maria Saaler Berge, selten.
 — *nigricans* Müll. **var. immaculata* Schilsky.
 — — **var. luteipes* Schilsky. Beide vereinzelt unter der Stammform.
 — **livida* L. Die Stammform vereinzelt bei Klagenfurt.
 — *haemorrhoidalis* F. Auch bei Eisenkappel und Unterdrauburg.
Absidia pilosa Payk. Bei Eisenkappel, subalpin selten.
 — **saxicola* Krauss. In den Steiner Alpen (Grintouz), selten.
Rhagonycha **signata* Germ. Gailtal, selten.
 — *translucida* Kryn. Auch im Gailtale, nicht selten.
 — *limbata* Thoms. Bei Klagenfurt und Unterdrauburg, nicht häufig.
 — **elongata* Fall. Bei Klagenfurt, in Mehrzahl.
Pygidia denticollis Schumm. Bei Ossiach, selten.
Malthinus **seriepunctatus* Kiesw. Diese südliche Art sammelte Gobanz in mehreren Stücken bei Eisenkappel.
 — **fasciatus* Oliv. Bei Klagenfurt, vereinzelt.
 — **facialis* Thoms. Eisenkappel, selten.

- Malthinus *frontalis* Marsh. Bei Klagenfurt, selten.
- Malthodes marginatus* Ltr. Über ganz Kärnten verbreitet, mehr minder häufig.
- **mysticus* Kiesw. Verbreitet, nirgends häufig.
- *Liegeli* Weise. Auch bei Klagenfurt und Eisenkappel.
- *brevicollis* Payk. Im ganzen Lande verbreitet, stellenweise häufig.
- **minimum* L. Unterdrauburg, selten.
- *dispar* Germ. Auch im Gailtale, Eisenkappel, Unterdrauburg, mehr minder häufig.
- *maurus* Cast. Auch bei Eisenkappel.
- — **var. misellus* Kiesw. Verbreitet, doch nirgends häufig.
- **vincens* Greidl. Diese seltene Art, bisher aus Südtirol bekannt, findet sich vereinzelt bei Klagenfurt (Sattnitz, Grafenstein) auf Haselgesträuch.
- **atomus* Thoms. Über ganz Kärnten verbreitet, selten.
- **cyphonurus* Kiesw. Von Gobanz bei Villach erbeutet.
- ♀ *apterus* Muls. Vereinzelt im ganzen Lande.
- Drilus concolor* Ahr. Bei Klagenfurt und Mieß, selten.
- Ebaeus *appendiculatus* Er. Bei Eisenkappel und Unterdrauburg, selten.
- Attalus analis* Panz. In Mittelkärnten, mehr minder häufig.
- Axinotarsus *marginalis* Lap. Bei Klagenfurt und Eisenkappel, vereinzelt.
- Malachius geniculatus* Germ. Auch in der Sattnitz, vereinzelt.
- Anthocomus *rufus* Hbst. Loretto, am Seeufer ein Stück von Holler gefangen.
- Dasytes fuscus* Illig. Auch bei Sachsenburg.
- Dolichosoma *lineari* Rossi. Sachsenburg, Grafenstein, selten.

Ostomidae.

*Nemosoma *elongatum* L. Villach.

Sphaeritidae.

Sphaerites glabratus F. Auch bei St. Paul im Lavanttale, sehr selten.

Nitidulidae.

- Cateretes pedicularius* L. *a. *scutellaris* Leinberg.
 *a. *nigriventris* Leinberg.
 *var. *pallens* Rey. Unter der Stammform, hie und da in Anzahl.
- Heterostomus pulicarius* L. *var. *cinereus* Heer. Bei Klagenfurt unter der Stammform.
- Epuraea depressa* Gyll. *a. *bisignata* Strm. Unter der Stammform, mehr minder häufig.
- *variegata* Hbst. *a. *variabilis* Rtt. und
 — — *a. *monochroa* Rtt. Hie und da unter der Stammform.
- *longula* Er. *a. *Erichsoni* Rtt. Bei Sachsenburg unter der Stammform.
- *distincta* Grimm. Auch bei Eisenkappel und Unterdrauburg.
- *abietina* Sahlb. Auch in der Sattnitz bei Klagenfurt.
- **oblonga* Hbst. Bei Klagenfurt (Sattnitz), Eisenkappel und Mieß, vereinzelt.
- **florea* Er. Verbreitet, überall selten.
- Omosita* **depressa* L. St. Paul im Lavantale.
- Meligethes rufipes* Gyll. Auch bei Villach.
- *coracinus* Strm. *var. *pumilus* Er. Bei Unterdrauburg, selten.
- *aeneus* F. *a. *coeruleus* Marsh. Stellenweise häufig.
- *viridescens* F. *a. *azureus* Heer. Unter der Stammform, selten.
- **subrugosus* Gyll. Sachsenburg, Sattnitz, selten.
- **bidens* Bris. Bei Sachsenburg, in Anzahl.
- **umbrosus* Strm. Bei Villach und Eisenkappel, nicht selten.
- **angustatus* Küst. Diese südliche Art sammelte Gobanz bei Unterdrauburg.
- *haemorrhoidalis* Först. In ganz Kärnten, mehr minder häufig.
- *Kunzei* Er. *var. *blandulus* Rtt. Verbreitet, doch überall selten.

Meligethes **tristis* Strm. Eisenkappel, Unterdrauburg, selten.

— **bidentatus* Bris. Bei Villach und Unterdrauburg.

Cychramus *luteus* F. **var. fungicola* Heer. Verbreitet und nicht selten.

Cybocephalus **festivus* Er. Eisenkappel.

Cyllodes **ater* Hbst. Bei St. Paul im Lavanttale an Buchenschwämmen, selten. Im Gailtale nach E. Klimsch häufig.

Cryptarcha **imperialis* F. Bei Unterdrauburg.

Pityophagus **laevior* Abeille. Oswaldiberg bei Villach, Mieß, je ein Stück.

Cucujidae.

Monotoma conicicollis Guér. Auch Sattnitz, bei *Formica rufa*.

— **quadridentata* Thoms. Unterdrauburg, selten.

Psammoecus bipunctatus F. Auch im Lavanttale (St. Paul).

Laemophloeus **alternans* Er. Sachsenburg, zwei Stück.

— **clematidis* Er. Bei Villach, Eisenkappel, Unterdrauburg. An Waldreben, in den Bohrlöchern von *Xylocleptes bispinus* Dft.

Cryptophagidae.

Paramecosoma melanocephalum Hbst. **var. univeste* Rtt. Eisenkappel.

Pteryngium **crenatum* Gyll. Bisher nur im Mölltale (Mört-schach) und bei Mieß nachgewiesen, sehr selten.

Cryptophagus **pubescens* Strm. Bei Metnitz und Unterdrauburg, sehr selten.

— **validus* Kr. Metnitztal, ein Stück.

— **scanicus* L. Überall häufig.

— — **a. patruelis* Strm. Unter der Stammform, nicht selten.

— **Thomsoni* Rtt. Sachsenburg, Gurktal (Kraßnitz), Klagenfurt, überall vereinzelt.

— **scutellatus* Newm. Bei Villach, selten.

— *dorsalis* Sahlb. Auch bei Sachsenburg.

— *lycoepardi* Hbst. Bei Weidmannsdorf, in Bovisten nicht selten.

- Cryptophagus* **Schmidti* Strm. Sachsenburg.
 — *croaticus* Rtt. Auch bei Sachsenburg.
Emphylus glaber Gyll. Auch bei Obervellach (Mölltal).
Antherophagus **silaceus* Hbst. Bei Villach und Klagenfurt,
 sehr selten.
Grobbernia **fimetarii* Hbst. Mittelkärnten, vereinzelt.
Atomaria **umbrina* Gyll. Bei Villach, selten.
 — **diluta* Er. Eisenkappel, selten.
 — **pulchra* Er. Wie vorige Art.
 — **impressa* Er. Gailtal, Villach, Unterdrauburg, am Ufer
 der Gail und Drau, mehr minder häufig.
 — *grandicollis* Bris. Auch am Dobratsch, sub- und hoch-
 alpin, oft in Anzahl.
 — **scutellaris* Motsch. Bei Unterdrauburg, selten.
 — **atra* Hbst. Desgleichen.
 — **nigripennis* Payk. Bei Villach und Unterdrauburg,
 selten.
 — **frondicola* Rtt. Bei Villach.
Ootypus **globosus* Waltl. Villach, Feldkirchen, Kraßnitz (Gurk-
 tal), Unterdrauburg, vereinzelt.
Ephistemus globulus Payk. **var. dimidiatus* Strm. Unter der
 Stammform.

Erotylidae.

- Tritoma bipustulata* F. **var. binotata* Rtt. Unter der Stamm-
 form, stellenweise nicht selten.
Triplax aenea Schall. Auch im Gailtale, häufig.
 — *rufipes* F. Gailtal, St. Paul im Lavantale, mehr minder
 selten.
Dacne pontica Bedel. Von E. Klimsch im Gailtale (Reisach)
 mehrmals in Anzahl gesammelt.
Diphyllus **frater* Aub. Bei Villach, ein Stück.

Phalacridae.

- Olibrus* **aeneus* F. Weidmannsdorf, vereinzelt.
 — **flavicornis* Strm. Eisenkappel.
 — *affinis* Strm. **v. discoideus* Küst. Unter der Stamm-
 form, nicht selten.

Olibrus bicolor F. *v. *apicatus* Guilleb. und
*v. *obscurus* Guilleb. Finden sich vereinzelt unter
der Stammform.

Stilbus atomarius L. Unterdrauburg, selten.

Lathridiidae.

Lathridius lardarius Deg. Im ganzen Lande verbreitet, mehr
minder selten.

— **Pandellei* Bris. Koralpe, sehr selten.

— **nodifer* Westw. Im ganzen Lande verbreitet, stellen-
weise häufig.

Enicmus consimilis Mannh. Bei Villach.

Cartodere Argus Rtt. Sachsenburg, selten.

Corticaria fulva Comolli. Villach, Kraßnitz im Gurktale, selten.

Mycetophagidae.

Pseudotriphyllus suturalis F. Gailtal, an Baumschwämmen,
selten.

Mycetophagus decempunctatus F. Bad Vellach, sehr selten.

— **multipunctatus* F. Kraßnitz im Gurktale, vereinzelt.

— *fulvicollis* F. Von Forstrat Gobanz bei Seltschach ge-
sammelt.

Litargus connexus Geoffr. Auch bei St. Paul im Lavantale,
selten.

Sphindidae.

Aspidiphorus orbiculatus Gyll. Über ganz Kärnten verbreitet,
stellenweise nicht selten.

Cisidae.

Cis comptus Gyll. Eisenkappel, selten.

— **Jacquemarti* Mell. Wie vorige Art.

— **reflexicollis* Abble. Ebendort.

— *festivus* Gyll. Auch bei Unterdrauburg.

— **vestitus* Mell. Eisenkappel, ein Stück.

Rhopalodontus perforatus Gyll. Gailtal, nicht selten.

Colydiidae.

Synchita humeralis F. **v. obscura* Redtb. Bei Eisenkappel unter der Stammform.

Myrmecoxenus **subterraneus* Chevr. Eisenkappel, Unterdrauburg, bei *formica rufa*, selten.

Endomychidae.

Lycoperdina succincta L. Verbreitet, stellenweise häufiger.

Coccinellidae.

Semiadalia 11-notata Schneid. **a. cardui* Brahm. Vereinzelt im ganzen Lande.

— — **a. 9punctata* Fourcr. Wie vorige Abart.

Aphidecta obliterata L. **fenestrata* Ws. und

— — **a. fumata* Ws. Unter der Stammform bei Klagenfurt, selten.

Adalia conglomerata L. **a. cembrae* Moll. Gurktal, vereinzelt.

Coccinella 10punctata L. Auch die Aberrationen *pellucida* Ws., *lateralis* Ws., *pantherina* Ws., *lateripunctata* Gratl. mehr minder häufig.

Anatis ocellata L. **a. biocellata* Ws. Villach.

— — **a. hebraea* L. Ein Stück bei Klagenfurt.

Myrrha 18guttata L. **a. silvicola* Ws. Unter der Stammform, selten.

Propylaea 14punctata L. **a. biflexuosa* Ws. und

**perlata* Ws. Unter der Stammform, verbreitet und nicht selten.

Brumus oblongus Weidb. In den Karawanken, selten. Auch bei Sachsenburg ein Stück.

Pullus **subvillosus* Goeze. Unterdrauburg.

Scymnus **Apetzi* Muls. Bei Eisenkappel, sehr selten.

Nephus **bipunctatus* Kugel. Villach, auch bei Klagenfurt, sehr selten.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Carinthia II](#)

Jahr/Year: 1910

Band/Volume: [100](#)

Autor(en)/Author(s): Proßen Theodor

Artikel/Article: [I. Nachtrag zum Verzeichnisse der bisher in Kärnten beobachteten Käfer \(1. Fortsetzung\) 235-249](#)