©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Rebelia karawankensis Höfn. Am Obir auch von mir, aber schon bei ca. 1400 *m* gefangen.

Fumea crassiorella Brd. Sehr einzeln im Loibltale vorhanden. Im Juni.

Sesiidae.

Trochilium apiformis Cl. In unserer Gegend verbreitet und nicht selten.

Sciapteron tabaniformis Rott. Ende Juni 1921 traf ich in der Allee der Reichsstraße gegen Maiernigg ein Bäumchen von *Populus tremula,* welches über und über am Stamme geschlüpfte Puppen einer größeren *Sesie* zeigte. Es kann sich meiner Meinung nach nur um diese Art hiebei gehandelt haben.

*Sesia spheciformis Gerning. Neu für Kärnten! Am 1. Juni fing Herr Wilhelm Eberz in Klagenfurt an einem Sahlweidenstrauch bei Maria-Rain ein Pärchen dieser für Kärnten neuen Art.

Cossidae.

*Dyspessa Ulula Bkh. Neu für Kärnten! Anfang Juni 1922 kam diese für Kärnten neue Art zum Karbidlicht im Loibltale bei ca. 1000 *m* Höhe.

Hepiolidae.

Hepialus humuli L. Als neue Standorte dieses Falters seien genannt: Matschacher Alpe in den Karawanken, Würmlacher Alpe im Plöckengebiete, Turracher Höhe. Mitte Juli.

Hepialus sylvinus L. Sehr einzeln abends bei Klagenfurt am Licht angetroffen. Auch bei Friesach.

Einige aberrative Schmetterlingsformen.

Von Ing. Hans Herold.

Unter den im Laufe meiner Sammeltätigkeit gefangenen Schmetterlingen befinden sich aberrative Formen, die in dem mir zur Verfügung stehenden „Schmetterlingsbuch", Berge-Rebel, 8. Auflage, 1910, nicht verzeichnet sind und, wenn vielleicht auch in der Zwischenzeit beschrieben, wegen ihres Vorkommens in Kärnten doch der Erwähnung wert sein dürften.

Von Pieris callidice Esp., der hochalpinen Weißlingart, ein ♂ mit verloschener Apikalzeichnung (Analogie zur *ab.* ♂ *leucotera Stef.* der *P. rapae L.).* Aus dem Glocknergebiet.

Von Pieris napi *ab.* ♂ impuncto Röber, ein Stück mit starker grauer (statt graugrüner) Beschattung der

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Adern auf der weißen (statt gelblichen) Hinterflügelunterseite. Aus dem Hochstuhlgebiet.

Von Euchloe cardamines L. ein ♀ mit dunkelbestäubtem Vorderrand der Vorderflügel. Von der Apikalzeichnung gehen breite, dunkle Bestäubungsstrahlen bis zum Mittelfleck. Von der Göriacher Alm.

Von Colias myrmidone Esp. ein melanotisches ♀, bei dem die dunkle Basalbestäubung sich längs des Vorderrandes der Vorderflügel fortsetzt und vom Saum aus ebenfalls Ausstrahlungen der schwarzen Bestäubung gehen, so daß die orangerötliche Grundfarbe der Vorderflügel nur in einer verhältnismäßig schmalen Fläche vom Mittelfleck zum Innenrand nicht verdüstert erscheint. Aus der Sattnitz.

Von Argynnis pales Schiff. konnte ich eine Analogie mit der *ab. inducta Sahlb.* der Form der Torfmoore *arsilache Esp.* (mit geschwärzten Wurzeln aller Flügel und verbreiterten Mittelquerstreifen) bei einem Stück der hochmontanen Form *pales* aus dem Glocknergebiet feststellen. Die Schwärzung des Wurzelfeldes der Vorderflügel geht bis zum Mittelstreifen, welcher wie alle schwarzen Zeichnungselemente in dieser Fläche stark verbreitert erscheint.

Von Melanargia galathea L. einige ♀♀ mit mehr oder weniger deutlicher Augenzeichnung auf der Hinterflügel-Oberseite. Von den Glanfurtwiesen. (Siehe „Carinthia II", Jahrgang 1921.)

Von Erebia euryale Esp. ein ♂-Stück mit besonders gegen den Vorderrand stark verbreiterter augenloser rostroter Binde der Vorderflügel und nur einigen trüben runden Flecken auf den Hinterflügeln. Aus dem Wischberggebiet.

Ein zweiter Beitrag zur Schmetterlingskunde Kärntens.*)

Von Franz Pehr.

Pamphila palaemon Pall.: In Kärnten bisher nur an wenigen Stellen beobachtet. Der Berichterstatter fing die Art Ende Mai 1921 bei Ruden und Anfang Juni 1922 im Rasinggraben der Koralpe.

Agrotis lucipeta F.: In Kärnten bisher nur im Bleibergtale, in Steiermark in je einem Stück bei Zeltweg, Feldbach, Graz und Tüffer gefangen. Der Berichterstatter fing die

*) Erster Beitrag: „Carinthia II", 1922, S. 96.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Carinthia II

Jahr/Year: 1923

Band/Volume: 112_32_113_33

Autor(en)/Author(s): Herold Hans

Artikel/Article: Einige aberrative Schmetterlingsformen 117-118