


*Abhandlungen
der*
DELATTINIA

Aus Natur und Landschaft im Saarland

Band 25 (1999)



*Arbeitsgemeinschaft für tier- und pflanzengeographische
Heimatsforschung im Saarland e.V.*

Abhandlungen der DELATTINIA
Aus Natur und Landschaft im Saarland

Band 25 (1999)

Herausgegeben von der DELATTINIA

- Arbeitsgemeinschaft für tier- und pflanzengeographische Heimatforschung im Saarland e.V. -
und dem Minister für Umwelt des Saarlandes

SCHRIFTFLEITUNG:
DR. HARALD SCHREIBER

DRUCK:
OFFSETDRUCKEREI CHR. ESCHL
HOCHSTRASSE 4a
D-66583 SPIESEN-ELVERSBERG

VERLAG:
EIGENVERLAG DER DELATTINIA
FACHRICHTUNG BIOGEOGRAPHIE
UNIVERSITÄT DES SAARLANDES
D-66041 SAARBRÜCKEN

ERSCHEINUNGSORT:
SAARBRÜCKEN

Das Titelbild wurde von Kurt Wild entworfen.

Es stellt die Saarschleife dar, die als das überregional bekannteste saarländische Landschaftsmotiv angesehen werden kann.

Inhalt:

Dewes, E.: Die Ameisenfauna (Hymenoptera, Formicidae) des Wolferskopfes bei Beckingen	5
Lillig, M.: Die Schwarzkäfer des Saarlandes Teil I: Die Unterfamilien Pimeliinae, Tenebrioninae und Diaperinae (Coleoptera: Tenebrionidae)	33
Trockur, B. und A. Didion: Fortpflanzungsnachweise der Zierlichen Moosjungfer, <i>Leucorrhinia caudalis</i> CHARPENTIER, 1840 im Moseltal	57
Schmitt, J. A.: Neues zum Informationsgehalt von Arten/Areal-Kurven. Die Ermittlung von Artendiversität R, Minimum-Areal M und Mittlerer Artendensität D aus Teilflächen-Untersuchungen eines Gebietes über die Statistische, Hyperbolische, Kumulative Arten/Areal-Kurve am Beispiel Höherer Pilze	67
Schneider T. und C. Schneider: Funde bemerkenswerter und gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen im Saarland und seinen Randgebieten, 1. Folge (1993 - 1999)	211
Weicherding, F.-J.: Die Farnhybride <i>Polypodium x mantoniae</i> ROTHM. im mittleren Saartal	297

Funde bemerkenswerter und gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen im Saarland und seinen Randgebieten, 1. Folge (1993-1999)

zusammengestellt von

Thomas und Claudia Schneider

Kurzfassung: Es wird über Neufunde und Bestätigungen gefährdeter und seltener Farn- und Blütenpflanzen im Saarland und seinen Randgebieten berichtet, die überwiegend aus der Zeit nach dem Erscheinen des Minutenfeldatlases "Die Gefäßpflanzen des Saarlandes mit Verbreitungskarten", von SAUER (1993) stammen.

Schlüsselwörter: Pteridophyta, Spermatophyta - Flora des Saarlandes und seiner Randgebiete (Frankreich: Lothringen, Luxemburg: Gutland, Rheinland-Pfalz: Regierungsbezirk Trier, Landkreis Trier-Saarburg und Regierungsbezirk Koblenz, Landkreis Birkenfeld, Pfalz). Seltene und gefährdete Arten. Neufunde, Bestätigungen

1. Einleitung

Seit Erscheinen des Minutenfeldatlases der saarländischen Gefäßpflanzen von E. Sauer ("Die Gefäßpflanzen des Saarlandes mit Verbreitungskarten", SAUER 1993) sind mittlerweile 6 Jahre vergangen. Seit dieser Zeit sind viele bemerkenswerte Pflanzenfunde erfolgt, deren Standorte vielfach nur auf den Notizblättern oder in den Köpfen der Entdecker schlummern.

Wir wollen im Rahmen einer regelmäßig erscheinenden Reihe damit beginnen, das seit dieser Zeit von Botanikern und von anderen Naturkundlern gesammelte Datenmaterial einer interessierten Öffentlichkeit bekannt und zugänglich zu machen. Gleichzeitig wollen wir einen Beitrag zur Vervollständigung der Minutenfeldkartierung der Flora des Saarlandes und seiner Randgebiete liefern und die Kenntnis über die Flora unserer Region verdichten.

2. Kartiergebiet, Sippenauswahl, Nomenklatorische Referenz

Das Kartiergebiet der floristischen Kartierung des Saarlandes und seiner Grenzgebiete umfasst alle Messtischblätter (TK25) mit saarländischem Anteil (und sei er noch so klein) sowie zusätzlich das MTB 6510 Glan-Münchweiler. Liegt ein Fund außerhalb der Grenzen des Saarlandes, ist dies gesondert vermerkt.

In dieser ersten Folge sollen überwiegend Funde aus den Jahren 1993 bis 1999 berücksichtigt werden, die bisher nicht im Minutenfeldatlas verzeichnet sind. Aufgenommen wurden in erster Linie Pflanzenarten, die im Saarland bisher als gefährdet eingestuft wurden (vgl. SAUER 1988, KORNECK, SCHNITTLER & VOLLMER 1996); darüber hinaus auch Arten, die neu für unsere Flora gefunden wurden, allgemein selten sind oder die in einem Landschaftsraum besonders selten sind. Neben Neufunden der oben genannten Arten für das Minutenfeld, werden aktuelle

Bestätigungen von Rastermeldungen besonders seltener oder gefährdeter Arten aufgenommen. Kriterium hierfür ist die Einstufung in der Roten Liste des Saarlandes in Kategorie 2, 1 oder 0. Gleichfalls aufgeführt werden Bestätigungen der zeitlich indifferenten Meldungen, die aus dem Manuskript der Verbreitungskarten zu der 1990 von Haffner veröffentlichten Arbeit (HAFFNER 1990) von Sauer in den Minutenfeldatlas unter dem Status "H" übernommen wurden, sofern sie den bisher genannten Kriterien entsprechen. Nicht berücksichtigt wurden in dieser ersten Folge Meldungen aus dem Obersteiner Naheengtal zw. Bahnhof Heimbach und Idar-Oberstein (6309 Birkenfeld-Ost). Dieser Naturraum zeichnet sich bereits durch einen massiven Einfluss der nahezufischen Flora aus. Die Aufarbeitung der Funde aus dieser Region, die im Minutenfeldatlas nicht berücksichtigt wurden, hätte den Rahmen dieser Veröffentlichung gesprengt und soll späteren Veröffentlichungen vorbehalten bleiben.

Die Nomenklatur richtet sich, sofern nichts Gegenteiliges erwähnt ist, nach der Standardliste der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands (WISSKIRCHEN & HAEUPLER 1998). Weicht die Bezeichnung der Sippe von dem im Minutenfeldatlas gewählten Namen ab, wird die von SAUER (1993) benutzte Sippenbezeichnung gesondert angegeben. In einzelnen Fällen wurde auch der taxonomische Bezug zu KORNECK, SCHNITTLER & VOLLMER (1996) hergestellt.

Um dem Leser den Vergleich der Fundmeldungen mit den Verbreitungskarten bzw. dem Text des Minutenfeldatlases zu erleichtern, werden Kartenummer und Seitenzahl des Textteils mitgeteilt. Ebenso wird die Gefährdungskategorie der Roten Liste angegeben. Referenz für den angegebenen Rote Liste-Status ist die auf SAUER (1988) und SAUER (1993) basierende Einstufung in der Synopse der Florenlisten der Länder in KORNECK, SCHNITTLER & VOLLMER (1996). Bei nicht gefährdeten Arten wird die Statusangabe der o.g. Florenliste übernommen.

3. Mitarbeiter

Ohne das umfangreiche Datenmaterial, das uns von folgenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Floristischen Kartierung in der Sektion Gefäßpflanzen der DELATTINIA zur Verfügung gestellt wurde, wäre das Zusammenstellen der Fundortmeldungen nicht möglich gewesen (nachgestellt die verwandten Namenskürzel):

Steffen Caspari (St. Wendel)	CaS
Karl Heinz Dierstein (Völklingen)	DiK
Ulf Heseler (St. Ingbert)	HeU
Walter Hoffmann (Saarbrücken)	HoW
Kartiergruppe Saarbrücken unter Leitung von F.-J. Weicherding	KSb
Matthias Madsen (Sbr.-Dudweiler)	MaM
Piers Sander (Saarbrücken)	SaP
Dr. Erhard Sauer (Sbr.-Dudweiler)	SaE
Thomas Schneider (St. Ingbert)	ScT
Claudia Schneider (St. Ingbert)	ScC
Roland Skrabber (vormals Ham-sous-Varsberg)	SkR
Aloysius Staudt (Schmelz)	StA
Peter Steinfeld (St. Ingbert)	StP
Franz-Josef Weicherding (Sbr.-Dudweiler)	WeJ
Peter Wolff (Sbr.-Dudweiler)	WoP


Gedankt sei ferner all denjenigen, die Einzelnachweise beigesteuert haben.

4. Fundmeldungen

Alle Meldungen wurden einer kritischen Prüfung unterzogen. Fehlbestimmungen, die erst nachträglich bemerkt werden oder irrtümliche Rasterangaben sollten später berichtigt werden. Ansonsten sind alle Melder für die Richtigkeit ihrer Angaben selbst verantwortlich.

Fundmeldungen für die nächste Folge zu bemerkenswerten und gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen aus dem Saarland und seinen Randgebieten können weiterhin an die Adresse der Autoren übermittelt werden. Hierfür stehen für jeden Mitarbeiter ein Merkblatt und eine Diskette mit einer individuellen Meldedatei zur Verfügung, die gesondert angefordert werden können.

Struktur der Meldungen



Das Ende einer Fundortangabe ist durch einen Strichpunkt (Semikolon) markiert. Abweichend von den Rechtschreiberegeln beginnt in unseren Texten das folgende Wort stets mit einem Großbuchstaben, um eine bessere optische Trennung der Angaben zu erreichen.

Abkürzungen:

Lagebezeichnungen zu der dem Fundort nächst gelegenen Ortschaft:

N = nördlich,	S = südlich,
NE = nordöstlich,	SW = südwestlich,
E = östlich,	W = westlich,
SE = südöstlich,	NW = nordwestlich

Politische Zuordnung:

(keine Angabe) = Saarland,
Lu = Luxemburg,

- Lo = Lothringen, Dep. Moselle,
 Tr = Rheinland-Pfalz, Regierungsbezirk Trier,
 Ko = Rheinland-Pfalz, Regierungsbezirk Koblenz, Kreis Birkenfeld
 Pf = Rheinland-Pfalz, Pfalz

Referenz zum Minutenfeldatlas (SAUER 1993):

- A: = Atlas
 K # = Kartenummer der Verbreitungskarte
 S # = Seitenzahl des Textteils

Angaben zur Rote Liste und Florenliste:

- RL SL = Einstufung in der Roten Liste und Florenliste bei
 KORNECK, SCHNITTLER & VOLLMER (1996) für das Saarland
 B = Einstufung in der Roten Liste und Florenliste bei
 KORNECK, SCHNITTLER & VOLLMER (1996) für Deutschland
 * = vorkommend (und nicht als gefährdet eingestuft)
 • = möglicherweise zu erwarten, aber bislang nicht sicher nachgewiesen
 - = fehlend
 0 = ausgestorben oder verschollen
 1 = vom Ausstreben bedroht
 2 = gefährdet
 4 = potentiell gefährdet
 ' = Änderung von KORNECK, SCHNITTLER & VOLLMER (1996) gegenüber SAUER
 (1988)
 " = Änderung der Autoren gegenüber KORNECK, SCHNITTLER & VOLLMER (1996)
 (bei offensichtlich irrtümlicher Einstufung)
 ! = stark verantwortlich (nur Rote Liste Deutschland)

***Aceras anthropophorum* - Ohnsporn**

A: K 926, S195 / RL SL 3, B 3

Trockenrasen am S-Hang des Kreuzberges zwischen Kirf und Meurich S Pkt. 363,3, 11 Ex. (Tr) (6404/235), CaS 95; W-Hang des Hollenbach-Tales NE Freching (Lo) (6504/333φ), DiK 93; Alter Kalksteinbruch S Hemmersdorf (6605/413), StP & DiK 98; Wiese SW Bambusch NE Téterchen (Lo) (6705/314), DiK 93; Kalksteinbruch W Berus (6706/121), ScT u. P. Maas 85; Bebuschter Halbtrockenrasen beim N.D. SE Güdingen (6708/333), StP 93; Bebuschter Halbtrockenrasen am Sommerberg NW Bliesbolchen (6808/232), StP 97; Verbrachter Halbtrockenrasen oberhalb d. Landstr. S Auersmacher (6808/313), StP 92; S-Hang im Blies-Tal SE Habkirchen (6808/425), DiK 96; Halbtrockenrasen am Südhang d. Rohrentales W Rubenheim (6809/122), StP 98; Halbtrockenrasen unterhalb des Steinbruchs NW Rubenheim (6809/123), StP 98; Halbtrockenrasen am Waldrand bei Höhe 299,0 W Walsheim (6809/134), StP 99; Kleiner Halbtrockenrasen am Schreckelbach E Böckweiler (6809/214), StP 96; Halbtrockenrasen am Südwesthang d. Rußtales E Altheim (6809/225), StP 99; Halbtrockenrasen am Kloppberg SW Reinheim (6809/311), StP 95.

***Acinos arvensis* - Feld-Steinquendel**

A: K 531, S 120 / RL SL *

“Hoemerich” E Holling (Lo) (6705/131φ), ScC & ScT 99; Ruderalfläche am Güterbahnhof E Rodenhof (6708/311), WeJ 98; Ruderalfläche am Güterbahnhof Béning (Lo) (6806/415), WeJ 98; Ruderalfläche am Güterbahnhof Forbach (Lo) (6807/115), KSb 99.

***Actaea spicata* - Christophskraut**

A: K 133, S 49 / RL SL *

Kerbtälchen am Ransbacher Berg NW Bliesransbach (6808/125), KSb 99.

***Adonis aestivalis* - Sommer-Adonisröschen**

A: K 140, S 50 / RL SL 2, B 3

Getreidefeld N Hirnberg NW Rammelfangen (6605/413!), DiK 98, ScT 99; S-Hang E Moulin de Felschling S Berviller (Lo) (6705/224), SkR 85; W-exponierter Stufenhang zum Berviller Bachtal N Merten (Lo) (6705/235), ScT & SkR 86; N- und W-Hang Neuves Terres E Betting-lès-St. Avold (Lo) (6806/425), ScC & ScT 90.

***Aethusa cynapium* ssp. *elata* (= *A. cynapium* ssp. *cynapioides*) - Wald-Hundspetersilie**

A: K 433, S 100 / RL SL *

Mehrere Stellen in der Illaue bei Bubach (6507/432), ScT & StA 93; Illaue zwischen Bubach und Calmesweiler (6507/433), ScT & StA 93; Illaue in Eppelborn (6507/434), ScT & StA 93; Illaue bei Hosterhof (6608/113), ScT & StA 93; Illaue S Wustweiler (6608/113), ScT & StA 93; Wegrand im Saarkohlenwald S Riegelsberg (6707/213), KSb 98.

***Agrimonia procera* - Großer Odermennig**

A: K 245, S 68 / RL SL *

Höllscheider Tal, an 2 Stellen am Weg W Niederwürzbach (6709/311), HeU 98; SE-Rand des Dellfelder Waldes NW der Ziegelhütte von Dellfeld (Pf) (6710/414), SaE 99.

***Agrostis vinealis* (= *A. stricta*) - Sand-Straußgras**

A: K 820, S 175 / RL SL *

“Verkehrinsel” in der AS St. Ingbert-West N Sengscheid (6708/232), ScT 99.

***Aira caryophyllea* [s.l.] - Nelken-Haferschmiele**

A: K 816, S 174 / RL SL 3

Wiesen S Idar-Oberstein (Ko) (6309/214), ScC & ScT 96; Wiesen SE Hammerstein (Ko) (6309/214 u. 224), ScC & Sc T 96; Alter Steinbruch N des Loterflosses S Düppenweiler

(6506/431), ScT 94; Auf Sand N Bahndamm NE Bruchmühlbach (Pf) (6610/213), WoP 94; Industriebrache NE Überherrn (6706/313), SaP 98; Brasche im Ludwigsparkstadion W Rodenhof (6707/235), WeJ 98; Sandflächen im Allmend E Neue Bremm (6707/435), WeJ 99; Sportplatz "Kitten" in Dudweiler (6708/113), WeJ 99; Rasen zwischen Straße u. Schwimmbad in Dudweiler (6708/124), SaP 98; Sandrasen "Auf dem Hobels", St. Ingbert (6708/233), HeU 99; Brasche auf dem Sportplatz Kieselhumes am Rotenbühl Saarbrücken (6708/312), WeJ 97; St. Arnualer Wiesen E St. Arnual (6708/322), SaP 98 99; Colonie Neuland zw. Diesen u. Ham (Lo) (6806/111), CaS, ScC & ScT 95; Sandflächen bei Bellevue N Forbach (Lo) (6807/115), WeJ 99.

***Aira praecox* - Frühe Haferschmiele**

A: K 815, S 174 / RL SL 2

Industriebrache an der AS SLS-Steinrausch SE Dillingen (6606/411), SaP 98; Industriebrache "Huf" E Altforweiler (6706/124), SaP 98; Häsfeld E Altforweiler (6706/124, 125, 134 u. 135), StA 99; Sandrasen bei Möbel Martin S Ensdorf (6706/212), SaP 98; Zw. Ensdorf u. Bous (6706/212), StA 99; Industriebrache NE Überherrn (6706/313), SaP 98.

***Ajuga genevensis* - Genfer Günsel**

A: K 262, S 116 / RL SL 3

Ruine Merburg N Kirrberg (6610/333), HeU 93; Magerrasen am Wegrand W Wickersberg W Ensheim (6708/431), HeU 98; NSG Monbijou E Althornbach (Pf) (6710/335), WoP 94; Lückiger Kalkmagerrasen, Pionierstelle SE Utweiler, SW Chapelle Ormersviller (Lo) (6809/424), HeU 99.

***Alchemilla flicaulis* - Fadenstengliger Frauenmantel**

A: K 263, S 70 / RL SL *

Hänge zum Alsweiler Bach S d. alten Bahnhofs Tholey (6508/113), ScT & StA 93; Südl. Quellarm d. Limbwiesbaches N d. Bänkert b. Berschweiler (6508/311), ScT 93; Quellgebiet d. Ahlenbaches SW Mainzweiler (6508/432), ScT 93; Wiesen S des Aérodrome SW des Waldes "Forst" NE Neunkirch-lès-Sarreguemines (seit einigen Jahren zum großen Teil durch Pferdebeweidung stark gefährdet) (Lo) (6808/422), ScC & ScT 94.

***Alchemilla glaucescens* - Graugrüner Frauenmantel**

A: K 262, S 70 / RL SL *, B 3

Wiesen NE Sportplatz Birkenfeld (Ko) (6309/131), ScC, ScT & HeU 97.

***Alchemilla monticola* - Bergwiesen-Frauenmantel**

A: K 262, S 70 / RL SL *

Vor allem in den submontanen und montanen Lagen des Saar-Nahe-Berglandes und des Hunsrücks verbreitet. Im Saarkohlenwald selten, tritt die Art in den kollin und schwach submontan

geprägten Landschaftsräumen im südlichen und westlichen Kartiergebiet stark zurück und ist nur sehr selten zu beobachten. Neue Beobachtungen aus dieser Region:

Grasige Böschung am Weg von Contwig in das Gutebrunnental (Pf) (6710/232), SaE 99.

***Alisma gramineum* - Grasblättriger Froschlöffel**

A: K -, S 156 / RL SL -

G. Zenner hat diese Art 1970 für das Kartiergebiet von den Kiesweihern bei Nennig gemeldet. Seit dieser Zeit gab es weder Bestätigungen noch Neufunde dieser Art. Der folgende Fund ist somit der erste Nachweis nach 29 Jahren!

Kiesgrubenteiche SW Nennig (6404/323), WoP 99.

***Alisma lanceolatum* - Lanzettblättriger Froschlöffel**

A: K -, S 155 / RL SL *

Flur "Breitenbusch" S Gaubiving (Lo) (6807/411), ScC & ScT 95.

***Allium ursinum* - Bär-Lauch**

A: K 737, S 161 / RL SL *

Prallhang der Niederschleife NW Niedaltdorf (6605/315φ), ScT & StA 95; Vorderstewald S Guerstling (Lo) (6605/325φ), ScT 99; Tal der Bibiche und Stockholz N Bouzonville (Lo) (6605/332), ScT 99; Grossenwald W Heining-lès-Bouzonville (Lo) (6605/335), ScC & ScT 99; S-Hang E Moulin de Felschling S Berviller (Lo) (6705/224), SkR 85; W-exponierter Stufenhang zum Berviller Bachtal N Merten (Lo) (6705/235), ScT & SkR 86; Hang am Köllerbach und Wald am Hauptfriedhof Völklingen (6707/132), WeJ 99; Feuchtes Tal im Saarkohlenwald W Rußhütte (6707/234), KSb 98; Feuchtes waldiges Tal N Rodenhof (6707/235), WeJ 98; Autochthon im alten Friedhof Alt-Saarbrücken (6707/424), WeJ 99; Hang im Kasental St. Annual (6707/425), WeJ 99; Böschungen am Sulzbach in Sulzbach (6708/114), WeJ 97; Zum Sulzbach exponierter Waldhang "Am Homburg" (6708/131), WeJ 99; Eschberghang am Kobenhüttenweiher E Rotenbühl Saarbrücken (6708/312), WeJ 97; Bachlauf in Hahnenklamm S Bübingen (6808/123), WeJ 98.

***Alopecurus aequalis* - Ziegelrotes Fuchsschwanzgras**

A: K 830, S 176 / RL SL 3

Weiher am unteren Ailsbach E Hosterhof (6608/114), ScT 93; Weiherufer W St. Annual (6707/435), WeJ 99.

***Alopecurus rendlei* - Aufgeblasenes Fuchsschwanzgras**

A: K -, S 176 / RL SL 2, B 2

Begraster, feuchter Erdweg im Tal des Ruisseau de Weistroff SE Waldweistroff (Lo) (6605/131), ScC & ScT 99; Häufig in mageren Feuchtwiesen und -weiden am Ruisseau de

Weistroff zw. Waldweistroff u. Flastroff (Lo) (6605/131 u. 132), ScT 99; Auwiesen an der Niedbrücke von Niedwelling (Lo) (6605/325), H. Wachter 93, ScC & ScT 99; Feuchter Weg am Stockholz N Bouzonville (Lo) (6605/331), ScC 93; Wiesen in der Niedaue ca. 400 m vor der Brücke S Filstroff (Lo) (6605/332), ScC & ScT 99; Wiesen in der Niedaue Flur "Trouch" N Bouzonville (Lo) (6605/332), ScC & ScT 99; Flur "Surwiese" u. in großen Beständen in der Niedaue in der Flur "Niedra" W Bouzonville (Lo) (6705/111), ScC & ScT 99; Niedaue E Diding (Lo) (6705/111φ), ScC & ScT 99; Niedaue in der Flur "Schlagborn" SW Bouzonville (Lo) (6705/112 u. 122), ScC & ScT 99; Niedwiesen in der Flur "Klopp" NW Vaudreching (Lo) (6705/112), ScC & ScT 99; Niedaue in der Flur "Goutenparc" zwischen Freistroff und Rémfang (Lo) (6705/121), ScC & ScT 99; Niedwiesen NW Rémfang (Lo) (6705/121), ScT 88, ScC & ScT 99; ScC & ScT 99; Feuchte Wiesen und Erdweg am Birmichel N Velving (Lo) (6705/313), ScC & ScT 99.

***Alyssum alyssoides* - Kelch-Steinkraut**

A: K 192, S 59 / RL SL 2

Aufgelassene Gipsgrube auf dem Hiewelberg W Remich, v.a. an Kaninchenlöchern (Lu) (6404/311), CaS 99; Bruchfeld des Kalksteinbruchs S Hemmersdorf (6605/413), ScT 99.

***Amaranthus blitoides* - Westamerikanischer Fuchsschwanz**

A: K -, S 41 / RL SL u

Ruderalflächen am Saarufer in Alt-Saarbrücken (6707/414), WeJ 99.

***Amaranthus blitum* (= *A. lividus*) - Aufsteigender Fuchsschwanz**

A: K 84, S 41 / RL SL u

Hackfruchtgarten in der Breitener Straße in St. Wendel-Alsfassen (6508/225), CaS 99.

***Anacamptis pyramidalis* - Hundswurz**

A: K 929, S 195 / RL SL 2, B2

Trockenrasen am S-Hang des Kreuzberges zwischen Kirf und Meurich S Pkt. 363,3 (Tr) (6404/235), CaS 95; W-Hang des Hollenbach-Tales NE Freching (Lo) (6504/333φ), DiK 93; Kalksteinbruch Berus (6706/121), ScT u. P. Maas 85; St. Annualer Wiesen in Saarbrücken (6708/322), WeJ & M. Biegi 98; Kalköfenhübel, Halbtrockenrasen an der Skihütte Kirrberg S Kirrberg (6710/113), HeU 99; Magere Mähwiese am Battenberg NW Grosbliederstroff (Lo) (6808/121), StP 92; Halbtrockenrasen am Südhang des Kreuzberges S Bliesmengen (6808/413), StP 92; Halbtrockenrasen am Südhang d. Rohrentales W Rubenheim (6809/122), StP 99; Halbtrockenrasen am Südwesthang d. Rußtales E Altheim (6809/225!), StP 99; Halbtrockenrasen am Nassen Wald NE Riesweiler (6809/414φ), StP 92; Halbtrockenrasen am Osthang b. Schäfersmühle N Guiderkirch (Lo) (6809/422), StP 96.

***Anagallis minima* (= *Centunculus minimus*) - Kleinling**

A: K 466, S 108 / RL SL 3, B 3

Waldwegrand und Aufschüttung S der BAB-Auffahrt Birkenfeld im Zuge der planfestgestellten Trasse der B41 SW Neubrücke (6309/331 u. 6409/111), CaS 99.

***Anchusa arvensis* ssp. *arvensis* - Acker-Krummhals**

A: K 493, S 115 / RL SL *

In den Kalkgebieten und im südwestlichen Prims-Blies-Hügelland wird die Art nur selten gefunden. Meldungen aus diesen Gebieten:

Acker über Lösslehm S Wald "Ewig" S Grindorff (Lo) (6605/122), ScC & ScT 99; Acker am südöstlichen Quellarm des Ruisseau d'Ottonville NE Ottonville (Lo) (6705/323), ScT & P. Haffner 86.

***Anemone ranunculoides* - Gelbes Windröschen**

A: K 137, S 50 / RL SL *

Die Art wird als Frühjahrsgeophyt gerne übersehen und ist vermutlich wesentlich häufiger als die Karte im Minutenfeldatlas zeigt. Neue Meldungen:

Forêt Communale de Filstroff (Lo) (6605/313), ScC & ScT 93; Niederschleife NW Niedaltdorf (6605/315), ScT u. StA 95; Bachau des Schalbachs SW Wittersheim (6808/225), HeU 97; Bliesau W Blies-Schweyen SE Bliesransbach (6808/231), HeU 93; Blies-Aue S Frauenberg (Lo) (6808/423), ScC & ScT 95.

***Anthriscus caucalis* - Hunds-Kerbel**

A: K -, S 99 / RL SL u

Vermutlich unbeständig an Bahngleisen bei der Wiesenstraße Malstatt (6707/413), WeJ 97.

***Arabis glabra* - Turmkrout**

A: K 190, S 58 / RL SL 3

Felsen am Limberg S Rehlingen (6606/313), WeJ 99; Straßenbrücke in Nähe der Universität N St. Johann (6708/133), WeJ .

***Arabis hirsuta* - Behaarte Gänsekresse**

A: K -, S 58 / RL SL *

Wiesen in der Niederschleife NW Niedaltdorf (6605/315), ScT u. StA 95; Gebüsch auf Schlackenhalde E Petite Rosselle (Lo) (6707/333), WeJ 99.

***Arctium tomentosum* - Filzige Klette**

A: K 666, S 146 / RL SL *

Oberhalb Bliesufer Wiebelskirchen (6609/122), WoP 99.

***Arenaria leptoclados* - Dünnstengeliges Sandkraut**

A: K-, S 42 / RL SL u"

Rand der Industriebahn N der Brücke der Straße von Ixheim nach Mittelbach über den Hornbach bei Ixheim (Pf) (6710/322), SaE 99.

***Armeria maritima* ssp. *elongata* (= *A. elongata*) - Sand-Grasnelke**

A: K -, S 107 / RL SL 2, B 3

Armeria-Rasen "Häsfeld" E Altforweiler (6706/124!), SaP 98 99; NSG Eulenmühle N Friedrichweiler (6706/231!), SaP 98; Industriebrache NE Überherrn (6706/313), SaP 98; Pferdekoppel im Industriegebiet Saarbrücken-Süd (6707/425!), SaP 98; Straßenrand E Güterbahnhof Saarbrücken (6708/131), SaP 98-99.

***Arnica montana* - Arnika**

A: K 656, S 144 / RL SL 2, B 3

Dombach N Züsch (Tr) (6308/121), StA 99; Am östlichen Straßenrand der Straße nach Zinershütten an deren einziger Stelle mit südöstlicher Laufrichtung am W-Rand von Abt. 113 (Tr) (6308/123!), CaS 95; Borstgrasrasen ca. 100 m NE der Einmündung der Straße von Zinershütten in die Straße Züsch-Muhl (Tr) (6308/123!), CaS 95; (1) magere Stellen in der Wiese N Hengstbach im nach Osten vorspringenden Zipfel des Regierungsbezirkes Trier sowie (2) großes Vorkommen in Borstgrasbrache nordwestlich des zwischen (1) und (2) gelegenen Fichtenriegels zwischen 1000 und 1200 m ENE Kirche Muhl (Tr) (6308/124), CaS 95; Wiesen am Einsiederhof S Börfink (Ko) (6308/125), ScC 97; Magerweidenkomplex "Im Bruch" zwischen Ortslage Zinershütten und dem Königsbach (Tr) (6308/132), CaS 95; Borstgrasbrache unmittelbar südlich der beiden Teiche am oberen Königsbach ca. 200 m WSW Pkt. 563,6 N Zinershütten (Tr) (6308/133), CaS 95; Wiesenbrache im Götzenbachtal W Hattgenstein (Ko), ScC 96; Langwiese S Börfink (Ko) (6308/221!), ScC 97; Wiese am Arthenberg NW Abentheuer (Ko) (6308/231), ScC 96; Wiesen W Ellenberg (Ko) (6308/234), ScC 97; Waldwiese im "Hinzhausen" NW Brücken (Ko) (6308/411), ScC 97; Wiesen "Im Grämel" W Meckenbach (Ko) (6308/431!), ScC 97; Wiesen NE Sportplatz Birkenfeld (Ko) (6309/131), ScC, ScT & HeU 97.

***Arnosseris minima* - Lämmersalat**

A: K 689, S 150 / RL SL 2

Besseringen (6505/223), StA 99.

***Aruncus dioicus* - Wald-Geißbart**

A: K -, S 66 / RL SL 0

Unter Laubwald im Obertal W Niederwürzbach (6709/311), HeU 98; Wolfsacht zw. Friedhof und Kugelfanghütte S Wattweiler (Pf) (6709/425), HeU 94.

***Asarum europaeum* - Haselwurz**

A: K -, S 35 / RL SL 4

Wegrand E Rote Hecke W Althornbach (Pf) (6710/332), WoP 98.

***Asclepias syriaca* - Syrische Seidenpflanze**

A: K -, S 109 / RL SL u

Wegrand und Bahnlinie W Überherrn (6706/312), WoP 99.

***Asperula cynanchica* - Hügel-Meister**

A: K 474, S 110 / RL SL *

Im Bliesgau fehlt der Hügelmeister heute. Auch im Westrich sehr selten. Neue Meldung: Waldsaum des "Kleinbirk" SE Schweyen (Lo) (6810/135), HeU 98.

***Asplenium ceterach* (= *Ceterach officinarum*) - Schriftfarn**

A: K 18, S 25 / RL SL 2, B 3

Mauer einer offenen Drainage entlang des Bahnkörpers S Bahnhof Brettnach (Lo) (6705/134), KG Moose 95; Mauer an der Anc. Moulin de Felschling SW Berviller-en-Moselle (Lo) (6705/234), KG Moose 95; Mehrfach in alten Kalkmörtelmauern in Reinheim, davon an einer massenhaft (6809/311), ScT 95.

***Asplenium scolopendrium* (= *Phyllitis scolopendrium*) - Hirschzunge**

A: K 19, S 25 / RL SL 3

Weißer Fels am Kieselberg N Merzig (6505/133), ScT 93; Auf Kalktuffsteinen im Kerbtal zw. Hangelberg u. Jagdhütte NW Menningen (6506/332), ScT 91; Steinbruch am Glederberg W Dalem (Lo) (6705/411), ScC & ScT 91; Mauer in altem Bahneinschnitt Heidstock (6707/133), WeJ 99; Felsen am Rothe Berg N Spicheren (Lo) (6707/434), WeJ 99; Felsen an Spicherer Höhen SW St. Arnual (6707/435), WeJ 99; Fels im Grumbachtal S Bischmisheim (6708/324), WeJ 99; Alter Steinbruch S Nußweilerhof W Ommersheim (6708/434), HeU 94; Früher an der Mauer der Mühle "Tschifflick-Niederauerbach". Nach Abriss des Gebäudes an die östliche Begrenzungsmauer des Grundstücks verpflanzt. Dort gut angekommen. (Pf) (6710/134), SaE 99; Nordexponierte Buntsandsteinwand S Walshausen, SW Zweibrücken (Pf) (6710/434), HeU 98; Steinbruch am Simbachtal SW Unner (Lo) (6808/111), KG Moose 98; Mauerreste am Wehr an der Blies S Sitterswald (6808/325), ScT 98; Schacht (Kalkstein) im Ausgrabungsgelände N Bliesbruck (Lo) (6809/321), WoP 96, WeJ 97.

***Atriplex oblongifolia* - Langblättrige Melde**

A: K -, S - / RL SL *

Ruderalfläche an der Lebacher Straße in Malstatt (6707/414), WeJ 99.

***Barbarea intermedia* - Mittleres Barbarakraut**

A: K 178, S 57 / RL SL *

Ruderalflächen im Ludwigsparkstadion W Rodenhof (6707/235), WeJ 98.

***Betula pubescens* [s.l.] - Moor-Birke**

A: K 43, S 32 / RL SL *

Neue Funde außerhalb der Silikatgebiete in Landschaftsräumen, in denen die Art nur vereinzelt auftritt:

Forêt Domaniale de Bouzonville NW Filstroff (Lo) (6605/321), ScT u. SaP 99; Saarkohlenwald Nähe Forsthaus Neuhaus NW Fischbach (6707/215), KSb 99; Im Wald auf wechselfeuchten versauerten Decklehmen im Waldzipfel am Rande des Flugplatzes Zweibrücken unmittelbar NNE des NSG Monbijou (Pf) (6710/335), SaE 99.

***Bistorta officinalis* (= *Polygonum bistorta*) - Wiesenknöterich**

A: K 64, S 36 / RL SL *

Meldungen außerhalb der submontanen Silikatgebiete:

Hartbornwald E Oberesch (6605/115), ScT 99; Feuchtwiesen am Gisinger Bach W Gisingen (6605/424), ScT 99; Wiesen S Flugplatz Düren (6606/331), ScC & ScT 99; "Unterster Wald" N Behren-lès-Forbach (Lo) (6807/222), ScT 91.

***Blechnum spicant* - Rippenfarn**

A: K 28, S 27 / RL SL 3

Neue Meldungen außerhalb des Hunsrücks und des Homburger Beckens:

Mühlenbachtal S Spiesen (6608/435), HeU 97-99; Wald auf pleistozänem Sand E Petite Rosselle (Lo) (6707/334), WeJ 99; Wald auf Mittlerem Buntsandstein E Neuweiler (6708/115), KSb 99; Wald auf Mittlerem Buntsandstein NW Rentrish (6708/125), WeJ 98; Südrand Franzosengrab, Rand eines Bruchs E St. Ingbert (6708/224), HeU 94; Schwarzweihertal N Blieskastel-Lautzkirchen (6709/135), HeU 96; Seitental des Lauterbaches zw. Abt. 54 u. 51 des Staatsforst Warndt S Weiherdamm E Lauterbach (6806/211), KG Moose 96.

***Blysmus compressus* - Zusammengedrückte Quellbinse**

A: K -, S 182 / RL SL 1, B 2

Wiesentuff ESE Altenberg bei Kirf ca. 300 m SSW Breitenacker, reichlich (Tr) (6404/415), CaS 95; Quellige kalkreiche Nassbrache, S Punkt 330,3 N Böckweiler (6809/213), MaM 96.

***Bolboschoenus maritimus* - Strandsimse**

A: K 857, S 181 / RL SL 2

Linkes Saarufer W Dillingen (6606/132), WoP 98; Absinkweiher der Grube Reden in Landsweiler-Reden (6608/412), WeJ 97; Staunasse Halde am Kraftwerk Ens Dorf (6706/212f), WoP 95; Uferbereich am Folsterweiher Alt-Saarbrücken (6707/423), WeJ 97.

***Botrychium lunaria* - Echte Mondraute**

A: K 10, S 23 / RL SL 2, B 3

Borstgrasrasen ca. 100 m NE der Einmündung der Straße von Zinershütten in die Straße Züsch-Muhl (Tr) (6308/123), CaS 95; Magere Stelle in der Wiese N Hengstbach im nach Osten vorspringenden Zipfel des Regierungsbezirkes Trier ca. 1200 m ENE Kirche Muhl (Tr) (6308/124), CaS 95; An zwei Stellen in noch genutzten Borstgrasrasen (1) zwischen zwei Quellarmen und (2) östlich der beiden Quellarme eines Seitenbaches des Königsbaches zwischen Retzenhöhe und "Im Bruch" ca. 430 m SE Pkt. 592,7 N Züsch (Tr) (6308/132), CaS 95; Wiesen NW Leitzweiler (Ko) (6309/334), ScC 97; 2 Stellen am SW-expon. Hang des Bruchelsbachtals NE Alsweiler (6508/115), ScT & StA 93, StA 93; SE-expon. Hang des Bruchelsbachtals NE Alsweiler (6508/115), ScT & StA 93; Quellbereich des Seelbaches NE Wustweiler (6508/334), ScT 93; Oberes Merchbachtal W Merchweiler (6608/133), ScT & StA 93; Magerwiese S Schürener Bruch N St. Ingbert-Schüren (6608/432), HeU 90; Magerwiese W Glashütter Weiher N St. Ingbert-Rohrbach (6708/215), HeU 94; Rohrbachtal, Magerwiese, S Gebrannter Wald NW St. Ingbert-Rohrbach (6708/215), HeU 98; "Verkehrinsel" in der AS St. Ingbert-West N Sengscheid (6708/232), ScT 99; Magere Wiesen auf Mittlerem Buntsandstein in der Flur "Hoff" S Cité des Genêts zw. Diesen u. Ham (Lo) (6806/111), CaS, ScC & ScT 95.

***Botrychium matricariifolium* - Ästige Mondraute**

A: K -, S 23 / RL SL 1, B 2!

2. Fundstelle im Warndt ca. 1 km von dem von Andrejewski (LEMOINE 1985) 1983 im Warndt bei Ham neu entdeckten Vorkommen:

Magere Wiesen auf Mittlerem Buntsandstein in der Flur "Hoff" S Cité des Genêts zw. Diesen u. Ham (Lo) (6806/111), CaS, ScC & ScT 95.

***Bromus benekenii* - Rauhe Wald-Trespe**

A: K 798, S 171 / RL SL *

Wald "Ewig" S Grindorff (Lo) (6605/122), ScC & ScT 99; Côte de Thédning (W Klingelstauden) NW Thédning (Lo) (6807/313), M. Greff, ScC, ScT & WoP 95; Im Hinterwald und Wälder auf Kappelberg NW Bliesransbach (6808/125), KSb 99; Saarbrücker Stadtwald N Hartungshof N Bliesransbach (6808/221), ScC, ScT & O. Orschiedt 88.

***Bromus commutatus* - Verwechselte Trespe**

A: K 803, S 172 / RL SL *

Äcker nahe Pkt. 349,5 auf der Höhe NW des Truppacher Hofes (Pf) (6710/315), SaE 99; Acker 500 m SWS des Klosterwaldhofes N Monbijou (Pf) (6710/335), SaE 99.

***Bromus racemosus* - Traubige Trespe**

A: K 802, S 172 / RL SL *, B 3

Wiesen NE Achtelsbach (Ko) (6308/421), ScC 97; Mehrfach in feuchten Wiesen und Weiden im Tal des Ruisseau de Weistroff zw. Waldweistroff und Flastroff (Lo) (6605/131), ScC & ScT 99, ScT 99; Wiesen im Remelbach-Tal S Colmen (Lo) (6605/133), ScT 99; Wiesen E des Forêt Communale de Filstroff, ScC & ScT 92; Flur "Surwiese" u. Niedaue in Flur "Niedra" W Bouzonville (Lo) (6705/111), ScC & ScT 99; Niedwiesen in der Flur "Klopp" NW Vaudreching (Lo) (6705/112), ScC & ScT 99; Niedwiesen NW Rémelfang (Lo) (6705/121), ScC & ScT 99; Feuchtwiesen am Bach S Birmichel N Velving (Lo) (6705/313), ScC & ScT 99; Wiesen E Flur "Neuglen" N Téterchen (Lo) (6705/314), ScC & ScT 99; Wiesen am Ruisseau d'Ottonville SW Ottonville (Lo) (6705/321), ScC & ScT 99; Feuchtweide am Ham-Bach S Chapelle St. Joseph S Ormersviller (Lo) (6809/424), ScC & ScT 93; Feuchtwiesen am Ham-Bach S Ormersviller (Lo) (6809/425), ScC & ScT 93.

***Bromus ramosus* [s.str.] - Hohe Wald-Trespe**

A: K 797, S 171 / RL SL *

Wegsäume im Forêt Communale de Sierck (Lo) (6504/335), ScC & ScT & SaE 92; Waldwegsäume im Wald "Ewig" S Grindorff (Lo) (6605/122), ScC & ScT 99; Wegsäume im Wald "le Busch" zw. Flastroff u. Zeurange (Lo) (6605/123), ScT 99; Säume im Tiergarten-Wald S Colmen (Lo) (6605/133 u. 313), ScT 99; Forêt Domaniale de Bouzonville S Ferme de Dampont N Filstroff (Lo) (6605/312), ScC & ScT 99; Wegsäume im Bois de Velving NE Velving (Lo) (6705/313 u. 314), ScC & ScT 99; Waldrand auf Karbonlehm SE Forsthaus Neuhaus (6707/215), WeJ 99.

***Bromus tectorum* - Dach-Trespe**

A: K 795, S 171 / RL SL *

Außerhalb des wärmebegünstigten Mittleren Saartals und des Raumes Saarbrücken - Homburg selten:

Offenerdige Stellen auf Bunkern der Maginot-Linie am Bovenberg NW Ottonville (Lo) (6705/321), ScC & ScT 99; Colonie Neuland zw. Diesen u. Ham (Lo) (6806/111), CaS, ScC & ScT 95.

***Bunium bulbocastanum* - Knollenkümmel**

A: K 426, S 99 / RL SL 3

Im Saar-, Nied- und Moselgau sowie im Keuperhügelland Lothringens weit verbreitet, ist die Art im Bliesgau und Westrich seltener. Verbreitungslücken schließen folgende Meldungen: Wegrand E Rote Hecke W Althornbach (Pf) (6710/332), WoP 98; Ackerrand "Auf der Burg" W Ormersviller, SE Utweiler (6809/414), HeU 99; Ackerrand NW Riesweiler (6809/414), CaS 98.

***Butomus umbellatus* - Schwanenblume**

A: K 717, S 156 / RL SL 2

Kiesgrubenteiche E Buprich (6507/322), WoP 99; Mehrfach an der Nied zw. Niedwelling u. dem Grafenthal (6605/135, 231, 315 u. 411), CaS 97; Selten an der Nied zw. Niedmühle u. B 406 SE Eimersdorf (6605/215 u. 225φ), CaS 97; Verbreitet zw. der Wackenmühle SW Hemmersdorf und der Niedmühle S Eimersdorf (6605/224, 225φ, 232, 233, 234φ u. 235), CaS 97; Niederschleife NW Niedaltdorf (6605/315), ScT u. StA 95; Nied N Brücke Filstroff (Lo) (6605/323), WoP 94; Altarm an der Niedmündung (6606/111φ), CaS 97.

***Calamagrostis arundinacea* - Wald-Reitgras**

A: K 825, S 176 / RL SL *

Trockene Waldböschung E Dudweiler (6708/125), WeJ 98; Wald beim Schießstand am Schwarzenberg N Scheidt (6708/133), WeJ 98; Wald auf Schwarzenberg N Scheidt (6708/134), WeJ 98; Wald in Nähe d. Schwarzenbergturms N Rotenbühl Saarbrücken (6708/313), WeJ 98.

***Callitriche platycarpa* - Flachfrüchtiger Wasserstern**

A: K 506, S 116 / RL SL *

Die Art ist bisher deutlich unterkartiert bzw. nicht immer von anderen *Callitriche*-Arten unterschieden worden, so dass die Atlaskarte den Eindruck deutlicher Verbreitungslücken erweckt. Einige Vorkommen in "Verbreitungslücken":

Mardellen im Forêt Communale de Sierck (Lo) (6504/335), ScC & ScT & SaE 92; Tümpel auf dem Kleinen Stiefel E Scheidt (6708/315), WeJ 99; Teich an der ehemaligen Kläranlage SE Hassel (6709/131), HeU 98, det. P. Wolff; Colonie Neuland zw. Diesen u. Ham (Lo) (6806/111), CaS, ScC & ScT 95.

***Camelina microcarpa* ssp. *sylvestris* - Kleinfrüchtiger Leindotter**

A: K -, S - / RL SL *

Westhang des Kirschenberges E Valmunster (Lo) (6705/312), ScC & ScT 90.

***Campanula persicifolia* - Pfirsichblättrige Glockenblume**

A: K 614, S 136 / RL SL *

Felsen an der Scheidterbergstraße E Scheidt (6708/314), WeJ 98; Lichter Waldhang im Spicherer Tal N Alsting (Lo) (6807/215), KSb 98.

***Carex binervis* - Zweinervige Segge**

A: K 890, S 127 / RL SL 2, B 3

Am südlichen Rand der Waldstraße NE Höllenschlag zwischen Sandkopf und Großer Prims ca. 150 m E Pkt. 651,5 E Thiergarten (Tr) (6308/111), CaS & Hand 95; Linker Quellbach der

Großen Prims, zugleich Abfluss des namenlosen Bruches in der SE-Ecke des Minutenfeldes E Thiergarten (Tr) (6308/111), CaS 99; Am Berührungspunkt des namenlosen Bruchs NW Sandkopf mit der Waldstraße ca 100 m WSW Pkt. 676,8; südlicher Wegrand E Thiergarten (Tr) (6308/112), CaS & Hand 95; Hengstbach-Quellgebiet, zwei Stellen an Wegrändern NE des Hengstbaches ca. 530 bzw. 630 m NW Pkt. 618,0 NW Muhl (Tr) (6308/113), CaS 95; Nordöstlicher Rand des von der Mittelschneise zum Pkt. 735,6 (Reg.-Bez.-Grenze) steil bergauf verlaufenden Waldweges, ca. 500 m NW Pkt. 735,6 E Thiergarten (Tr) (6308/113), CaS 95; Nördlicher Wegrand des ersten den vom Pkt. 683,3 WSW Ochsenbruch nach NW führenden Weg querenden Waldweg dicht bei der Wegkreuzung W Börfink (Ko) (6308/114!), CaS 95; Am südlichen Rand der Waldstraße N Höllenschlag zwischen Diebskopf und Großer Prims ca. 330 m SE Pkt. 609,7 E Thiergarten (Tr) (6308/121!), CaS & Hand 95; Fraubachtal (Dombachtal), kleines Restmoor zwischen Fichten NW Retzenkopf oberhalb des Wasserbehälters ca. 500 m NW Pkt. 660,4 N Züsch (Tr) (6308/121!), CaS 95; Fraubachtal (Dombachtal), moorige Stelle beim Abzweig eines untergeordneten Forstweges etwa 200 m oberhalb der vorigen Fundstelle, ca. 825 m NNW Pkt. 660,4 (Retzenkopf-Gipfel) N Züsch (Tr) (6308/121!), CaS 95; An drei Stellen im Königsbach-Quellgebiet Abt. 100 ca. 175-250 m SE Pkt. 627,8 an der Straße Züsch-Muhl (Tr) (6308/123), CaS 95; Borstgrasrasen ca. 100 m NE der Einmündung der Straße von Zinershütten in die Straße Züsch-Muhl (Tr) (6308/123), CaS 95; Im *Juncion squarrosi* in Wiesenbrache zwischen Fichtenstreifen N Hengstbach im nach Osten vorspringenden Zipfel des Regierungsbezirkes Trier (Abt. 134) ca. 1000 m ENE Kirche Muhl (Tr) (6308/124), CaS 95; NW-Rand des ehem. Gunnesbruches, abgeschobene Fläche in Abt. 46 ca. 250 m SSW Pkt. 576,2 an der Straße Neuhütten-Muhl (Tr) (6308/133), CaS 95; Oberlauf des Königsbaches in naturnahem Abschnitt unterhalb der Querung durch die Straße Neuhütten-Muhl ca. 250 m WSW Pkt. 576,2 (Tr) (6308/133), CaS 95; Südteil des ehem. Gunnesbruches, in noch offenem Moorrest ca. 380 m NE Pkt. 578,3, NE Zinershütten (Tr) (6308/133), CaS 95; Feuchter Waldweg auf der Regierungsbezirksgrenze Trier-Koblenz ca. 350 m N Tirolerstein NE Zinershütten (Tr/Ko) (6308/134), CaS 95; Mooriger Graben ca. 100 m NNE Sportplatz Scheiden (6406/134), CaS 99.

***Carex brizoides* - Zittergras-Segge**

A: K 876, S 185 / RL SL 3

Vorkommen außerhalb des Verbreitungsschwerpunktes im Saarkohlenwald, der St. Ingberter Senke und dem Homburger Becken:

Bachtal N B41 E Birkenfeld (6309/131), ScC 96; Jungenwald SE Sprengen (6607/333), KG Moose 97; Rand der Illaue an der Kirche in Wemmetsweiler (6608/125), StA 93.

***Carex canescens* - Sumpf-Grau-Segge**

A: K 881, S 186 / RL SL 3

Dombach N Züsch (Tr) (6308/121 u. 131), StA 99; Wiesen "Im Grämel" W Meckenbach (Ko) (6308/431), ScC 97.

***Carex demissa* (= *C. tumidicarpa*) - Grünliche Gelb-Segge**

A: K 893, S 188 / RL SL 3

***Carex demissa* (= *C. tumidicarpa*) - Grünliche Gelb-Segge**

A: K 893, S 188 / RL SL 3

Die Art hat Verbreitungsschwerpunkte in den Naturräumen des Hunsrücks und seines Vorlandes, dem Prims-Hochland und Nohfelden-Hirsteiner Bergland mit Randgebieten, dem Saarkohlenwald und dem Homburger Becken. Außerhalb, besonders in den Kalkgebieten, ist sie selten. In letzteren beschränkt sie sich auf vernässte Decklehme. Auch HÄFFNER (1990) nennt keine Fundstellen aus dem Keuperhügelland. Meldungen aus diesen Regionen:

Illquelle N Urexweiler (6508/315), StA 93; Zertrampelte Quellstelle an einem N-exponierten Hang zum Franken-Bach N Dirmingen (6508/333), ScT & StA 93; Forêt Domaniale de Bouzonville NW Filstroff (Lo) (6605/322), ScC & ScT 99; Mulde am "Kreckelbach" S Wiesbach (6607/214), ScT & StA 93; Nasswiesenrest im Quellbereich des Malzbaches in Kaisen (6608/131), ScT & StA 93; SE-Hang in der Flur "Faulheck" N Voelfling (Lo) (6705/212), ScC & ScT 99; Staunasse Halde am Kraftwerk Emsdorf (6706/212), StA 95; Feuchtgebietsreste am Bruchwald NE Neuweiler (6708/115), WeJ 99; Feuchtwiese im Grumbachtal S Sengscheid (6708/411), WeJ 99; Feuchte Lichtung auf Römischer Kopf N Alsting (Lo) (6808/111), WeJ 98.

***Carex distans* - Entferntährige Segge**

A: K 891, S 187 / RL SL 2, B 3

Wiesentuff ESE Altenberg bei Kirf, ca. 300 m SSW Breitenacker (Tr) (6404/415), CaS 95; In Feuchtwiesen SW Horesselberg S Flastroff (Lo) (6605/132), ScT 99; Auwiesen in der Flur "Surwiese" W Bouzonville (Lo) (6705/111), ScC & ScT 99; Niedwiesen in der Flur "Klopp" NW Vaudreching (Lo) (6705/112), ScC & ScT 99; Niedwiesen NW Rémelfang (Lo) (6705/121), ScC & ScT 99; Quellhorizont am W-exponierten Stufenhang zum Berviller Bachtal N Merten (Lo) (6705/235), ScT & SkR 86; Quellige Wiese W Lauterbachsklamm E Heckendalheim (6708/423), HeU 99; Quellige kalkreiche Nassbrache am Stufenhang zum Kalbenberg E Ballweiler (6709/334), MaM 96; E "Ackerbuesch" W Spicheren (Lo) (6807/213), ScT 91; Spitzwald und Umgebung zw. Tenteling u. Gaubiving (Lo) (6807/421), ScC & ScT 90; Quellige kalkreiche Nassbrache NE Jungenwald S Bebelshem (6808/415), MaM 96; Quellige kalkreiche Nassbrache am Stufenhang zum Hanickel SW Wolfersheim (6809/114), MaM 96; Quellige kalkreiche Nassbrache, NW Himsklamm E Niedergailbach (6809/324), MaM 96; Quellige kalkreiche Nassbrache nahe Spring-Quelle SW Utweiler (6809/423), MaM 96.

***Carex divulsa* s.str. - Unterbrochenährige Segge**

A: K 871 S 184 / RL SL *"

In völlig typischer Ausbildung am Feldwirtschaftsweg zwischen B10 und der Autobahn W des Weihertalkopfes (Pf) (6710/424), SaE 99.

***Carex echinata* - Igel-Segge**

A: K 879, S 185 / RL SL 3

Dombach N Züsch (Tr) (6308/131), StA 99; Erlenbestand am Rohrbach N Berschweiler (6508/132), StA 93; Feuchtwiese am Schullandheim SE Berschweiler (6508/313), ScT & StA 93; Teichränder an der Ill-Quelle N Urexweiler (6508/315), StA 93; Nasswiese am "Rübendell" N Seibertswald SE Urexweiler (6508/325), ScT & StA 93; Quellige Wiese im Quellbereich des Malzbaches in Kaisen (6608/131), ScT & StA 93.

Carex elata - Steife Segge

A: K -, S 189 / RL SL 3

Mardellen in Laubwäldern oberhalb der Niederschleife NW Niedaltdorf (6605/135), ScT 99; Neuwoogmoor W Miesau (Pf) (6610/115), WoP 73.

Carex elongata - Walzen-Segge

A: K 880, S 186 / RL SL *

Dombach N Züsch (Tr) (6308/121 u. 131), StA 99; Mardellen im Forêt Communale de Sierck (Lo) (6504/335), ScC 91; Mardellen im "Giewerst"-Wald S Biringen (6505/333), ScT 99; Mardellen im "Paffesch" u. "Rehendriesch" E Flaastroff (Lo) (6605/124 u. 125), ScT 99; Mardellen im Grand Bois de Waldweistroff SE Waldweistroff (Lo) (6605/131φ), ScC & ScT 99; Tiergarten-Wald S Colmen (Lo) (6605/133 u. 313), ScT 99; Forêt Domaniale de Bouzonville N Filstroff (Lo) (6605/312, 321 u. 322), ScC & ScT 99; Forêt Communale de Filstroff (Lo) (6605/313), ScC & ScT 92; Mardellen im Stockholz N Bouzonville (Lo) (6605/331), ScC 93; Erlenbruch im Gehlenbachtal S Klarenthal (6707/324), WeJ 99; Erlenbruch im unteren Gehnbachtal W St. Ingbert (6708/221), HeU 94; Mardelle im Buchwald S Théding (Lo) (6807/335), ScC & ScT 94; Mardellen im Spitzwald zw. Tenteling u. Gaubiving (Lo) (6807/411), ScC & ScT 90.

Carex lepidocarpa - Schuppenfrüchtige Gelb-Segge

A: K 892, S 188 / RL SL 1, B 3

Wiesentuff ESE Altenberg bei Kirf, ca. 300 m SSW Breitenacker (Tr) (6404/415), CaS 95; Kalktuffquelle am SW-exp. Hang vom "Wolferskopf" zum "Wolfsbach" W Haustadt (6506/333), ScT 91; Quelle am W-exponierten Stufenhang zum Berviller Bachtal N Merten (Lo) (6705/235), ScT & SkR 86; Quellige kalkreiche Nassbrache NE Jungenwald S Bebelshem (6808/415), MaM 96; Quellige kalkreiche Nassbrache am Stufenhang zum Hanickel SW Wolfersheim (6809/114), MaM 96; An mehreren Stellen in quelligen kalkreichen Nassbrachen nahe Spring-Quelle SW Utweiler (6809/423), MaM 96; Kalk-Quellmoor am Ham-Bach S Ormersviller (Lo) (6809/425), ScC & ScT 93, ScC & ScT 95, MaM 96.

Carex montana - Berg-Segge

A: K -, S 189 / RL SL 2

Wegrand E Rote Hecke W Althornbach (Pf) (6710/332), WoP 98.

Carex nigra - Braune Segge

A: K 900, S 189 / RL SL *

In den Silikatgebieten sehr verbreitet, tritt *C. nigra* in den Kalkgebieten stark zurück: Mehrfach in mageren Feuchtwiesen am Ruisseau de Weistroff SE Waldweistroff u. SW Flaastroff (Lo) (6605/131 u. 132), ScC & ScT 99, ScT 99; Feuchte Wiesen im Tal des Remelbaches SE Colmen (Lo) (6605/133), ScT 99; Flur "Breitenbusch" S Gaubiving (Lo) (6807/411), ScC & ScT 95; Feuchtwiesen E des Spitzwaldes SE Ippling (Lo) (6808/331), ScC & ScT 92.

***Carex otrubae* - Hain-Segge**

A: K 869, S 184 / RL SL *

Feuchter Erdweg S Wald "le Busch" zw. Flastroff u. Zeurange (Lo) (6605/123), ScT 99; Feuchter Saum N Wald "Paffesch" E Flastroff (Lo) (6605/124), ScT 99; Tal des Ruisseau de Weistroff SW Flastroff (Lo) (6605/132), ScT 99; Tal des Remelbaches S Colmen (Lo) (6605/133), ScT 99; Wiesenbrachen E Forêt Communale de Filstroff (Lo) (6605/313), ScC & ScT 92; Forêt Domaniale de Bouzonville NW Filstroff (Lo) (6605/322), ScC & ScT 99; Le Stockholz und Umgebung N Bouzonville (Lo) (6605/331), ScC 93; Tal der Bibiche N Bouzonville (Lo) (6605/332), ScT 99; Wiesen im Quellgebiet des Weinbaches ("Gisinger Wiesen") E Gisingen (6605/425), ScC & ScT 99; Wiesenbrachen S Birmichel N Velving (Lo) (6705/313), ScC & ScT 99; Wiesenbrachen E Flur "Neuglen" E Velving (Lo) (6705/314), ScC & ScT 99; südöstlicher Quellarm des Ruisseau d'Otonville NE Otonville (Lo) (6705/323), ScT & P. Haffner 86; "Thal" NE Ebring (Lo) (6807/421), M. Greff, ScC, ScT & WoP 95; Feuchtwiesen E des Spitzwaldes SE Ippling (Lo) (6808/331), ScC & ScT 92; Wiesen S des Aérodrome SW des Waldes "Forst" NE Neunkirch-lès-Sarreguemines (Lo) (6808/422), ScC & ScT 94.

***Carex ovalis* (= *C. leporina*) - Hasen-Segge**

A: K 878, S 185 / RL SL *

C. ovalis tritt in den Kalkgebieten deutlich zurück und ist hier selten auf Lösslehmen zu finden: Umgebung von Schwerdorff (Lo) (6605/125), ScT 99; Forêt Domaniale de Bouzonville S Ferme de Dampont N Filstroff (Lo) (6605/312), ScC & ScT 99; Forêt Domaniale de Bouzonville NW Filstroff (Lo) (6605/322), ScC & ScT 99.

***Carex pallescens* - Bleiche Segge**

A: K 894, S 188 / RL SL *

C. pallescens ist in den Kalkgebieten selten:

Mehrfach im "Rehendriesch" NW Schwerdorff (Lo) (6605/124 u. 125), ScT 99; Wald "Paffesch" E Flastroff (Lo) (6605/124), ScT 99; Mehrfach im Forêt Domaniale de Bouzonville N Filstroff (Lo) (6605/311, 312, 321 u. 322), ScT & SaP 99, ScC & ScT 99; Forêt Communale de Filstroff (Lo) (6605/313), ScC & ScT 92; Bois de Velving NE Velving (Lo) (6705/313 u. 314), ScC & ScT 99; "Unterster Wald" NW Etzling (Lo) (6807/212), ScT 91.

***Carex paniculata* - Rispen-Segge**

A: K894, S 188 / RL SL *

Rand des Alsbachtals gegenüber der alten Mühle in Ortslage Berschweiler (6508/322), ScT & StA 93; Unterlauf eines Quellbaches N Führberg W Wemmetsweiler (6608/135), ScT & StA 93; Erlenbruch im Gehlenbachtal S Klarenthal (6707/324), WeJ 99; Feuchtweide am Ham-Bach S Chapelle St. Joseph S Ormersviller (Lo) (6809/424), ScC & ScT 93.

***Carex pendula* - Hänge-Segge**

A: K 886, S 187 / RL SL *

Lochbach zw. Hülzweiler u. Ensdorf (6606/434), StA 99; Werbeln (6706/413), StA 99.

***Carex pilulifera* - Pillen-Segge**

A: K 899, S 189 / RL SL *

Meldungen aus Kalkgebieten:

Forêt Domaniale de Bouzonville S Ferme de Dampont N Filstroff (Lo) (6605/312), ScC & ScT 99.

***Carex pseudocyperus* - Schein-Zypergras-Segge**

A: K -, S 186 / RL SL 2

Mehrfach in Mardellen im Tiergarten Wald S Colmen (Lo) (6605/133 u. 313), ScT 99; Mardellen im Forêt Domaniale de Bouzonville N St. Oswald NW Filstroff (Lo) (6605/321), ScT & SaP 99.

***Carex pulicaris* - Floh-Segge**

A: K -, S 190 / RL SL 2, B 2

Genutzte Niedermoorwiese nördlich des Fichtenriegels im Zuge der alten Straßentrasse ca. 175 m SE Pkt. 618,9 SW Muhl (Tr) (6308/123!), CaS 95; Feuchte Stellen in einer Magerwiese ca. 625 m SE Reiterhof Retzenhöhe, ca. 300 m NW Pkt. 533,1, Züsch wenige Ex. (Tr) (6308/132), CaS 95; Talsenke N der Hütte im südwestlichen Teil des Waldes "Hahn" nahe des großen Waldweges, N Wolfersweiler (6409/121), O. Göhl 97.

***Carex riparia* - Ufer-Segge**

A: K 883, S 186 / RL SL *

C. riparia ist in den Großseggenrieden der Keupergebiete auf den Messtischblättern 6605 und 6705 verbreitet, während sie außerhalb des Keuperhügellandes selten ist. Meldungen außerhalb dieses Raumes:

"Herrgottswiese" an der Rossel NE Ludweiler-Warndt (6706/425), ScC 94; Bist zw. Diesen u. Ham (Lo) (6806/111), CaS, ScC & ScT 95.

***Carex rostrata* - Schnabel-Segge**

A: K 884, S 187 / RL SL 3

Im nördlichen Saarland im Hoch- und Idarwald, dem Prims-Hochland und dem Hirsteiner Bergland weit verbreitet, im Homburger Becken verbreitet und von dort zertreut bis in die St. Ingberter Senke, im Prims-Blies-Hügelland sehr zertreut mit lokalem Schwerpunkt westlich der Blies. Im restlichen Prims-Blies-Hügelland wie in den anderen Landschaftsräumen des Kartiergebietes sehr selten. Meldungen aus diesen Regionen:

Unterlauf des Merschbaches SW Alswailer (6508/134), ScT & StA 93; Lochwiesbach im Verlandungsbereich eines aufgelassenen Teiches W Berschweiler (6508/311), ScT 93; In Gräben im Alsbachtal S Marpingen (6508/313), ScT 93; Rand des Alsbachtals gegenüber der alten Mühle in Ortslage Berschweiler (6508/322), ScT 93; Mulden und Gräben am Rande des Illtals zwischen Urexweiler und Hirzweiler (6508/325), ScT & StA 93; Quellmulde am Ahlenbach N des Hexenberges N Welschbach (6508/431), StA 93; Quellmulde an einem Quellarm des Ahlenbaches W des Johanneshof N Welschbach (6508/432), ScT 93; Ehemals größerer Bestand am Wiesbach N des Hahnenwaldes, durch "Biotoptümpel" teilweise vernichtet (6607/215), ScT & StA 93; Seifenwies NW Hüttigweiler (6608/114), ScT 93; Nasse Mulde am Malzbach zwischen Gebelsberg und Hungerflur E Kaisen (6608/123), ScT 93; Gräben und Mulden an einem West-Ost verlaufendem Nebenbach der Ill W Wemmetsweiler (6608/125), ScT & StA 93; Unterlauf eines Quellbaches N des Führberges W Wemmetsweiler (6608/125), ScT & StA 93; Bach zur Hirzweiler Mühle NW Ziegelhütte (6608/211), StA 93.

***Carex strigosa* - Dünnährige Segge**

A: K -, S 187 / RL SL -

Wald "le Busch" zw. Flastroff u. Zeurange (Lo) (6605/123), ScT 99; Grand Bois de Bibiche NW Filstroff (Lo) (6605/311), ScT & SaP 99; Forêt Communale de Filstroff (Lo) (6605/313), ScC & ScT 93; Forêt Domaniale de Bouzonville NW St. Oswald NW Filstroff (Lo) (6605/321), ScT & SaP 99; Forêt Domaniale de Bouzonville NW Filstroff (Lo) (6605/322), ScC & ScT 99; Bachlauf in Talsohle am Felsenbrunnen SE Sengscheid (6708/412), WeJ 99.

***Carex tomentosa* - Filz-Segge**

A: K 898, S 189 / RL SL *

Außerhalb der Kalkgebiete ausgesprochen selten:

Wegrand in einem Waldstück über Kohlenlehm E Rußhütte (6707/235), WeJ 98.

***Carex umbrosa* - Schatten-Segge**

A: K -, S 188 / RL SL *

In Eichen-Hainbuchen-Wäldern auf Mittlerem Keuper NW Filstroff verbreitet.

Grand Bois de Bibiche NW Filstroff (Lo) (6605/311), ScT & SaP 99; Forêt Domaniale de Bouzonville S Ferme de Dampont N Filstroff (Lo) (6605/312), ScC & ScT 99; Forêt Communale de Filstroff (Lo) (6605/313), ScC & ScT 93; Forêt Domaniale de Bouzonville NE St. Oswald NW Filstroff (Lo) (6605/321), ScC & ScT 93, ScT & SaP 99; Forêt Domaniale de Bouzonville NW Filstroff (Lo) (6605/322), ScC & ScT 93, 99.

***Carex vesicaria* - Blasen-Segge**

A: K 885, S 187 / RL SL 3

In den Silikatgebieten weit verbreitet (wenn auch nicht unbedingt häufig), findet sich *C. vesicaria* in den Kalkgebieten nur sehr sporadisch:

Mardellen im Forêt Communale de Sierck (Lo) (6504/335), ScC 91; "Jungert"-Wald bei Bir-

ingen (6505/335), ScT 99; Alkest-Wald N Oberesch (6505/335), ScT 99; Mardellen im Grand Bois de Waldweistroff SE Waldweistroff (Lo) (6605/131), ScC & ScT 99; Mardellen bei Colmen (Lo) (6605/133), ScT 99; Forêt Domaniale de Bouzonville S Ferme de Dampont N Filstroff (Lo) (6605/312), ScC & ScT 99; Forêt Communale de Filstroff (Lo) (6605/313), ScC & ScT 92; Tiergartenwald S Colmen (Lo) (6605/313), ScT 99.

***Carex viridula* var. *viridula* (= *C. oederi*) - Gewöhnliche Späte Gelb-Segge**

A: K -, S 188 / RL SL 2

Teichufer mit sandigem Torf NE Bruchmühlbach (6510/434), WoP 98; Heute erloschen im Königsbruch, Westteil N Homburg-Bruchhof (6610/132), WoP 69.

***Carex vulpina* - Fuchs-Segge**

A: K 870, S 184 / RL SL 3, B 3

Flutmulde in der Mörschbach-Aue in Wolfersweiler (6409/121), O. Göhl 97; Flutmulden in der Illaue bei Bubach (6507/432), ScT & StA 93; Flutmulden in der Illaue N Eppelborn (6507/435), ScT & StA 93; Flutmulden in der Illaue talabwärts der Klingelfloß-Mündung NE Eppelborn (6507/435), ScT & StA 93; Flutmulden in der Illaue in Dirmingen (6508/321), ScT & StA 93; Flutmulden in Wiesen am Ruisseau de Weistroff SE Waldweistroff (Lo) (6605/131), ScC & ScT 99; Wiesen am NW-Rand des Bois de Bliesbruck (Lo) (6809/332), ScC & ScT 96.

***Carex x elytroides* (= *C. nigra* x *C. acuta*) - Hybride zw. Braun-Segge und Schlank-Segge**

A: K -, S -

Kirkelerbachtal N Lautzkirchen (6709/231), WoP 70.

***Carum carvi* - Wiesen-Kümmel**

A: K 438, S 102 / RL SL *

Die Art tritt in den warmen Tallagen zurück; vereinzelt in den Niedwiesen bei Bouzonville beobachtet:

Niedwiesen in der Flur "Klopp" NW Vaudreching (Lo) (6705/112), ScC & ScT 99; Niedwiesen NW Rémfang (Lo) (6705/121), ScC & ScT 99.

***Catabrosa aquatica* - Europäisches Quellgras**

A: K -, S 170 / RL SL *, B 2

Ehemals beweidete Feuchtrache am Sulzbach E Urexweiler (6508/421), ScT & StA 93; Auf Teichauhub am waldseitigen Rand eines Fischteiches im Bachtälchen W Schwarzenholz (6607/311), CaS 99; Zertretene, aktuell aber nicht beweidete Quellbachmulde N Stenweiler-Ziegelhütte (6608/211), CaS 99.

***Centaurea stoebe* - Gewöhnliche Rispen-Flockenblume**

A: K -, S. 149 / RL SL n

Rand des Panzerübungsgeländes SE Fraulautern (6606/423), SaP 98.

***Centaureum pulchellum* - Ästiges Tausendgüldenkraut**

A: K 466, S 108 / RL SL *

Offene Erdwege im Forêt Communale de Sierck (Lo) (6504/335), ScC & ScT & SaE 92; Feuchte Ackerränder S Wald "Ewig" S Grindorff (Lo) (6605/122), ScC & ScT 99; Südöstlicher Quellarm des Ruisseau d'Ottonville NE Ottonville (Lo) (6705/323), ScT & P. Haffner 86; W Altenkessel (6707/135), StA 98; Ackerrand Flur Vorderste Berge N Alsting (Lo) (6807/215), WeJ 98.

***Cephalanthera damasonium* - Weißes Waldvögelein**

A: K 908, S 191 / RL SL 3

Hammelsberg SW Perl (6504/123), DiK 98; Bois d'Hufelz N Kitzing (Lo) (6504/135), DiK 97; Wald N über dem Bissenbach NE Montenach (Lo) (6504/324), DiK 93; W-Hang des Hollenbach-Tales NE Freching (Lo) (6504/333), DiK 89; Buschwerk W-Hang Hirnberg NE Ihn (6605/412), DiK 98; Wald "In den Ulmen" NW Gisingen (6605/414), DiK 98; "Wingertberg" E Holling (Lo) (6705/131), ScC & ScT 99; Waldrand SW Bambusch NE Téterchen (Lo) (6705/314), DiK 93; Kalksteinbruch Berus (6706/121), ScT & P. Maas 85; Bebuschter Halbtrockenrasen beim N.D. SE Güdingen (6708/333), StP 93; Saarbrücker Stadtwald W Ensheim (6708/431), StP 96; Steinbruch am Kalbenberg E Ballweiler (6709/334), W. Hild 92; Waldklamm im NSG Badstube SE Mimbach (6709/423), StP 96; Monbijou E Althornbach (Pf) (6710/334), DiK 93; SE-Rand Sangenwald W Spicheren (Lo) (6807/212), DiK 98; Waldrand am Battenberg NW Grosbliederstroff (Lo) (6808/121), StP 96; Waldrand Brücker-Berg S Niedergailbach (6809/323), DiK 96; Frischer Laubmischwald SE Bliesbruck (Lo) (6809/332), StP 94; "Kleinbirk", Eichen-Hainbuchenwald SE Schweyen (Lo) (6810/135), HeU 98.

***Cephalanthera longifolia* - Schwertblättriges Waldvögelein**

A: K 909, S 191 / RL SL 3

Buchenwald im "Paffesch" E Flastroff (Lo) (6605/124), ScT 99; Lichter Mischwald am Reeleberg W Fischbach (6608/331), StP 98; Nordrand von Heidstock (6707/134), StA 98; St. Arnualer Wiesen in Saarbrücken (6708/322), M. Biegi 98; Buchenwald im westlichen Obertal S Oberwürzbach (6708/415), HeU 98-99; Waldrand am Thédinger Gipsbruch NW Théding (Lo) (6807/313), StP 96.

***Cephalanthera rubra* - Rotes Waldvögelein**

A: K 910, S 191 / RL SL 2

Kalk-Buchenwald im "Bois d'Hufelz" N Kitzing (Lo) (6504/135), StP 94; "Kleinbirk", Eichen-Hainbuchenwald SE Schweyen (Lo) (6810/135), HeU 98.

***Cerastium brachypetalum* - Bärtiges Hornkraut**

A: K 100, S 44 / RL SL *

Bhf Reinsfeld (Tr) (6307/123), CaS 98; Wiesen S Idar-Oberstein (Ko) (6309/214), ScC & ScT 96; Wiesen SE Hammerstein (Ko) (6309/214 u. 224), ScC & ScT 96; Magerer Rand einer ansonsten aufgedüngten Wiese über Vulkanit am S-Hang des Sparrenberges W Freisen (6409/135), CaS 98; Johannesbachtal NW St. Wendel-Alsfassen: magere Schafweide über sandigem Lehm des Oberrotliegenden bei der B41-Ausfahrt WND-Alsfassen (6508/224), CaS 98; Bliestal NNE St. Wendel-Alsfassen: lückige Magerwiese über sandigem Lehm des Oberrotliegenden auf der nach NE vorspringenden Kuppe unmittelbar NE der Bahnlinie (6508/225), CaS 98.

***Chamaespartium sagittale* - Flügelginster**

Außerhalb des Prims-Hochlandes und des Nohfelden-Hirsteiner Berglandes nur selten bis zerstreut:

A: K 294, S 75 / RL SL *

Halbtrockenrasen "Auf der Burg" W Ormersviller, SE Utweiler (6809/414), HeU 99.

***Chenopodium bonus-henricus* - Guter Heinrich**

A: K 73, S 39 / RL SL *, B 3

Ortslage von Schwerdorff (Lo) (6605/125), ScT 99.

***Chenopodium botrys* - Klebriger Gänsefuß**

A: K -, S 39 / RL SL u

Ruderalflächen in der alten Hütte Völklingen (6707/311), WeJ 99; Ruderalfläche auf dem Uni-Campus Saarbrücken (6708/133), WeJ 99.

***Chenopodium glaucum* - Graugrüner Gänsefuß**

A: K 74, S 39 / RL SL 3

Der Graugrüne Gänsefuß ist heute in der Dorfflora nur selten anzutreffen:

Spülsaum der Ill bei Hosterhof (6508/313), ScT 93; Ortslage von Schwerdorff (Lo) (6605/125), ScT 99.

***Chenopodium hybridum* - Bastard-Gänsefuß**

A: K 76, S 39 / RL SL n

Verbreitungsschwerpunkt sind die warmen Tallagen der Saar um Saarlouis und Saarbrücken sowie der Blies bei Homburg. Weitere Meldungen außerhalb dieser Räume:

Unkrautiger Feldwegrand S des Hornbaches SSW Kirschbacherhof (Pf) (6710/431), SaE 99; Colonie Neuland zw. Diesen u. Ham (Lo) (6806/111), CaS, ScC & ScT 95.

***Chondrilla juncea* - Binsen-Knorpellattich**

A: K -, S 152 / RL SL 2

Armeria-Rasen "Häsfeld" E Altforweiler (6706/124), SaP 98; Ruderalfläche am Messengelände Alt-Saarbrücken (6707/413), WeJ 98.

***Circaea alpina* - Alpen-Hexenkraut**

A: K -, S 95 / RL SL 0

Quellflur am Erdbeerengraben SE Börfink etwas oberhalb des ersten querenden Forstweges vom unteren Hauptweg aus gesehen (Ko) (6308/211), CaS 99 (Bestätigung des Fundes von O. Göhl).

***Circaea x intermedia* (= *C. alpina* x *C. lutetiana*) - Mittleres Hexenkraut**

A: K -, S 94 / RL SL 2

Quelliger Erlenwald am Altweiherbach zwischen Altweiher und der Großen Scheidschneise (Tr) (6307/111), CaS 99; Quellbach oberhalb (sic!) der Nahequelle bei Selbach (6408/312), CaS 97 (bei Blaufuss und Reichert wird von dort ein Fund von Korneck von *Circaea alpina* zitiert; die Überprüfung des Vorkommens ergab *C. x intermedia*!); Klamm zwischen Schesserling und Oberthaler Bruch N Gronig, Rotliegendes (6408/325), CaS 98.

***Cirsium eriophorum* - Wollköpfige Kratzdistel**

A: K 672, S 147 / RL SL 2

Mehrfach um den Kalksteinbruch Hemmersdorf S Hemmersdorf (6605/413), ScT 99; "Wingertberg" E Holling (Lo) (6705/131), ScC & ScT 99; Flur "Neuglen" E Velving (Lo) (6705/314), ScC & ScT 99; Bovenberg NW Ottonville (Lo) (6705/321), ScC & ScT 99.

***Cirsium x rigens* - Steife Kratzdistel**

A: K 677, S 148

S Bubenhausen (Pf) (6710/213), SaE 99; Einzelpflanzen an den Böschungen des Feldwirtschaftsweges auf der Höhe zwischen Lammsberg und Kühkopf NW Battweiler (Pf) (6710/214), SaE 99; Wiese auf Ransbacher Berg NW Bliesransbach (6808/125), KSb 99.

***Coeloglossum viride* - Hohlzunge**

A: K 916, S 193 / RL SL2, B 3

Mesobrometen im NSG Guldenfeld NE Habkirchen (6808/414!), StP 98; Wiesen S des Aéro-drome SW des Waldes Forst NE Neunkirch-lès-Sarreguemines (seit einigen Jahren zum großen Teil durch Pferdebeweidung stark gefährdet) (Lo) (6808/422), W. Hild ??, ScC & ScT 94; Magerwiese am Hannock SW Rubenheim (6809/122!), StP 92; Kleiner Halbtrockenrasen am Kahlenberg W Bockweiler (6809/212!), StP 98; Halbtrockenrasen am Buchenberg N Obergail-

bach (Lo) (6809/324!), StP 97; Halbtrockenrasen am Schloßhübel S Utweiler (6809/423!), StP 97.

***Consolida regalis* ssp. *regalis* - Acker-Rittersporn**

A: K 135, S 50 / RL SL 2, B 3

Haferacker am Ortsausgang Cadenbronn nach Rouhling (Lo) (6807/424), ScC & ScT 90.

***Coronopus squamatus* - Niederliegender Krähenfuß**

A: K -, S 61 / RL SL 2, B 3

Ferme du Ruisseau de Bibiche N Bouzonville (Lo) (6605/332), ScT 99.

***Corydalis cava* - Hohler Lerchensporn**

A: K 165, S 55 / RL SL *

Prallhang der Nied N Filstroff (Lo) (6605/323), ScC & ScT 99; Prallhang der Nied NE Filstroff (Lo) (6605/324), ScC & ScT 99; Nied S Guerstling (Lo) (6605/325), ScT 99; Unter Gebüsch entlang des Weges E Bois d'Ottonville SW Ottonville (Lo) (6705/331), ScC & ScT 99; An Wegböschungen und unter Hecken in Ricrange (Lo) (6705/332), ScC & ScT 99.

***Corydalis solida* - Gefingertes Lerchensporn**

A: K 166, S 55 / RL SL *

Nahe Bahnhof Niedaltdorf (6605/315), ScT u. StA 95; Gebüsch und Wegsäume W Aidelinglès-Bouzonville (Lo) (6605/334), ScC & ScT 99; N Fischweiher E Wehrden (6707/311), DiK 98; Blies-Aue S Frauenberg (Lo) (6808/423), ScC & ScT 95.

***Corynephorus canescens* - Silbergras**

A: K 818, S 175 / RL SL 3

Depotzaun S Sportplatz S Schönenberg (Pf) (6510/334), WoP 99; Industriebrache NE Überherrn (6706/313), SaP 98; Auf sandigem Weg N Füllenbusch W Hassel - mittlerweile zerstört (6708/224), HeU 95; Sandrasen in der Colonie Neuland zw. Diesen u. Ham (Lo) (6806/111), CaS, ScC & ScT 95.

***Crataegus rhipidophylla* var. *lindmanii* (= *C. cf. lindmanii*) - Lindmans Weißdorn**

A: K 282 S 73 / RL SL *'' (Bei KORNECK, SCHNITTLER & VOLLMER 1996 irrtümlich als SL •)

Wälder "Paffesch" u. "Rehendriesch" E Flastroff (Lo) (6605/124), ScT 99; Forêt Domaniale de Bouzonville u. Offenland im S NW Bouzonville (Lo) (6605/311), ScT & SaP 99; W-Rand des Geseilwaldes W Kleinsteinhausen (Pf) (6710/433), SaE 99.

***Crataegus rhipidophylla* var. *rhipidophylla* (= *C. cf. curvisepala*) - Großkelchiger Weißdorn**
A: K 281 S 73 / RL SL *

Forêt Domaniale de Bouzonville S Ferme de Dampont N Filstroff (Lo) (6605/312), ScC & ScT 99.

***Crataegus x macrocarpa* - Großfrüchtiger Weißdorn**
A: K 278, S 73 / RL SL *

Hartbornwald E Oberesch (6605/115), ScT 99; Wegsäume u. Gebüsche E Hart-Wald u. "Ewig" S Grindorff (Lo) (6605/122), ScC & ScT 99; Diersdorfer Bachtal zwischen Fürweiler u. Schwerdorff (6605/221), ScT 99; Forêt Domaniale de Bouzonville u. Offenland im S NW Bouzonville (Lo) (6605/311), ScT & SaP 99; Ferme du Ruisseau de Bibiche, Tal der Bibiche, Stockholz u. Niedaue N Bouzonville (Lo) (6605/332), ScT 99; Côte de Thédning (W Klingelstauden) NW Thédning (Lo) (6807/313), M. Greff ScC, ScT & WoP 95; "Thal" NE Ebring (Lo) (6807/421), M. Greff, ScC, ScT & WoP 95.

***Crepis foedita* - Stinkender Pippau**
A: K -, S 153 / RL SL *

Ruderalflächen in der alten Hütte Völklingen (6707/311), WeJ 99; Ruderalflächen im Hauptgüterbahnhof W Am Homburg (6708/131), WeJ 99.

***Crepis paludosa* - Sumpf-Pippau**
A: K 702, S 152 / RL SL *

In den Silikatgebieten des nördlichen und östlichen Kartiergebietes, im Hunsrück und seinem Vorland, dem Prims-Nahe-Bergland, dem nördlichen Prims-Blies-Hügelland verbreitet, ist die Art in den Landschaftsräumen des südlichen Kartiergebietes, vor allem in den Kalkgebieten selten:

Obertal, Talaue, verlandeter Teich W Niederwürzbach (6709/311), HeU 98; Quellige Stelle im Buchholz SSE Battweiler (Pf) (6710/224), SaE 99.

***Crepis setosa* - Borsten-Pippau**
A: K -, S 153 / RL SL u

Ruderalflächen im Hauptbahnhof St. Johann (6707/415), WeJ 99; Ruderalfläche am Bahnhof Sulzbach (6708/114), WeJ 97.

***Cuscuta epithimum* - Thymian-Seide**
A: K 486, S 113 / RL SL 3

Skipiste im Hang zum Dollberg SE Neuhütten, reichlich (Tr) (6308/312), CaS 97; Wiesen SW Fohren-Linden (Ko) (6409/212), ScC 94, 95.

***Cuscuta europaea* - Nessel-Seide**

A: K 485, S 126 / RL SL *

Außerhalb der Talauen von Mosel, Saar, Prims und Blies selten:

Ab Dirmingen bis zur Illmündung entlang der Ill regelmäßig (6507/424, 425, 432, 433 u. 434 sowie 6608/321), ScT 93, StA 93, ScT & StA 93; Ill S Wustweiler (6606/113), ScT 93; Bickenalbtal W Zweibrücken-Mittelbach (Pf) (6709/435), HeU 94; Haut Bois u. Étang de Roderisse N Dourdhal (Lo) (6806/331), ScC & ScT 91.

***Cymbalaria muralis* - Zymbelkraut**

A: K 558, S 126 / RL SL *

In den montanen und submontanen Regionen selten:

Alte Mauer am Friedhof Birkenfeld W Birkenfeld (Ko) (6308/414), KG Moose 99.

***Cynoglossum officinale* - Echte Hundszunge**

A: K 501, S 115 / RL SL 3

Bruchfeld im Steinbruch an der Wackenmühle SW Hemmersdorf (6605/412), ScT 99; Brachfläche E des Bahnkörpers NE Petit Eberswiller (Lo) (6806/335), KG Moose 97.

***Cyperus fuscus* - Braunes Zypergras**

A: K 866, S 183 / RL SL 2

Stauanasse Halde am Kraftwerk Ens Dorf (6706/212), WoP 95; Teichrand am Ohligweiher S St. Arnual (6808/111), WeJ 98.

***Cystopteris fragilis* s.str. - Zerbrechlicher Blasenfarn**

A: K 21, S 25 / RL SL *

Alte Mauer am Friedhof Birkenfeld W Birkenfeld (Ko) (6308/414), WeJ 97, KG Moose 99; Mauer im Bergwerk Heiligenwald (6608/231), WeJ 96; Mauer in der alten Hütte Burbach (6707/413), WeJ 98; Felsen am Messebahnhof in Alt-Saarbrücken (6707/423), WeJ 96; Mauer an der Schlosskirche in Alt-Saarbrücken (6707/425), WeJ 96; Mauern in Rentrish (6708/221), WeJ 98; Mauern im Akazienweg in Saarbrücken-Schafbrücke (6708/314), WeJ 97; An schattigem Fels im Obertal W Niederwürzbach (6709/311), HeU 97; Mauern in Béning (Lo) (6807/321), WeJ 96; Felsen bei Schönbach S St. Arnual (6808/112), WeJ 96; Mauern in Fechingen (6808/114), WeJ 97.

***Dactylis polygama* - Wald-Knäuelgras**

A: K 783, S 169 / RL SL *

Aus den Kalkgebieten wird die Art bisher nur wenig gemeldet, scheint jedoch vor allem in den Wäldern auf Keuper verbreitet:

Forêt Communale de Sierck (Lo) (6504/335), ScC, ScT & SaE 92; Wälder "Hart" u. "Ewig" S Grindorff (Lo) (6605/122), ScC & ScT 99; Grand Bois de Waldweistroff SE Waldweistroff (Lo) (6605/131 u. 132), ScC & ScT 99, ScT 99; Tal des Waldweistroffer Baches SW Flastroff (Lo) (6605/132), ScT 99; Forêt Domaniale de Bouzonville S Ferme de Dampont N Filstroff (Lo) (6605/312), ScC & ScT 99; Forêt Domaniale de Bouzonville NW Filstroff (Lo) (6605/321), ScT & SaP 99.

***Dactylorhiza incarnata* ssp. *incarnata* - Fleischrotes Knabenkraut**

A: K 917, S 193 / RL SL 2, B 2

Wiesen am Ruisseau de Waldweistroff SE Waldweistroff (Lo) (6605/131), ScC & ScT 99; Feuchtwiesen in der "Surwiese" u. Niedaue in der Flur "Niedra" W Bouzonville (Lo) (6705/111), ScC & ScT 99; Niedwiesen in der Flur "Klopp" NW Vaudreching (Lo) (6705/112), ScC & ScT 99; Niedwiesen NW Rémelfang (Lo) (6705/121), ScC & ScT 99; Quellhorizont am S-Hang E Moulin de Felschling S Berviller (Lo) (6705/224), SkR 85; W-exponierter Stufenhang zum Berviller Bachtal N Merten (Lo) (6705/235), ScT & SkR 86; Schilfgebiet N der Straße NW Téterchen (Lo) (6705/314φ), DiK 77; St. Arnualer Wiesen in Saarbrücken (6708/322), HoW 98; Wiesen am Forbacher Berg NW Spicheren (Lo) (6807/212), ScT 91; Wiesen zw. Unterster Wald und Oberster Wald NW Etzling (Lo) (6807/212), ScT 91; Flur "Breitenbusch" S Gaubiving (Lo) (6807/411!), ScC & ScT 95; Pfeifengraswiese am Essigberg S Fechingen (6808/114!), StP 95; Feuchtwiese nördl. des Vierherrenwaldes NW Eschringen (6808/211!), StP 94; Verlandungsbereich des Schlammweiher NW Welferding (Lo) (6808/322!), StP 91; Frische Magerwiese am Bickelsrech SE Habkirchen (Lo) (6808/425), StP 98; Quellige kalkreiche Nassbrache am Stufenhang zum Hanickel SW Wolfersheim (6809/114), MaM 96; Feuchtwiese im Quellbereich des Rohrentales W Rubenheim (6809/122!), StP 98; Feuchte Wiese am Kuckucksberg E Altheim (6809/225!), StP 90; Feuchte Wiesensenke "Auf der Lohe" NE Reinheim (6809/312!), StP 95; Feuchtwiese im Verlandungsbereich d. Teiches S Medelsheim (6809/411!), StP 92; Feuchtweide am Ham-Bach S Chapelle St. Joseph S Ormersviller (Lo) (6809/424), ScC & ScT 93; Kalk-Quellmoor am Ham-Bach S Ormersviller (Lo) (6809/425), ScC & ScT 93.

***Dactylorhiza maculata* agg. - Artengruppe Geflecktes Knabenkraut**

A: K 919, S 193 / RL SL 3, B 3

Langwiese S Börfink (Ko) (6308/221), ScC 97; Wiese am Arthenberg NW Abentheuer (Ko) (6308/231), ScC 95, 96; Waldwiese im "Hinzhausen" NW Brücken (Ko) (6308/411), ScC 97; Talsenke N der Hütte im südwestlichen Teil des Waldes "Hahn" nahe des großen Waldweges N Wolfersweiler (6409/121), O. Göhl 97; NE-Hang an der Autobahn A8 E Weiler (6505/135), DiK 98; Wald "Butterchen" SW des Sillenbergs zwischen Biringen u. Waldwisse (6505/324), ScT 99; W-Hang am "Herrenberg" NE Hetschermühle W Eimersdorf (6605/224), DiK 98; Mehrfach in Wegsäumen im Forêt Domaniale de Bouzonville NW Filstroff (Lo) (6605/311, 312 u. 322), ScT & SaP 99, ScC & ScT 99; Forêt Communale de Filstroff (Lo) (6605/313), ScC & ScT 92; Alter Kalksteinbruch S Hemmersdorf (6605/413), DiK 98; Wald "In den Ulmen" NW Gisingen (6605/414), DiK 98; Waldwiese "Hahnwies" und Wegsäume im Hahnwald S Wiesbach (6607/335), ScT & StA 93; Waldwiese S Abt. 350 im Staatsforst Neunkirchen N Stennweiler (6608/213), ScT 93; St. Arnualer Wiesen in Saarbrücken (6708/332), HoW 98; NSG Monbijou E Althornbach (Pf) (6710/335), WoP 94; Bebuschter Halbtrockenrasen am Brandenbusch NW Grosbliederstroff (Lo) (6808/131), StP 92; Halbtrockenrasen oberhalb des Industrie-

gebietes W Gungling (Lo) (6808/313), StP 93; Verbrachter Halbtrockenrasen am Kammersrechwald E Bliesdalheim (6809/221), StP 96.

***Dactylorhiza majalis* ssp. *majalis* - Breitblättriges Knabenkraut**

A: K 918, S 193 / RL SL 3, B 3

Wiesen am Einschiederhof S Börfink (Ko) (6308/125), ScC 97; Langwiese S Börfink (Ko) (6308/221), ScC 97; Wiese am Arthenberg NW Abentheuer (Ko) (6308/231), ScC 95; Wiesen W Ellenberg (Ko) (6308/234), ScC 97; Mehrfach in Wiesen S Ellenberg (Ko) (6308/235), ScC & ScT 97; Waldwiese im "Hinzhausen" NW Brücken (Ko) (6308/411), ScC 97; Wiesen NE Sportplatz Birkenfeld (Ko) (6309/131), ScC, ScT & HeU 97; Mehrfach in den Wiesen S Idar-Oberstein (Ko) (6309/214), ScC & ScT 96; Wiesen SE Hammerstein (Ko) (6309/224), ScC & ScT 96; Wilmeswies SW Ruschberg (Ko) (6309/432), ScC 97; Wiesen NE Fohren-Linden (Ko) (6409/214), ScC 97; Wiesen E Weyer Resch NW Sehndorf (6504/114), ScC & ScT 88; Quellbereich des Alsweiler Baches SE Bahnhof Tholey (6505/113), ScT & StA 93; Bruchelsbachtal unterhalb des Weiherwaldes W Tholey (6508/134), ScT & StA 93; Zwei Stellen zw. Wareswald und Weiherwald W Tholey (6508/134), ScT & StA 93; Rand des Alsbachtals gegenüber der alten Mühle in der Ortslage Berschweiler (6508/322), ScT 93; Sulzbachtal SE Urexweiler (6508/421), ScT & ScC, ScT & StA 93; Feuchtweiden zwischen Johannes- und Hubertushof N Welschbach (6508/432), ScT 93; Nördlicher Quellarm des Ahlenbaches S Faulenberg W Mainzweiler (6508/432), ScT 93; Erloschen am Limbwiesbach oberhalb des obersten Teiches W Berschweiler (6509/311), Neis durch Sauer; Feuchtwiesen am Ruisseau de Weistroff SW Flastroff (Lo) (6605/132), ScT 99; Zwei Stellen in Feuchtwiesen N Erschberg SW Wiesbach (6607/224), ScT & StA 93; Quellmulde S P 318,7 W Hahnwald S Wiesbach (6607/225), ScT & StA 93; Wiesbach am Beginn des Neubaugebiets S Wiesbach (6607/225), StA 93; Feuchtgrünland W Georgshof N Uchtelfangen (6608/112), ScT 93; Niedwiesen bei Rémfang (Lo) (6705/121), ScT 88; Quellhorizont am S-Hang E Moulin de Felschling S Berviller (Lo) (6705/224), SkR 85; W-exponierter Stufenhang zum Berviller Bachtal N Merten (Lo) (6705/235), ScT & SkR 86; Feuchtwiesen im Bachtal S Birmichel N Velving (Lo) (6705/313), ScC & ScT 99; Schilfgebiet N der Straße NW Téterchen (Lo) (6705/314), DiK 86; "Verkehrinsel" in der AS St. Ingbert-West N Sengscheid (6708/232), ScT 99; St. Arnualer Wiesen in Saarbrücken (6708/322), HoW 98; Bisttal zw. Diesen u. Ham (Lo) (6806/111), CaS, ScC & ScT 95; Wiesen am Dimmel Trisch W Spicheren (Lo) (6807/213), ScT 91; Feuchtwiese am Battenberg SE Zinzing (Lo) (6808/121), StP 97; Battenberg S Zinzing (Lo) (6808/132), ScC, ScT & WoP 92; Feuchtwiese am Kirchenacker SW Frauenberg (Lo) (6808/422), StP 95; Wiesen S des Aérodrome SW des Waldes "Forst" NE Neunkirch-lès-Sarreguemines (seit einigen Jahren zum großen Teil durch Pferdebeweidung stark gefährdet) (Lo) (6808/422), ScC & ScT 94; Quellsumpf am Waldrand bei Höhe 346,3 E Bebelshheim (6809/121), StP 91; Wiesen am NW-Rand des Bois de Bliesbruck S Bliesbruck (Lo) (6809/332), ScC & ScT 96; Feuchtwiese am Herschbach S Medelsheim (6809/412), StP 96; Feuchtweide am Ham-Bach S Chapelle St. Joseph S Ormersviller (Lo) (6809/424), ScC & ScT 93; Kalk-Quellmoor am Ham-Bach S Ormersviller (Lo) (6809/425), ScC & ScT 93.

***Dactylorhiza x aschersoniana* (= *D. incarnata* x *D. majalis*) - Hybride zw. Fleischfarbenem und Breitblättrigem Knabenkraut**

A: K -, S -

Wolferskopf W Haustadt (6506/333), ScT 84, DiK 95; Feuchtwiesen am Ruisseau de Weistroff SE Waldweistroff (Lo) (6605/131), ScC & ScT 99; Feuchtwiese am Forbacherberg NW Spicheren (Lo) (6807/212), ScT 91; Wiesen zw. "Unterster Wald" und "Oberster Wald" NW Etzling (Lo) (6807/212), ScT 91; Kalk-Quellsumpf "auf'm Essigberg" am Stufenhang zum Birzberg W Fechingen (6808/114), MaM 96; Kalk-Quellsumpf am Stufenhang zum Gebberg W Eschringen (6808/211), MaM 96; An mehreren Stellen in quelligen kalkreichen Nassbrachen, NSG N Gersheim (6809/133), MaM 96; Quellige kalkreiche Nassbrache am Stufenhang zum Galgenberg SW Niedergailbach (6809/322), MaM 96; Feuchtweide am Ham-Bach S Chapelle St. Joseph S Ormersviller (Lo) (6809/424), ScC & ScT 93; Kalk-Quellmoor am Ham-Bach S Ormersviller (Lo) (6809/425), ScC & ScT 93.

***Dactylorhiza x vermeuleniana* Soó (= *D. maculata* agg. x *D. majalis*) - Hybride zw. Geflecktem und Breitblättrigem Knabenkraut**

A: K -, S -

Beierwiese NW Ensheim (6708/431), DiK 96.

***Danthonia decumbens* - Dreizahn**

A: K 837, S 177 / RL SL *

Die Art ist in den Kalkgebieten und kollinen Silikatgebieten selten.

Wiese bei Jungfleischhütte N Forsthaus Neuhaus (6707/214), KSb 97; Magerrasen am Elstersteinpark St. Ingbert-Nord (6708/212), HeU 93; Magerwiese Rohrbachtal N Rohrbach (6708/214), HeU 98; Magerwiese N Glashütter Weiher NE St. Ingbert-Rohrbach (6709/111), HeU 94; Colonie Neuland zw. Diesen u. Ham (Lo) (6806/111), CaS, ScC & ScT 95.

***Dianthus carthusianorum* - Kartäuser-Nelke**

A: K 127, S 48 / RL SL 2

Mehrfach in den Wiesen SE Hammerstein (Ko) (6309/214 u. 224), ScC & ScT 96; Wiesen NE Berglangenbach (Ko) (6309/432), ScC 96; Wiesen am Eschelbach ca. 750m S Ruschberg (Ko) (6309/433), ScC 96.

***Dianthus deltoides* - Heide-Nelke**

A: K 125, S 47 / RL SL 3

In Menge auf Magerrasen auf dem Segelflugplatz SSE Kell, sehr wahrscheinlich durch Heublume eingeschleppt (Tr) (6307/321), CaS 98.

***Digitaria ischaemum* - Faden-Fingerhirse**

A: K 845, S 178 / RL SL *

Brasche auf Sportplatz W Rodenhof (6707/235), WeJ 99; Brasche auf Sportplatz "Kitten" in Dudweiler (6708/113), WeJ 98; Brasche auf Sportplatz am Waldhaus in St. Johann (6708/312), WeJ 98.

***Diphasiastrum tristachyum* (= *Diphasium tristachyum*, *Lycopodium tristachyum*) - Zypressen-Flachbärlapp**

A: K -, S 22 / RL SL 1, B 2

Saurer Buchenwald am Osthang des Rothenkopfes S St. Ingbert. Heute erloschen. (6708/224), HeU 94.

***Dipsacus pilosus* - Behaarte Karde**

A: K 609, S 135 / RL SL 4

Unterste Stegmühle W Weiten (6405/321), WoP 98; Unterlauf der Ill zw. Bubach und Calmesweiler (6507/432), ScT 93.

***Dittrichia graveolens* (= *Inula graveolens*) - Klebriger Alant**

A: K-, S 141 / RL SL -

Halde St. Charles II W Großrosseln (6807/111), WoP 94.

Downingia elegans

A: K -, S - / RL SL -

Vermutlich unbeständig eingeschleppt in einem Tümpel Halde Kraftwerk Emsdorf (6706/212), WoP 95.

***Drosera rotundifolia* - Rundblättriger Sonnentau**

A: K 211, S 62 / RL SL 2, B 3

Bruch an der NW-Flanke des Sandkopfes ca. 650 m WNW Hahnenbornbruch E Thiergarten (Tr) (6308/112), CaS & Hand 95.

***Dryopteris affinis* "ssp. *borreri*" - Spreuschuppiger Wurmfarne**

A: K 23, S 26 / RL SL *

N-exponierter Hang zur Saar N St. Gangolf (6505/211φ), ScC & ScT 94; Kerbtal zwischen Ferme du Soleil und Ferme St. Jean N Dalem (Lo) (6705/412), ScC & ScT 91; Alter Steinbruch E Ferme St. Jules S Falck (Lo) (6705/433), WeJ 98; Wirbelfels N Merten (6706/131), ScC &

ScT 91; Feuchtgebiet am Stuhlsatzenhaus N Scheidt (6708/134), WeJ 98; Wald im westlichen Talbereich des Tiefentals S St. Annual (6708/331), WeJ 98; Kerbtal am Langweiler Weg N Fechingen (6708/335), WeJ 97; Wald in der Talsohle des Eichertstals S Sengscheid (6708/411), WeJ 97; An Quelle im Graubachwald NW Blieskastel-Bierbach (6709/222), HeU 96; Wald am Steilhang des Herrenbusches SE Walshausen (Pf) (6710/435), SaE 99; "Sang" u. "Wollscheit" NW Spicheren (Lo) (6807/212), ScT 91; Bewaldete Hänge am Forbacher Berg N Spicheren (Lo) (6807/213), WeJ 97; Bewaldetes Kerbtal im Spicherer Tal N Alsting (Lo) (6807/215), WeJ 98; "Unterster Wald" N Behren-lès-Forbach (Lo) (6807/222), ScT 91; Osthang Römischer Kopf W Unner (6808/111), WeJ 98.

***Eleocharis acicularis* - Nadel-Sumpfbirse**

A: K -, S 182 / RL SL 1, B 3

Kiesgrubenteiche E Buprich (6507/322), WoP 99.

***Eleocharis austriaca* - Österreichische Sumpfbirse**

A: K -, S 183 / RL SL U

Staunasse Halde am Kraftwerk Enseldorf (6706/212), WoP 95; Nasser Graben in altem Absinkweiher N Dudweiler (6708/112), WeJ 98; Teichrand im Stadtpark Sulzbach (6708/114), WeJ 97; Sandiger Tümpel in einer aufgeschütteten Aue bei Scheidt (6708/134), WoP 97.

***Eleocharis mamillata* - Zitzen-Sumpfbirse**

A: K 862, S 183 / RL SL 2

Haasbruch-Teich W Wadern (6407/312), WoP 94; Geisweiler Weiher W Michelbach (6506/234), WoP 94; Östlichster Graben in der Mastau W Homburg-Beeden (6609/434), WoP 94.

***Eleocharis ovata* - Eiförmige Sumpfbirse**

A: K -, S 183 / RL SL 2, B 3

Lehmig-sandige, nasse Senke in Sandbrache am Festo-Gelände E St. Ingbert-Rohrbach (6709/121), HeU 98.

***Eleocharis uniglumis* - Einspelzige Sumpfbirse**

A: K 863, S 183 / RL SL 2

Geisweiler Weiher W Michelbach (6506/234), WoP 94; Mehrfach in Feuchtwiesen am Ruisseau de Weistroff SE Waldweistroff (Lo) (6605/131 u. 132), ScC & ScT 99, ScT 99; Niedwiesen in der Flur "Klopp" NW Vaudrechting (Lo) (6705/112), ScC & ScT 99; Niedwiesen NW Rémeffang (Lo) (6705/121), ScC & ScT 99; Feuchtwiesen am südöstlichen Quellarm des Ruisseau d'Ottonville NE Ottonville (Lo) (6705/323), ScT & P. Haffner 86; Quellige kalkreiche Nassbrache am Stufenhang zum Hanickel SW Wolfersheim (6809/114), MaM 96; Quellige kalkreiche

Nassbrache, Geißbornhecke SE Breitfurt (6809/212), MaM 96; Quellige kalkreiche Nassbrache S Punkt 330,3 N Böckweiler (6809/213!), MaM 96; Quellige kalkreiche Nassbrache an Straße N Punkt 308,6 S Medelsheim (6809/412), MaM 96; An mehreren Stellen in quelligen kalkreichen Nassbrachen nahe Spring-Quelle SW Utweiler (6809/423), MaM 96.

***Elodea nuttallii* - Nutalls Wasserpest**

A: K 719, S 156 / RL SL 3

Tümpel im Simbachtal N Alsting (Lo) (6807/215), WeJ 98.

***Epilobium collinum* - Hügel-Weidenröschen**

A: K 408, S 95 / RL SL *

Bhf. Reinsfeld (6307/123), CaS 98.

***Epilobium palustre* - Sumpf-Weidenröschen**

A: K 414, S 96 / RL SL 3

Limbwiesbach W Berschweiler (6508/311), ScT 93; Nassbrachen im Alsbachtal S Marpingen (6508/313), ScT 93; Nassbrachen und kleinseggenreiche Quellen N Seibertswald S Urexweiler (6508/325), ScT 93; Mehrfach in Nassbrachen im Quellgebiet des "Kreckelbaches" SW Wiesbach (6607/224), ScT & StA 93; Nassbrachen in der Illaue nahe der Kirche Wemmetsweiler (6608/125), ScT 93; Nassbrachen in der Illaue S der Heistemühle zw. Illingen u. Wemmetsweiler (6608/125), ScT 93; Quellregion eines Ill-Nebenbaches NW Ziegelhütte (6608/211), ScT 93.

***Epipactis atrorubens* - Rotbraune Stendelwurz**

A: K 906, S 191 / RL SL 2

Viollion-Brache mit vereinzelt Fichtenaufwuchs bei Abt. 134 NE des Hengstbaches ca. 150 m NE Regierungsbezirks-Grenze E Muhl, 11 blühende Ex. (Tr) (6308/124!), CaS 95; Aufgelassener Steinbruch am Birzberg SW Fechingen (6808/114!), StP 97; "Südflanke des Koppelwaldes bei Eschringen" E Eschringen (6808/213!), Müller 53; Verlandungsbereich des Schlammweihers NW Welferding (Lo) (6808/322!), StP 90; Trockenrasen am Gipsbruch NW Gersheim (6809/133!), StP 98.

***Epipactis leptochila* - Schmallippige Stendelwurz**

A: K -, S 190 / RL SL 2

Laubmischwald N des Schlammweihers NW Welferding (Lo) (6808/322), StP 91; N Kappelwald NW Wolfersheim (6809/113), W. Hild 97; Wald oberhalb des Gipsbruches NW Gersheim (6809/133), ScT 95; Frischer Laubmischwald am Brücker Berg S Niedergailbach (6809/322), DiK 92; Wald am Brücker Berg S Niedergailbach (6809/322), DiK 93; Frischer Laubmischwald SE Bliesbruck (Lo) (6809/332), StP 94.

***Epipactis microphylla* - Kleinblättrige Stendelwurz**

A: K 907, S 191 / RL SL 2

S-Rand des Atzbüsch N Sehndorf (6504/114φ), DiK 97; Bois d'Hufelz N Kitzing (Lo) (6504/135), StP & DiK 97; Kalkbuchenwald östl. der Siedlung E Fechingen (6708/335!), StP 97; Saarbrücker Stadtwald S Flughafenstraße E Fechingen (6708/335! u. 431), W. Hild 98; Frischer Laubmischwald "Saarbrücker Stadtwald" W Ensheim (6708/431), W. Hild 96; Kalk-Buchenwald am Scharfeck E Eschringen (6808/213), StP 98; Kalk-Buchenwald (südl. Kappelwald) W Wolfersheim (6809/114!), W. Hild 98.

***Epipactis muelleri* - Müllers Stendelwurz**

A: K 904, S 190 / RL SL 3

Bois d'Hufelz N Kitzing (Lo) (6504/135φ), DiK 97; NSG "Heiligenkopf" N Eimersdorf (6605/215 u. 224), ScT 82, DiK 98; Gauberg NE Siersdorf (6605/225), ScT 84, DiK 98; Bois de Kobenloch E Holling (Lo) (6705/131), ScC & ScT 99; Wald SW Beierwiese NW Ensheim (6708/431), DiK 96; Monbijou E Althornbach (Pf) (6710/335), DiK 93; SE-Rand Sangenwald W Spicheren (Lo) (6807/212), DiK 98; Côte de Théding (W Klingelstauden) NW Théding (Lo) (6807/313), M. Greff, ScC, ScT & WoP 95; Halbtrockenrasen am Waldrand bei Höhe 299,0 W Walsheim (6809/134), StP 98; Halbtrockenrasen oberhalb des Erzentales SE Walsheim (6809/315), StP 98; Auf der Burg, Halbtrockenrasen W Ormersviller, SE Utweiler (6809/414), HeU 99; Bebuschter Halbtrockenrasen Westhang zum Becherbach N Riesweiler (6809/414), StP 99; Waldsaum des "Kleinbirk" SE Schweyen (Lo) (6810/135), HeU 98.

***Epipactis palustris* - Sumpf-Stendelwurz**

A: K 902, S 190 / RL SL 2, B 3

Pfeifengraswiese im NSG Wusterhang N Fechingen (6708/335!), StP 86; Moorwiese im NSG Beierswiese W Ensheim (6708/431!), StP 98; Feuchtwiese in der Flur "Thal" W Tenteling (Lo) (6807/421), M. Greff, ScC, ScT & WoP 95, StP 96; Kalk-Quellsumpf "auf'm Essigberg" am Stufenhang zum Birzberg W Fechingen (6808/114!), MaM 96, StP 98; Verlandungsbereich des Schlammweihers NW Welferding (Lo) (6808/322!), StP 96; Kalkflachmoor nördl. der Dachslöcher NW Gersheim (6809/132!), StP 98; Sumpf-Seggenried in Nassbrachenkomplex am Kot-Bach nahe Hasen-Quelle S Medelsheim (6809/422), MaM 96; Kalk-Quellmoor am Ham-Bach S Ormersviller (Lo) (6809/425), ScC & ScT 93, 95, MaM 96, StP 98.

***Epipactis purpurata* - Violette Stendelwurz**

A: K 905, S 190 / RL SL *

Frischer Laubmischwald im "Saarbrücker Stadtwald" W Ensheim (6708/431), StP 96; Frischer Laubmischwald (W Altgegeg) W Ballweiler (6709/332), StP 95; Südlicher Sitterswald S Mimbach (6709/432), StP 93; Frischer Laubmischwald am Battenberg S Zinzing (Lo) (6808/121), StP 91; An mehreren Stellen im Laubwald SE und N Hartungshof N Bliesransbach (6808/221), ScC, ScT & O. Orschiedt 88; Laubmischwald am Fröhlinger Berg N Welferding (Lo) (6808/323), StP 91; Frischer Laubmischwald SE Bliesbruck (Lo) (6809/332), StP 95.

***Equisetum hyemale* - Winter-Schachtelhalm**

A: K 3, S 22

Kerbtal zw. Moulin Neuf u. La Carrière E St. Avold (Lo) (6806/335), KG Moose 97.

***Equisetum sylvaticum* - Wald-Schachtelhalm**

A: K 6, S 22 / RL SL *

Nur im Homburger Becken, an der Sickinger Stufe und in den Tälern des Zweibrücker Westrichs häufiger auftretend, ist die Art in den Kalkgebieten sehr selten und auf Plateaulagen mit Höhenlehm und Lösslehmdecken beschränkt; in den übrigen Naturräumen sehr zerstreut: "Jungert"-Wald bei Biringen (6505/335), ScT 99; Quelliger Waldrand E Forsthaus Neuhaus (6707/215), WeJ 99; Kleines Erlenbruch E Jägersfreude (6708/131), WeJ 99; Feuchtes, kühles Tal am Eschberg W Scheidt (6708/313 u. 314), WeJ 97; Tal W Gutenbrunnen W Wörschweiler (6709/223), HeU 96; Wald im Simbachtal S Unner (Lo) (6808/112), WeJ 97.

***Equisetum telmateia* - Riesen-Schachtelhalm**

A: K 7, S 22 / RL SL 3

Wald beim Felsenbrunnen SE Sengscheid (6708/412), WeJ 99; Wald in trockengefallenem Absinkweiher N Forbach (Lo) (6807/115), KSb 99.

***Equisetum x litorale* - Ufer-Schachtelhalm**

A: K 8, S 22 / RL SL *

Erlenbruch im Gehlenbachtal S Klarenthal (6707/324), WeJ 99; Bist zw. Diesen u. Ham (Lo) (6806/111), CaS, ScC & ScT 95.

***Eragrostis minor* - Kleines Liebesgras**

A: K 841, S 178 / RL SL *

Außerhalb der Industrieachse und den Bahnlinien selten:
Pflasterfugen in der Ortslage Bliesransbach (6808/221), ScC, ScT & O. Orschiedt 88.

***Erigeron acris ssp. acris* - Scharfes Berufkraut**

A: K631, S 139 / RL SL *

Magere Schafweide über sandigem Lehm des Oberrotliegenden W St. Wendel-Alsfassen, etwas ruderalisierter Bereich in Wegrandnähe (6508/224), CaS 99; NW Abbaugang des Kalksteinbruchs SE Hemmersdorf (6605/413), ScT 99; Buschiges Ödland NE eines Schwarzkiefern-Bestandes W des Bornackerhofes NE Rimschweiler (Pf) (6710/324), SaE 99; Colonie Neuland zw. Diesen u. Ham (Lo) (6806/111), CaS, ScC & ScT 95.

***Eriophorum angustifolium* - Schmalblättriges Wollgras**

A: K 860, S 182 / RL SL 2

Niedermoor im Tal SW Reinsfeld-Ischert (Tr) (6307/123), CaS 98; Calthion-Brache am Hengstbach zwischen Abt. 66 und 67 unmittelbar N des Hengstbaches und der RB-Grenze ca. 550 m SE Pkt. 578,4 E Muhl (Tr) (6308/124), CaS 95; Quelliges Calthion im Tälchen am westlichen Ortsrand von Züsch, ca. 200 m N Wbh. und Pkt. 555,2 (Tr) (6308/131), CaS 95; Moorrest im Fichtenbestand ca. 150 m NNW Pkt. 558,3 NE Züsch (Tr) (6308/132), CaS 95; Zentraler Bereich der Flur "Im Bruch" N Zinershütten, ca. 200 m ESE Pkt. 533,1 (Tr) (6308/132), CaS 95; Am westlichen der beiden Weiher NW Gunnesbruch im Königsbachtal, ca. 300 m NE Pkt. 558,3 NE Züsch (Tr) (6308/133), CaS 95; Quellbereich S Johanneshof NE Welschbach (6508/432), StA 93; Quellmulde am Nord-exponierten Hang des Götzenberges SW Kaisen (6608/122), ScT 93; Pfeifengras-Seggenbruch NE Spiesermühle S Spiesen (6608/435), HeU 94; Étang de Roderisse N Dourdhal (Lo) (6806/331), ScT 91; Kalk-Quellsumpf "auf'm Essigberg" am Stufenhang zum Birzberg W Fechingen (6808/114), MaM 96; Kalk-Quellsumpf am Stufenhang zum Gebberg W Eschringen (6808/211), MaM 96; Quellige kalkreiche Nassbrache, Geißbornhecke SE Breitfurt (6809/212), MaM 96; An Grabenrand und in quelliger kalkreicher Nassbrache nahe Spring-Quelle SW Utweiler (6809/423), MaM 96; Feuchtweide am Ham-Bach S Chapelle St. Joseph S Ormersviller (Lo) (6809/424), ScC & ScT 93; Nasswiese S Flur "Nassen Weg" S Ormersviller (Lo) (6809/425), MaM 96.

***Eriophorum latifolium* - Breitblättriges Wollgras**

A: K 861, S 182 / RL SL 2, B 3

Kalk-Quellsumpf "auf'm Essigberg" am Stufenhang zum Birzberg W Fechingen (6808/114), MaM 96; Quellige kalkreiche Nassbrache am Stufenhang zum Hanickel SW Wolfersheim (6809/114!), MaM 96; Quellige kalkreiche Nassbrache, S Punkt 330,3 N Böckweiler (6809/213!), MaM 96.

***Eriophorum vaginatum* - Scheiden-Wollgras**

A: K -, S 182 / RL SL 1

NSG Traunwiesen bei Börfink; Niedermoor mit Hochmoorinitialen beim Zusammenfluss von Ochsenfloß, Erdbeerengraben und Traun (Ko) (6308/211), CaS 99 (Bestätigung eines Fundes von O.Göhl).

***Eryngium campestre* - Feld-Mannstreu**

A: K 422, S 98 / RL SL 3

Weinbergsmauern und -brachen im Tälchen S Beulenberg E Helfant (Tr) (6404/211), CaS 95; Atzbüsch und Umgebung NW Sehndorf (6504/114), ScT 87.

***Erysimum cheiranthoides* - Acker-Schöterich**

A: K 175, S 56 / RL SL *

Ruderalflächen im Industriegebiet Reinsfeld zwischen B 407 und Teich ca. 125 m SW Pkt. 477,5 (Tr) (6307/123), CaS, Sesterhenn & HeU 96; Aufschüttung auf dem Gelände des Segelflugplatzes SSE Kell (Tr) (6307/321), CaS 98.

***Euphorbia amygdaloides* - Mandelblättrige Wolfsmilch**

A: K 356, S 86 / RL SL 3

Bois de Velving E Velving (Lo) (6705/314), ScC & ScT 99; Bois d'Ottonville SW Ottonville (Lo) (6705/331), ScC & ScT 93.

***Euphorbia dulcis* ssp. *incompta* (= *E. dulcis* ssp. *purpurata*) - Süße Wolfsmilch**

A: K 349, S 85 / RL SL *

Forêt Communale de Filstroff (Lo) (6605/313), ScC & ScT 92.

***Chamaesyce maculata* (= *Euphorbia maculata*) - Gefleckte Wolfsmilch**

A: K -, S -

Pflasterritzen im Ortskern Bischmisheim (6708/325), KSb 98.

***Falcaria vulgaris* - Sichelwöhre**

A: K 437, S 102 / RL SL 3

Atzbüsch und Umgebung NW Sehndorf (6504/114), ScT 87; Kalkmagerrasen am Bovenberg NW Ottonville (Lo) (6705/321), ScC & ScT 99; Grasige Wegränder am Weg auf der Höhe um Pkt. 349,5 NW des Truppacherhofes (Pf) (6710/315), SaE 99.

***Festuca altissima* - Wald-Schwingel**

A: K 765, S 166 / RL SL *

Die Art ist im Saar-Ruwer-Hunsrück, dem Saarkohlenwald und dem Saarbrücken-Kirkeler-Wald verbreitet. Funde außerhalb dieser Räume:

“Sang” u. “Wollscheit” NW Spicheren (Lo) (6807/212), ScT 91; “Unterster Wald” NW Etzling (Lo) (6807/212), ScT 91; “Unterster Wald” N Behren-lès-Forbach (Lo) (6807/222), ScT 91.

***Festuca heterophylla* - Verschiedenblättriger Schwingel**

A: K 768, S 167 / RL SL *

Waldböschung an Camphauser Straße W Rodenhof (6707/235), WeJ 98; Südostrand Wolfsacht, Eichen-Hainbuchenwald W Zweibrücken, S Wattweiler (Pf) (6710/311), HeU 99.

***Filago arvensis* - Acker-Filzkraut**

A: K 633, S 139 / RL SL 3, B 3

Ruderalfläche im Güterbahnhof Saarbrücken W "Am Homburg" (6708/131), WeJ 98.

***Filago minima* - Kleines Filzkraut**

A: K 634, S 140 / RL SL 3

Magere Brachwiese W Hütschenhausen (Pf) (6510/423), WoP 96; Sandrasen am Sportplatz Bechhofen W Bechhofen (6610/134), HeU 93; Sandackerbrache W Wadgassen (6706/221), SaP 98, 99; Industriebrache NE Überherrn (6706/313), SaP 98; Sandbrache Gewerbegebiet West, W HELA-Markt St. Ingbert (6708/222), HeU 93; Sandrasen "Auf dem Hobels" St. Ingbert (6708/233), HeU 97-99.

***Fragaria viridis* - Hügel-Erdbeere**

A: K 261, S 70 / RL SL *

Mehrfach in versauerten Magerrasen zw. St. Oswald und dem Grand Bois de Bibiche N Beckerholz (Lo) (6605/311 u. 321), ScT u. SaP 99; Wärmeliebende Gebüsche am Südhang der Niederschleife NW Niedaltdorf (6605/315), ScT 93; Prallhang der Nied N Filstroff (Lo) (6605/323), ScC & ScT 99.

***Fumaria vaillantii* ssp. *vaillantii* - Gewöhnlicher Blasser Erdrauch**

A: K 169, S 55 / RL SL 3

Ackerrand am Linsenberg E Flastroff (Lo) (6605/124), ScT 99; Tal des Ruisseau de Weistroff SW Flastroff (Lo) (6605/132), ScT 99; Acker und Ackerbrachen in der Niederschleife NW Niedaltdorf (6605/411), ScT 99; Acker am Steinbruch an der Wackenmühle SW Hemmersdorf (6605/412), ScT 99; Reichlich in Äckern am Wallerscheid S des Mühlenhofes NE Rimschweiler (Pf) (6710/324), SaE 99; "Neuves Terres" E Betting-lès-St. Avold (Lo) (6806/425), ScC & ScT 90; Acker auf dem Steilberg SW der Ferme de Hellering N Macheren (Lo) (6806/432), ScC & ScT 90.

***Gagea villosa* - Acker-Goldstern**

A: K 732, S 160 / RL SL 1, B 3

Friedhof Ensdorf (6606/432), WoP 97.

***Galeopsis angustifolia* - Schmalblättriger Kalkschutt-Hohlzahn**

A: K 513, S 117 / RL SL *

Ruderalfläche am Bahnhof Sulzbach (6608/334), WeJ 99; Bahngleise bei Hirschbach NE Dudweiler (6708/113), WeJ 99; Rand der Industriebahn N der Brücke der Straße von Ixheim nach Mittelbach über den Hornbach bei Ixheim (Pf) (6710/322), SaE 99.

***Galeopsis segetum* - Gelber Hohlzahn**

A: K 512, S 117 / RL SL *

Vermutlich synanthropes Vorkommen am S-Rand der Verbreitung im Saarland:
Geschotterter Waldweg N Lambertsberg SW Kirkel (6709/123), HeU 96.

***Galium mollugo* s.str. - Kleinblütiges Wiesenlabkraut**

A: K -, S - / RL SL -

Südteil der Rohrblies SE Blieskastel (6709/421), WoP 91.

***Galium palustre* ssp. *elongatum* - Hohes Labkraut**

A: K 478, S 110 / RL SL *

Tal des Waldweistroffer Baches SW Flastroff (Lo) (6605/132), ScT 99; Forêt Domaniale de Bouzonville S Ferme de Dampont N Filstroff (Lo) (6605/312), ScC & ScT 99; Forêt Domaniale de Bouzonville u. Offenland im S und SW NW Bouzonville (Lo) (6605/321), ScT & SaP 99; Ferme du Ruisseau de Bibiche, Tal der Bibiche, Stockholz u. Niedaue N Bouzonville (Lo) (6605/332), ScT 99; Flur "Surwiese" u. Niedaue in Flur "Niedau" W Bouzonville (Lo) (6705/111), ScC & ScT 99; Offenland und Bois de Velving NE Velving (Lo) (6705/313), ScC & ScT 99; Bois de Velving und In der Flur "Neuglen" E Velving (Lo) (6705/314), ScC & ScT 99; Wiesen und Talaue N des Bois d'Ottonville am Ruisseau d'Ottonville SW Ottonville (Lo) (6705/321), ScC & ScT 99; Wiesen, Wald am NW-Rand des Bois de Bliesbruck (Lo) (6809/332), ScC & ScT 96.

***Galium saxatile* - Harzer Labkraut**

A: K 483, S 111 / RL SL *

Fichtenforst auf Sandboden SW Schoeneck (Lo) (6707/334), KSb 99.

***Galium sylvaticum* [s.str.] - Gewöhnliches Wald-Labkraut**

A: K 481, S 111 / RL SL *

Forêt Communale de Sierck (Lo) (6504/335), ScC, ScT & SaE 92; Vorderstewald S Guerstling (Lo) (6605/325), ScT 99; Wegrand im Pfaffenwald S St. Annual (6707/435), WeJ 99; Südost-
rand Wolfsacht, Eichen-Hainbuchenwald W Zweibrücken, S Wattweiler (Pf) (6710/311), HeU
99; Wald an der Flur Vorderste Berge N Alsting (Lo) (6807/214), WeJ 98; Lichter Waldhang im
Spicherer Tal N Alsting (Lo) (6807/215), KSb 98; Wald auf dem Römischen Kopf W Schön-
bach (6808/111), WeJ 98; Felsen am Steywald N Grosbliederstroff (Lo) (6808/122), WeJ 99.

***Galium x pomeranicum* - Weißgelb-Labkraut**

A: K -, S 111

"Unterster Wald" N Behren-lès-Forbach (Lo) (6807/222), ScT 91.

***Genista germanica* - Deutscher Ginster**

A: K -, S 75 / RL SL 4

Lichter Wald an ESE-exponiertem Hang im unteren Hengstbachtal SE Walshausen (Pf) (6710/435), SaE 99.

***Geranium purpureum* - Purpur-Storchschnabel**

A: K -, S - / RL SL *

G. purpureum breitet sich entlang der Bahnstrecken aus und ist im Saarland, wie anderswo, mittlerweile auf Eisenbahnschotter eingebürgert.

Gleise Hauptstuhl E Bhf. (Pf) (6510/435), WoP 94; Bahnlinie S Ottweiler (6609/111), WoP 97; Gleise am Bahnhof Limbach/HOM (6609/432), WoP 94; Gleise am ehem. Bahnhof Eichel-scheid (6610/134), WoP 94; Gleise NE Bruchmühlbach (Pf) (6610/213), WoP 94; Südwestlichstes Gleis am Hauptbahnhof Homburg (6610/321), WoP 94; Gleise am Bahnhof Rentrisch (6708/135), WoP 94; Gleise am Bahnhof St. Ingbert (6708/222), WoP 94; Gleisschotter der Bahn N Kleber-Gelände E St. Ingbert (6708/224), HeU 95; Gleise am Bahnhof Rohrbach (6708/225), WoP 94; Gleise am Bahnhof Scheidt (6708/314), WoP 94; Gleise am Bahnhof Saarbrücken-Ost (6708/322), WoP 94; Gleise am Bahnhof Kirkel (6709/124), WoP 94; Gleisschotter der Bahn NW Griesweiher SE Hassel (6709/131), HeU 95; Längs der Bahnlinie Zweibrücken - Pirmasens auf Gleisschotter überall eingebürgert (Pf) (6710/1, 4), SaE 99.

***Geum rivale* - Bach-Nelkenwurz**

A: K 248, S 69 / RL SL 2

Südlicher Quellarm des Limbwiesbaches am Nordhang des Bänkert W Berschweiler (6508/311), ScT 93; Feuchtwiesen im Quellgebiet S Abt. 357 des Staatsforstes Neunkirchen NW Stennweiler (6608/212!), ScT & StA 93; Spanischloch an der Straße von Creutzwald nach Merten (Lo) (6706/311), SkR 85.

***Gymnadenia conopsea* - Mücken-Händelwurz**

A: K 915, S 192 / RL SL *

Wiese am Arthenberg NW Abentheuer (Ko) (6308/231), ScC 96; Bois d'Hufelz N Kitzing (Lo) (6504/135φ), DiK 97; W-Hang des Hollenbach-Tales NE Freching (Lo) (6504/333φ), DiK 89; Halbtrockenrasen am Gallenberg NW Gisingen (6605/414), ScT 84; Magersäume am Wäldchen S Rémering-lès-Hergarten (Lo) (6705/233), ScT & SkR 86; NW-Hang N der Straße D55 NW Velving (Lo) (6705/312φ), DiK 93; Wiese SW Bambusch NE Téterchen (Lo) (6705/314), DiK 93; Monbijou E Althornbach (Pf) (6710/335), DiK 93; Wiesen am Ransbacher Berg N Hartungshof N Bliesransbach (6808/221), ScC, ScT & O. Orschiedt 88; S-Hang des Kreuzbergs SE Bliesmengen (6808/413), DiK 96; Bebuschter Halbtrockenrasen am Mühlenbach E Bebelsheim (6809/121), StP 99; Halbtrockenrasen N Höhe 299,0 W Walsheim (6809/134), StP 98; Halbtrockenrasen W d. Rebenklamm NW Reinheim (6809/331), StP 98; Halbtrockenrasen am Südwesthang d. Schlirbaches SE Bliesbruck (Lo) (6809/332), StP 99; Feuchtwiese am Ham-Bach S Chapelle St. Joseph S Ormersviller (Lo) (6809/424), ScC & ScT 93; Kalk-Quellmoor am Ham-Bach S Ormersviller (Lo) (6809/425), ScC & ScT 93, 95, MaM 96; Halbtrockenrasen am Moritzbrunnen E Guiderkirch (Lo) (6809/432), StP 91.

***Gymnadenia odoratissima* - Wohlriechende Händelwurz**

A: K -, S 192 / RL SL -

HAFFNER (1960) erwähnt *Gymnadenia odoratissima* von einem Halbtrockenrasen am Grünbacher Hof. Ein Vorkommen in diesem saarländischen Teil des Westrichs ist als Fortsetzung der pfälzischen Fundstellen durchaus wahrscheinlich. Die Art konnte in den vergangenen Jahren nicht mehr von dort bestätigt werden, so dass die Art im Saarland heute als ausgestorben gelten muss. Auch in der Pfalz sind die Vorkommen stark zurückgegangen: NSG Monbijou E Althornbach (Pf) (6710/335), WoP 94.

***Gymnadenia x intermedia* (= *G. conopsea* x *G. odoratissima*) - Hybride zw. Mücken- u. Wohlriechender Händelwurz**

NSG Monbijou E Althornbach (Pf) (6710/335), WoP 94.

***Gymnocarpium dryopteris* - Eichenfarn**

A: K 26 , S 27

Die unten aufgelisteten Funde verdichten das bereits bekannte Verbreitungsgebiet im Bereich des Saarbrücken-Kirkeler Waldes. Außerhalb davon eher zerstreut, so dass Meldungen zur Verdichtung der Verbreitungsbildes interessant sind.

Wald S Stuhlsatzenhaus N Scheidt (6708/134), WeJ 96; Wald S Reichenbrunn S St. Ingbert (6708/233), HeU 97; Wald auf Esch- und Schwarzenberg St. Johann (6708/313), WeJ 96; Wald am Eschberg W Scheidt (6708/314), WeJ 96; Landscheider Wald, Nordhang W Niederwürzbach (6709/312), HeU 99; Wald im Spicherer Tal N Alsting (Lo) (6807/215), WeJ 98; Wald im Simbachtal S Unner (Lo) (6808/112), WeJ 97; "Sang" u. "Wollscheit" NW Spicheren (Lo) (6807/212), ScT 91.

***Goodyera repens* - Netzblatt**

A: K -, S 192 / RL SL 1

Im Kiefernwald auf dem Nackberg zuletzt 1988 von ScT beobachtet. Seitdem mehrfach vergeblich (6505/412 u. 422), ScC & ScT 98; Monbijou E Althornbach (Pf) (6710/335), StP & DiK 92.

***Gypsophila muralis* - Mauer-Gipskraut**

A: K 122, S 47 / RL SL *, B 3

G. muralis ist in den Kalkgebieten selten und beschränkt sich hier offensichtlich auf sandig-lehmige Lösslehmdecken und Terrassensedimente.

Acker südlich des Waldes "Ewig" S Grindorff (Lo) (6605/122), ScC & ScT 99; Lehacker am Wasserbehälter E des Stockholzes N Bouzonville (Lo) (6605/332), ScT 99; Überschwemmte Ackersenke auf einer Niederterrasse S Kemmersbach S Hemmersdorf (6605/412), ScT 99; Wegrand an der ehemaligen Kläranlage SE Hassel (6709/131), HeU 98; Tal W Gutenbrunnen W Wörschweiler (6709/223), HeU 96; Flur "Breitenbusch" S Gaubiving (Lo) (6807/411), ScC & ScT 95.

***Helianthemum nummularium* ssp. *nummularium* - Zweifarbiges Sonnenröschen**

A: K 398, S 93 / RL SL *

Wiesen SE Hammerstein (Ko) (6309/224), ScC & ScT 96.

***Hieracium caespitosum* - Wiesen-Habichtskraut**

A: K -, S 154 / RL SL 2

Segelflugplatz SSE Kell (Tr) (6307/321), CaS 98; "Wingertberg" E Holling (Lo) (6705/131), ScC & ScT 99.

***Hieracium glaucinum* - Frühblühendes Habichtskraut**

A: K 710, S 154 / RL SL *

"Wingertberg" E Holling (Lo) (6705/131), ScC & ScT 99.

***Hieracium glaucinum* ssp. *fragile* - Frühblühendes Habichtskraut**

A: K -, S. - / RL SL -

Schieferfelsen an der Straße Kell-Grimburg am Sägemühlen-Berg (Tr) (6307/323), CaS 88, det. Gottschlich.

***Hieracium lactucella* - Geöhrttes Habichtskraut**

A: K 705 S 153 / RL SL 3, B3

Wildwiese zwischen Abt. 111 und Großer Prims am Rand des Weges, der die Lichtung teilt, ca. 375m SW Pkt. 582,4 E Thiergarten (Tr) (6308/111), CaS 95; Wildwiese im "Panzerschlag" ca. 200 m SW Pkt. 706,1 E Thiergarten (Tr) (6308/113), CaS 95; Wildwiese auf dem Sandkopf ca. 300 m NE Jagdhaus Fuchsbau, 750 m ü. NN, wenige Ex. nahe des Weges, Rest der Fläche wild(jagd)gerecht gedüngt, NW Muhl (Tr) (6308/122), CaS 95; In Feuchtwiesenrest am östlichen Ortsrand von Muhl im Zwickel zwischen Straße und Hengstbach, ca. 300 m SE Pkt. 618,0, wenige Ex. (Tr) (6308/124), CaS 95; Violion-Brache mit vereinzeltem Fichtenaufwuchs bei Abt. 134 NE des Hengstbaches ca. 150 m NE Regierungsbezirks-Grenze E Muhl (Tr) (6308/124), CaS 95; Magerweide am westlichen Ortsrand von Züsch ca. 130 m N Wbh. und Pkt. 555,2 mit *Thesium* (Tr) (6308/131), CaS 95; Magerwiese ca. 600 m SE Reiterhof Retzenhöhe, ca. 325 m NW Pkt. 533,1 NE Züsch (Tr) (6308/132), CaS 95; Magerer Zierrasen eines Vorgartens in St.Wendel-Alsfassen (6508/225), CaS 99; Unteres Frankenbachtal NW Dirmingen (6508/322), ScT & StA 93; Magerer Wiesenstreifen im Tal des Ruisseau de Weistroff SW Flastroff (Lo) (6605/132), ScT 99.

***Hieracium piloselloides* - Florentiner Habichtskraut**

A: K 706, S 154 / RL SL *

Ackerbrachen in der Niederschleife NW Niedaltdorf (6605/411), ScT 99.

***Hieracium schmidtii* ssp. *melaphyrogenis* - Blasses Habichtskraut**

A: K -, S - / RL SL -

Mittlerer Felskopf des Elsenfelses N Nohfelden (6408/214), J. Heinrichs 96.

***Himantoglossum hircinum* - Riemenzunge**

A: K 928, S 195 / RL SL 2, B3

Halbtrockenrasen am S-Hang des Kreuzberges zwischen Kirf und Meurich S Pkt. 363,3, 17 Ex. (Tr) (6404/235), CaS 95; Magersäume im Munitionsdepot im Schwarzbruch bei Eft-Hellendorf (6504/214), StA 99; W-Hang des Hollenbach-Tales NE Freching (Lo) (6504/333), DiK 93; Bebuschter Halbtrockenrasen SE Güdingen (6708/333), StP 93; Halbtrockenrasen am Altgeheg SW Ballweiler (6709/333), StP 99; Halbtrockenrasen am Südhang d. Osterberges N Wecklingen (6709/334), StP 99; Halbtrockenrasen im NSG Badstube SE Mimbach (6709/423 u. 424), StP 99; Bebuschter Halbtrockenrasen SE Fechingen (6808/115!), StP 93; Halbtrockenrasen am Wingertsberg W Wittersheim (6808/215), StP 98; Halbtrockenrasen am Lochfeld SW Wittersheim (6808/225), StP 99; Verbrachter Halbtrockenrasen oberhalb d. Landstr. S Auersmacher (6808/313!), StP 92; Halbtrockenrasen am Südhang des Kreuzberges S Bliesmengen (6808/413!), StP 98; Halbtrockenrasen am Südhang d. Rohrentales W Rubenheim (6809/122), StP 98; Halbtrockenrasen unterhalb des Steinbruchs NW Rubenheim (6809/123), StP 98; Mähwiese bei Höhe 282,3 N Herbitzheim (6809/124!), StP 98; Halbtrockenrasen am Großbirkel (NSG) N Riesweiler (6809/234!), StP 98; Halbtrockenrasen am Steinbruch (Lohe) NE Reinheim (6809/312!), StP 97; Verbrachter Halbtrockenrasen oberhalb des Wallringertal E Niedergailbach (6809/314), StP 99; Halbtrockenrasen am Südhang d. Totenkopfes E Obergailbach (Lo) (6809/325), StP 99; Halbtrockenrasen "Auf der Burg" S Riesweiler (6809/414), StP 99; Trockenhang NSG Wachholderberg S Peppenkum (6809/422), StP 97.

***Hippocrepis comosa* - Hufeisenklee**

A: K 332, S 82 / RL SL *

Magere Trockensäume am "Hoemerich" zum "Wingertberg" E Holling (Lo) (6705/131), ScC & ScT 99; Magerrasen am Westhang des Niedersberges NE Guiderkirch (Lo) (6809/432f), ScC & ScT 94; Westhang am Ortseingang bei Guiderkirch (Moritzbrunnen) (Lo) (6809/432f), ScC & ScT 94.

***Holosteum umbellatum* - Spurre**

A: K 96, S 43 / RL SL *

Sandbrache S Rabenhorst N Kirrberg (6610/333), HeU 97; An offenen Stellen der Maginot-Linien-Festung auf dem "Bovenberg" NW Ottonville (Lo) (6705/321), ScC & ScT 99; Zw. Enseldorf u. Bous (6706/212), StA 99; Bubenhausen (Pf) (6710/312), SaE 99; Colonie Neuland zw. Diesen u. Ham (Lo) (6806/111), CaS, ScC & ScT 95.

***Hordelymus europaeus* - Wald-Haargerste**

A: K 808, S173 / RL SL 3

Wald am Scharfenhübel E Spicheren (Lo) (6807/224), WeJ 99; Im Hinterwald und Wälder auf Kappelberg NW Bliesransbach (6808/125), KSb 99; Saarbrücker Stadtwald N Hartungshof N Bliesransbach (6808/221), ScC, ScT & O. Orschiedt 88.

***Hordeum secalinum* - Roggen-Gerste**

A: K -, S173 / RL SL 1, B3

Mähweide am Hang zum Remelbach S Colmen (Lo) (6605/133), ScT 99; Störstelle in Feuchtgrünland E des Bahnkörpers NE Petit Eberswiller (Lo) (6806/335), KG Moose 97.

***Huperzia selago* - Tannen-Bärlapp**

A: K -, S 21 / RL SL 1

N-exp. Waldwegböschung ca. 150 m unterhalb des Staudammes des Pionierweiher auf der südlichen Seite des Eschbachtals (Tr) (6307/111), CaS, Sesterhenn & HeU 96; An der NW-Flanke der Dollberge ca. 300 m SE des Waldparkplatzes am östl. Ortsrand von Zinershütten an einer hageren Stelle im Buchenwald, ein größerer Trupp (Tr) (6308/133), CaS 95; Wald am Känelbach SW Weißfels NW Eisen (6308/322), O. Göhl 80, 97 nicht mehr bestätigt; Sandsteinbruch SW Krähenberg (Pf) (6610/423), WoP 95.

***Hydrocotyle vulgaris* - Gewöhnlicher Wassernabel**

A: K 420, S 98 / RL SL 3

Reste von Waldbinsensümpfen einer aufgeforsteten Lichtung ca. 375 m WNW Pkt. 510,3 im Rotenbachtal (Tr) (6406/313φ), CaS 96.

***Hypericum montanum* - Berg-Johanniskraut**

A: K 385, S 92 / RL SL *

Waldwegrand am Felsenbrunnen SE Sengscheid (6708/412), WeJ 99.

***Ilex aquifolium* - Stechpalme**

A: K 369, S 88 / RL SL *

E Waldwiese im "Hinzhausen" NW Brücken (Ko) (6308/411), ScC 97; Hirschberg, Wald E Kinkel (6709/115), WoP 97.

***Inula salicina* - Weidenblättriger Alant**

A: K 637, S 141 / RL SL *

Außerhalb der Merziger Muschelkalkplatte, des Saar-Nied-Gaus, der Umgebung von Montech und des Bliesgaus selten und offensichtlich stark rückläufig.

Mehrfach in verbrachten Kalk-Magerrasen zw. St. Oswald und dem Grand Bois de Bibiche N Beckerholz (Lo) (6605/311 u. 321), ScT u. SaP 99; Magere Wegsäume am Forêt Communale de Filstroff (Lo) (6605/313), ScC & ScT 92; Magere Säume im Prallhang der Nied N Filstroff (Lo) (6605/323), ScC & ScT 92; Magere Säume an der Straße zw. Ferme du Ruisseau de Bibiche und Filstroff N Bouzonville (Lo) (6605/332), ScT 99; "Wingertberg" E Holling (Lo) (6705/131φ), ScC & ScT 99; Halbtrockenrasen in der Flur "Neuglen" NE Velving (Lo) (6705/314φ), ScC & ScT 99; Ackerrandstreifen am Pfaffenwald E Spicheren (Lo) (6707/435), WeJ 99; Säume am NW-Rand des Bois de Bliesbruck (Lo) (6809/332), ScC & ScT 96.

***Isolepis setacea* - Borstige Moorbirse**

A: K 859, S 181 / RL SL *

Illau bei Bubach (6507/432), ScT & StA 93; Pionierstelle auf dem Schwemmkegel des Ehlbaches im Alsbachtal S Alsweiler (6508/134), ScT 93; Offene Erdstellen in einem technisch umgestalteten Bachtal am südl. Ortsende von Marpingen (6508/314), StA 93; Offene Erdstelle in einer Weide in der Illau N Hirzweiler (6508/335), ScT 93, StA 93; Offenerdige Pionierstelle an der Ill talab der Mündung des Ahlenbaches in Hirzweiler (6508/431), ScT 93; Oberes Merschtal W Merschweiler (6608/133), ScT 93, StA 93; Offenerde Quellstelle in der Flur "Gebrannetickt" SW Merschweiler (6608/133), ScT & StA 93; Wechselfeuchter Waldwegrand E Rußhütte (6707/235), KSb 97; Wechselfeuchtes Bachbett N Neuweiler (6708/115), WeJ 99.

***Juncus alpinus* (= *J. alpino-articulatus*) - Alpen-Birse**

A: K -, S 165 / RL SL -, B 3

Saurer Magerrasen S Schönenberg (Pf) (6610/113), WoP 98.

***Juncus compressus* - Zusammengedrückte Birse**

A: K 754, S 164 / RL SL *

Rand eines Erdweges N des Waldes "Paffesch" E Flastroff (Lo) (6605/124), ScT 99; Mehrfach in Senken magerer Wiesen am Ruisseau de Weistroff zw. Flastroff und Waldweistroff (Lo) (6605/131 u. 132), ScC & ScT 99, ScT 99; Magerwiese auf Grubenschlacken E Rußhütte (6707/235), WeJ 98; Pflasterritzen am Zollhaus Goldene Bremm bei Saarbrücken (6707/433), KSb 97; Straßenrand bei der Kobenhütte am Rotenbühl Saarbrücken (6708/313), WeJ 97; Straßenrand am Bahnhof Schafbrücke (6708/324), WeJ 98.

***Juncus squarrosus* - Sparrige Birse**

A: K 753, S 164 / RL SL 3

Nach NW erweiterte Lichtung zwischen den Abt. 111 und 112 ca. 30 m SE der Gr. Prims E Thiergarten (Tr) (6308/111), CaS 95; Waldwegrand N der Gr. Prims (1) 470 m WSW Pkt. 582,4, (2) 440 m NNE Pkt. 582,4 E Thiergarten (Tr) (6308/111), CaS 95; E-Rand der langgestreckten Lichtung NW der Mittelschneise bei Abt. 123 ca. 650 m SE Pkt. 582,5 E Thiergarten (Tr)

(6308/112), CaS 95; Hengstbach-Quellgebiet, an nassen Waldwegrändern NE des Hengstbaches im SW-Teil von Abt. 137 und 138, NW Muhl (Tr) (6308/113), CaS 95; Lichtung beim Panzerschlag (1) Fahrweg am N-Rand der Lichtung, (2) Waldweg ca. 30 m NW der W-Ecke der Lichtung, (3) Waldweg ca. 200 m NW der W-Ecke der Lichtung E Thiergarten (Tr) (6308/113), CaS 95; Alter Waldweg in Abt. 89 W Fraubach-Quellgebiet, ca. 250 m W Wbh. N Züsch (Tr) (6308/121!), CaS 95; Alte Abgrabung beim Pkt. 735,0 E Sandkopf NW Muhl (Tr) (6308/123!), CaS 95; Reichlich im Juncion squarrosi ca. 100 m NE Pkt. 623,7, SW Muhl (Tr) (6308/123!), CaS 95; Dombach N Züsch (Tr) (6308/131), StA 99; SE-Hang zum Fraubachtal; an der Weggabelung oberhalb der Waldwiese ca. 600 m genau W Pkt. 660,4 (Retzenkopf), Züsch (Tr) (6308/131), CaS 95; An mehreren Stellen in der stellenweise heidig-moorigen Waldschneise von der Pfaffenstraße zur Straße Hermeskeil-Muhl ca. 100 m NE der Gemeindegrenze zu Züsch an der SE-Flanke des Sandkopfes von ca. 660 - 710 m ü. NN (Tr) (6308/132), CaS 95; Magerer Wegrund am Rand einer vernachlässigten Aufforstung oberhalb der Pferdeweiden des Reiterhofes Retzenhöhe ca. 300 m NE Pkt. 592,7 N Züsch (Tr) (6308/132), CaS 95; Moorige Mulde in einer fehlschlagenden Aufforstung ca. 150 m NNW Pkt. 558,3 W Königsbach NE Züsch (Tr) (6308/132), CaS 95; Ca. 50 m NE Pkt. 576,2 an der Straße Neuhütten-Muhl (Tr) (6308/133), CaS 95; Waldweg auf der Grenze zum Regierungsbezirk Koblenz ca. 200 m E Pkt. 595,1, NE Zinersshütten (Tr) (6308/134), CaS 95.

***Juncus subnodulosus* - Stumpfblütige Binse**

A: K-, S 165 / RL SL *, B 3

An mehreren Stellen in quelligen kalkreichen Nassbrachen N Punkt 238,6 SW Herbitzheim (6809/133), MaM 96; Quellige kalkreiche Nassbrache, S Punkt 330,3 N Gersheim (6809/133), MaM 96; Quellige kalkreiche Nassbrache, Geißbornhecke SE Breitfurt (6809/212), MaM 96; An mehreren Stellen in Nasswiesenbrachen am Stufenhang zum Galgenberg SW Niedergailbach (6809/322), MaM 96; Quellige Nassbrache innerhalb größerer Hangvertäschung S Straße Reinheim-Habkirchen W Reinheim (6809/331), MaM 96; Verschlammter abflussloser Grabenabschnitt S Straße zwischen Utweiler und Riesweiler N Utweiler (6809/414), MaM 97; An mehreren Stellen in quelligen kalkreichen Nassbrachen nahe Spring-Quelle SW Utweiler (6809/423), MaM 96; Feuchtweide am Ham-Bach S Chapelle St. Joseph S Ormersviller (Lo) (6809/424), ScC & ScT 93.

***Kickxia elatine* - Pfeilblättriges Tännelkraut**

A: K 559, S 126 / RL SL *

Die Verbreitungsdichte von *K. elatine* lockert in den Kalkgebieten ganz erheblich auf: Acker an der Côte de Marbach N Ferme du Ruisseau de Bibiche N Bouzonville (Lo) (6605/332), ScT 99; Wirbelfels N Merten (6706/131), ScC & ScT 91.

***Koeleria macrantha* - Zartes Schillergras**

A: K 812, S 174 / RL SL *

K. macrantha ist den Kalkgebieten selten und offensichtlich vor allem auf schwach entbasten Keuperlehmen zu beobachten:

Mehrfach in mageren Wiesen am Ruisseau de Weistroff zw. Flastroff u. Waldweistroff (Lo)

(6605/131 u. 132), ScT 99; Mehrfach in verbrachten Kalk-Magerrasen zw. St. Oswald und dem Grand Bois de Bibiche N Beckerholz (Lo) (6605/311 u. 321), ScT u. SaP 99.

***Lagarosiphon major* - Große Wasserpest**

A: K -, S - / RL SL -

L. major scheint an einzelnen Stellen fest eingebürgert zu sein:
Kiesgrubenteiche W Bildsorf (6606/224), WoP 99.

***Lathyrus nissolia* - Gras-Platterbse**

A: K -, S 78 / RL SL 2, B 2

Magerer, grasiger Wegsaum am Sportplatz NW Schwerdorff (Lo) (6605/125), ScT 99; St. Annualer Wiesen in Saarbrücken (6708/322!), HoW 98.

***Leersia oryzoides* - Europäische Reisquecke**

A: K -, S 178 / RL SL 2, B 3

Kiesgrubenteiche SW Nennig (6404/322), WoP 99; Geisweiler Weiher W Michelbach (6506/234), WoP 94; Nied-Ufer W Niedaltdorf (6605/411), WoP 99; Altarm an der Niedmündung NW Rehlingen (6606/111), CaS 97; Kiesgrubenteiche SW u. SE Nalbach (6606/222 u. 223), WoP 99; Uferbereich des Prinzenweiher St. Johann (6708/311), WeJ 98; Uferbereich des Ohligweiher S St. Annual (6808/111), WeJ 98.

***Legousia hybrida* - Kleiner Frauenspiegel**

A: K-, S 137 / RL SL -, B 2

Offene Pioniervegetation am "Bovenberg" NW Ottonville (Lo) (6705/321), ScC & ScT 99.

***Legousia speculum-veneris* - Echter Frauenspiegel**

A: K 618, S 137 / RL SL *, B 3

Äcker am Seitert S Rémering-lès-Hargarten (Lo) (6705/233), ScT & SkR 86.

***Lemna gibba* - Buckelige Wasserlinse**

A: K -, S 180 / RL SL *

Nied in der Niederschleife W u. NW Niedaltdorf (6605/315), ScT u. StA 95, CaS 97; Nied an der Mündung des Remelbaches S Niedaltdorf (6605/411), CaS 97; Altarm der Saar an der Niedmündung W Rehlingen, CaS 97; Kiesgrubenteiche N Bildsorf (6606/215), WoP 99; Colonie Neuland zw. Diesen u. Ham (Lo) (6806/111), CaS, ScC & ScT 95.

***Lemna minuta* - Zierliche Wasserlinse**

A: -, K - / RL SL -

Nördliches Bliesufer NW Habkirchen (6808/413), WoP 93; Blies an der Brücke Reinheim (6809/312), WoP 93; Blies unterhalb Schleuse Gersheim N Brücke (6809/313), WoP 93.

***Lemna trisulca* - Dreifurchige Wasserlinse**

A: K -, S 180 / RL SL 3

Mehrfach in der Nied W u. NW Niedaltdorf (6605/315), ScT u. StA 95; Lambsbachtal, in künstl. Teich an der Hütte S Kläranlage mit *Lemna minor* S Bechhofen (6610/315), HeU 99; Teich an der ehemaligen Kläranlage SE Hassel (6709/131), HeU 98; Panzergraben N Webenheim (6709/421), WoP 99; Lambsbachtal W Kirrberg (6710/111), WoP 98.

***Lemna turionifera* - Rote Wasserlinse**

A: K -, S 180 / RL SL *

Kiesbaggerweiher N Besch (6404/322), WoP 94; Ziegeleigrubenteich SSE Dirmingen (6508/332), WoP 99; Nied-Ufer Niedaltdorf (6604/411), WoP 98; Nied N Brücke Filstroff (Lo) (6605/232), WoP 94; Kiesgrubenteiche SW Nalbach (6606/222), WoP 99; Kiesgrubenteiche SE Nalbach (6606/223), WoP 99; Kiesgrubenteiche W Bildsdorf (6606/224), WoP 99; Südarm der Nied bei Bouzonville E Brücke (Lo) (6705/113), WoP 94; Fischteiche SW d. A 8 NW Wörschweiler (6709/214), WoP 94; Teich im Taubental W Homburg-Beeden (6709/231), WoP 98; Nordteil der Rohrbliess SE Blieskastel (6709/411), WoP 91; Panzergraben N Webenheim (6709/421), WoP 99; Colonie Neuland zw. Diesen u. Ham (Lo) (6806/111), CaS, ScC & ScT 95; Graben SE des Spitzwaldes S Ippling (Lo) (6808/331), ScC, ScT & WoP 92.

***Leontodon saxatilis* - Nickender Löwenzahn**

A: K 692, S 150 / RL SL *

Grasplätze nahe der Sportanlagen bei Ixheim (Pf) (6710/313), SaE 99.

***Limosella aquatica* - Schlammling**

A: K -, S 124 / RL SL 2

Im Frühjahr überschwemmte Ackersenke auf einer Niedterrasse S Kemmersbach S Hemmersdorf (6605/412), ScT 99.

***Linaria repens* - Gestreiftes Leinkraut**

A: K, S 125 / RL SL 2

Ehemaliger Gleisschotter S Schoeneck (Lo) (6707/335), WeJ 99; Gleisschotter an der Bahnlinie NE Rentrish (6708/221), WeJ 99.

***Linum tenuifolium* - Schmalblättriger Lein**

A: K 344, S 84 / RL SL 3, B 3

Steinbruchkante am Birzberg S Fechingen (6808/114), WeJ 97.

***Lithospermum arvense* ssp. *arvense* (= *Buglossoides arvensis*) - Acker-Steinsame**

A: K 488, S 113 / RL SL *

Vor allem im Saar-Nied-Gau, der Merziger-Muschelkalkplatte und auf den Höhen des Saar-Mosel-Gaus, sonst seltener:

Auf Vulkanitgrus in der SE-exp. Straßenböschung der Ortsumgehung von Rohrbach (Ko) (6409/211), CaS 98; Straße NW Hart-Wald zw. Grindorff u. Zeurange (Lo) (6605/112), ScC & ScT 99; Tal des Waldweistroffer Baches SW Flastroff (Lo) (6605/132), ScT 99; "Wingertberg" E Holling (Lo) (6705/131), ScC & ScT 99; Acker am Pfaffenwald E Spicheren (Lo) (6707/435), WeJ 99; Acker am Grosswitz N Alsting (Lo) (6807/215), KSb 98; Acker am Ransbacher Berg NW Bliesransbach (6808/125), WeJ 99.

***Lithospermum officinale* - Echter Steinsame**

A: K -, S - / RL SL -

Im Saarland noch nicht beobachtet, in Süd-Luxemburg und Lothringen sehr selten. Erste Meldung aus dem Moseltal:

NSG Kuebendellchen, in wechsell trockenem Saum, SE-exp. Hang (Lu) (6404/331), CaS 99.

***Lithospermum purpureocaruleum* (= *Buglossoides purpureocarulea*) - Blauroter Steinsame**

A: K 487, S 113 / RL SL 2

Gebüchsäume am "Heiligenkopf" W Eimersdorf (6605/224!), DiK 98; Wärmeliebende Gebüsch am Südhang der Niederschleife NW Niedaltdorf (6605/315), ScT 93, ScT & StA 95; Wärmeliebender Sukzessionswald am Südhang der Niederschleife NW Niedaltdorf (6605/411), ScT 99.

***Lotus tenuis* - Schmalblättriger Hornklee**

A: K 327, S 81 / RL SL 3, B3

Feuchter, toniger Erdweg S Wald "le Busch" zw. Flastroff u. Zeurange (Lo) (6605/123), ScT 99; Niedwiesen NW Rémfang (Lo) (6705/121), ScC & ScT 99.

***Lycopodium annotinum* - Sprossender Bärlapp**

A: K -, S 21 / RL SL 2

Birkenbruch im Altweiherbachtal zwischen Altweiher und der Großen Scheidschneise (Tr) (6307/111), CaS 99; N-exp. Waldwegböschung ca. 120 m unterhalb des Staudammes des Pionierweihers auf der südlichen Seite des Eschbachtals (Tr) (6307/111), CaS, Sesterhenn & HeU

96; Im Hengstbach-Quellgebiet ca. 170 m oberhalb (NW) Pkt. 618,0, NW Muhl (Tr) (6308/123), CaS 95; Wald am Känelbach SW Weißfels NW Eisen (6308/322), O. Göhl 80, 97 nicht mehr bestätigt.

***Lycopodium clavatum* - Keulen-Bärlapp**

A: K 2, S 21 / RL SL 3, B 3

Dombach N Züsch (Tr) (6308/131), StA 99; Wald in Haseldell NW Biedershausen (Pf) (6610/424), WoP 95; Zwischen Rischbachtal und Sechseichen N St. Ingbert (6708/212), HeU 98; Schüßler Wald, Fichtenschneise N Kirkel (6709/114), HeU 99; Wegböschung am Hutschucker Kopf, Kirkeler Wald S Kirkel (6709/125), HeU 96.

***Lysimachia thyrsoflora* - Straußblütiger Gilbweiderich**

A: K -, S 106 / RL SL 0

Lambsbachtal W Kirrberg (6710/111), WoP 98.

***Lythrum hyssopifolia* - Ysopblättriger Weiderich**

A: K 402, S 94 / RL SL 3, B 2

Pferdemosele S Nennig (6404/323), StA 99; Feuchter Ackerrand im Tal des Ruisseau de Weistroff SE Waldweistroff (Lo) (6605/131), ScC & ScT 99; Acker u. überschwemmte Ackersenke auf einer Niedterrasse S Kemmersbach S Hemmersdorf (6605/412), ScT 99; Staunasse Halde am Kraftwerk Ens Dorf (6706/212), StA 95; Vernässte Lehmmulde in Sandrasen (Fa. Festo) E St. Ingbert-Rohrbach (6709/121), HeU 98-99.

***Malva alcea* - Rosen-Malve**

A: K 376, S 90 / RL SL *

Magere Viehweide am E-exponierten Talhang zur Nied, Flur "Roeder", N Bouzonville (Lo) (6605/332), ScT 99; Schuttstelle an der Brücke über den Hornbach bei der Autobahnauffahrt Zweibrücken in Bubenhausen (Pf) (6710/312), SaE 99; Wohl ausgesät mit einer "Wildkräuter-Saatmischung" an Ackerrandstreifen E des Bornackerhofes NE Rimschweiler (Pf) (6710/324), SaE 99; Schuttstelle mitten im Ackerland auf der Höhe N des Geseilwaldes NW Kleinsteinhäuser (Pf) (6710/433), SaE 99.

***Melissa officinalis* - Zitronen-Melisse**

A: K -, S - / RL SL -

Im Westrich stellenweise eingebürgert:

Völlig eingebürgert in einem Gebüsch an einem kaum benutzten Feldweg S Pkt. 377,2 an der alten Römerstraße auf der Höhe E Niederhausen (Pf) (6710/215), SaE 99; Ruderales Gebüsch zwischen der Eisenbahn und der westlich verlaufenden Straße am Fußgängerweg mit Brücke über den Hornbach im N-Teil von Contwig (Pf) (6710/231), SaE 99; Eingebürgert am W-Wand des Waldes "Seitters" N Mittelbach (Pf) (6710/321), SaE 99.

***Medicago falcata* [s.str.] - Gelbe Luzerne**

A: K 315, S 79 / RL SL *

Säume am Tiergartenwald S Colmen (Lo) (6605/313), ScT 99; Mehrfach in versäumten Mager-
rasen zw. St. Oswald und dem Grand Bois de Bibiche N Beckerholz (Lo) (6605/321), ScT u.
SaP 99; Magerrasen-Säume am Hoemerich E Holling (Lo) (6705/131φ), ScC & ScT 99; Halb-
trockenrasen am Bovenberg NW Ottonville (Lo) (6705/321), ScC & ScT 99.

***Menyanthes trifoliata* - Fieberklee**

A: K 470, S 109 / RL SL 3, B 3

Quellmoor in Weide NW der Ortslage Züsch ca. 500 m W Forsthaus (Tr) (6308/131), CaS 95;
Königsbachtal E Pkt. 533,1 südlich der Feldwegquerung an zwei Stellen NW des Feuchtwei-
dengebietes "Im Bruch", NW Zinershütten (Tr) (6308/132), CaS 95; Wilmeswies SW Rusch-
berg (Ko) (6309/432), ScC 97; Wiesen am Eschelbach NE Zinkweilerhof (Ko) (6309/434), ScC
96; Ehem. Gräben in der Randsenke des Alsbachtales gegenüber der alten Mühle in der Ortslage
Berschweiler (6508/322), ScT 93; Spanischloch an der Straße von Creutzwald nach Merten
(Lo) (6706/311), SkR 85.

***Meum athamanticum* - Bärwurz**

A: K -, S 100 / RL SL -

Langwiese S Börfink (Ko) (6308/221), ScC 97.

***Mibora minima* - Sand-Zwerggras**

A: K -, S 170 / RL SL 0, B 2 !

Die Art wurde im Kartiergebiet zuletzt von Haffner in den 30er Jahren, möglicherweise auch
noch in den 50er Jahren in den Sandgruben an der "Pachtener Ath" NW Dillingen-Pachten
beobachtet.

Aufschüttung am südöstlichen Ortsrand von Merten (Lo) (6706/311), CaS 99; Sandfelder der
Baumschule Kappel SE Merten (Lo) (6706/311), CaS 99.

***Mimulus guttatus* - Gefleckte Gauklerblume**

A: K -, S - / RL SL -

Ufer des Großbaches in Oberzerf (Tr) (6406/111), CaS 98.

***Mimulus moschatus* - Moschus-Gauklerblume**

A: K -, S 124 / RL SL *

Abgelassener Teich im Hölzbachtal zwischen Rappweiler und Niederlosheim SW Mangenkopf;
mit *Riccia huebeneriana* (6406/423!), CaS 98.

***Minuartia hybrida* ssp. *vaillantiana* - Schmalblättrige Miere**

A: K 90, S 43 / RL SL 2, B 3

Friedhofsmauer Remerschen (Lu) (6504/112), CaS 99; Offene, lückige Kalk-Magerrasen um die Spähköpfe der Maginot-Linie am Bovenberg NW Ottonville (Lo) (6705/321), ScC & ScT 99; Bahnschotter im Westteil des ehem. Bahnhofs Überherrn (6706/312), CaS 99.

***Misopates orontium* - Acker-Löwenmaul**

A: K 556, S 125 / RL SL *, B 3

M. orontium hat ihren Verbreitungsschwerpunkt in den Lehm- und Vulkanitgebieten des Mittleren Saarlandes. Meldungen aus dem Süden und Südwesten des Kartiergebietes sind dagegen selten:

Lehmacker am Wasserbehälter E des Stockholzes N Bouzonville (Lo) (6605/332), ScT 99; Acker u. überschwemmte Ackersenke auf einer Niederterrasse S Kemmersbach S Hemmersdorf (6605/412), ScT 99; Acker auf dem Obertaler Berg S Oberwürzbach (6708/415), HeU 99.

***Molinia arundinacea* - Rohr-Pfeifengras**

A: K 839, S 177 / RL SL *

Kartierkritische Sippe. Unterscheidungsmerkmale zu *M. caerulea* siehe WOLFF in LANG & WOLFF (1993). Sicher belegte Funde:

Forêt Communale de Sierck (Lo) (6504/335), ScC, ScT & SaE 92; Forêt Domaniale de Bouzonville S Ferme de Dampont N Filstroff (Lo) (6605/312), ScC & ScT 99; Forêt Domaniale de Bouzonville NW Filstroff (Lo) (6605/321), ScT u. SaP 99; Böschung über der Bahnlinie NE Rentrish (6708/221), WeJ 98.

***Monotropa hypophegea* - Kahler Fichtenspargel**

A: K 449, S 104 / RL SL *

Buchenhang im Grohbachtal NW Blieskastel-Bierbach (6709/222), HeU 98; Unter Buchen im Niederwald N Kappelberg S Brebach-Fechingen (6808/115), HeU 99.

***Monotropa hypopitys* s. str. - Echter Fichtenspargel**

A: K 448, S 104 / RL SL *

Mischwald SW Füllenbusch W Hassel, SE St. Ingbert (6708/234), HeU 93-94.

***Montia arvenis* Wallr. (= *Montia fontana* ssp. *chondrosperma*) - Acker-Quellkraut**

A: K -, S 42 / RL SL 2, B 3

Sandacker in Baumschule E Folsterhöhe (6707/424), WeJ 99.

***Montia fontana* (= *Montia fontana* ssp. *fontana*) - Glanzsamiges Bach-Quellkraut**

A: K -, S - / RL SL -

Im Königsbachtal nahe der nördlichen Quadrantengrenze in quelligen, durch Weidevieh zertretenen *Carex rostrata*-Beständen ca. 625 m WNW Forsthaus Neuhütten (Tr) (6308/312), CaS 94, teste H. Reichert.

***Montia hallii* (A. Gray) Greene - Mittleres & Veränderliches Bach-Quellkraut**

Abweichend der Standardliste folgen wir bei *Montia fontana* s.l. dem taxonomischen Konzept von SKALICKY & SUTORY in KVETENA (1990) Bd. 2 72 - 74 (Flora der CR) und fassen *Montia fontana* ssp. *variabilis* und *amporitana*, die durch Übergänge lückenlos miteinander verbunden sind, unter *Montia hallii* zusammen.

A: K -, S 42 / RL SL 2 (*M. f.* ssp. *amporitana*), A: K 87, S 42 / RL SL 2 (*M. f.* ssp. *variabilis*)

Kleiner rechter (westlicher) Zufluss des Dombaches innerhalb der Ortslage Züsch, Pferdeweide (Tr) (6308/131), CaS 95; Quelliges *Calthion* im Tälchen am westlichen Ortsrand von Züsch, ca. 200 m N Wbh. und Pkt. 555,2 (Tr) (6308/131), CaS 95; Pferdeweiden des Reiterhofes Retzenhöhe ca. 150-200 m SE Pkt. 592,7 NE Züsch, an quelligen Stellen reichlich (Tr) (6308/132), CaS 95; Zentraler Bereich der Flur "Im Bruch" N Zinershütten, ca. 200 m ESE Pkt. 533,1 (Tr) (6308/132), CaS 95; Quellbereich des Seel-Baches S Flugplatz Wustweiler (6508/334), ScT & StA 93; Quellbereich des Ahlenbaches S Mainzweiler (6508/432), ScT 93.

***Myosotis discolor* - Buntes Vergissmeinnicht**

A: K 495, S 115 / RL SL *, B 3

Wiesen S Ellenberg (Ko) (6308/235), ScC & ScT 97; Wiesen W Elchweiler (Ko) (6309/121), ScC 97; Mehrfach in den Wiesen SE Hammerstein (Ko) (6309/214 u. 224), ScC & ScT 96; Felsgrusflur W Steibericher Hof E Weiersbach (Ko) (6309/334), ScC & ScT 94; Wiesen E Gölfelborn-Berg S Sienhachenbach (Ko) (6310/215), ScC 94, ScC 96; Wiesenhang N der Straße Mettweiler-Breitsesterhof E Mettweiler (Ko) (6409/225), ScC & ScT 97; Sandige Straßenböschung E Ortsrand St. Ingbert (6708/223), HeU 97-98; "Verkehrinsel" in der AS St. Ingbert-West N Sengscheid (6708/232), ScT 99; Magere Wiesen auf Mittlerem Buntsandstein in der Flur "Hoff" S Cité des Genêts zw. Diesen u. Ham (Lo) (6806/111), CaS, ScC & ScT 95.

***Myosotis laxa* (= *M. laxa* ssp. *caespitosa*) - Rasen-Vergissmeinnicht**

A: K 498, S 115 / RL SL *") (Bei KORNECK, SCHNITTLER & VOLLMER 1996 irrtümlich als SL •)

Sumpf am Großbach S Oberzerf im Bereich einer fehlschlagenden Fichtenaufforstung (Tr) (6406/111), CaS 98.

***Myosotis scorpioides* - Sumpf-Vergissmeinnicht**

A: K 500, S 115 / RL SL *

Tal des Waldweistroffer Baches SW Flastroff (Lo) (6605/132), ScT 99; Flur "Surwiese" u. Niedaue in Flur "Niedau" W Bouzonville (Lo) (6705/111), ScC & ScT 99; Wiesen und Talau N des Bois d'Ottonville am Ruisseau d'Ottonville SW Ottonville (Lo) (6705/321), ScC & ScT 99; Colonie Neuland zw. Diesen u. Ham (Lo) (6806/111), CaS, ScC & ScT 95.

***Myosurus minimus* - Kleines Mäuseschwänzchen**

A: K 53, S 153 / RL SL 2

Friedhof Reinsfeld, 1 Ex. (Tr) (6307/123), CaS 98; Nasser Maisstoppelacker NE Glockenhof (Lo) (6706/311), CaS 99; Sandiger Acker mit reicher Wildkräuterflur N Wörschweiler(hof) (6709/214), HeU 97; Nackte Stelle in einer Weide am SE-Fuß des Teschenberges W Niederhausen (Pf) (6710/213), SaE 99.

***Myriophyllum spicatum* - Ähriges Tausendblatt**

A: K 416, S 97 / RL SL 2

In der Nied ist *M. spicatum* verbreitet und vermutlich aus allen Rasterfeldern nachweisbar. Auch in den Baggerweihern an Mosel und Prims tritt die Art verbreitet auf. Funde außerhalb dieser Bereiche:

Östl. Schlammweiher N Hühnerfeld (6608/334), WoP 94.

***Narcissus poeticus* - Dichter-Narzisse**

A: K 747, S 163 / RL SL *

An mehreren Stellen eingebürgert in Magerwiesen und -brachen zwischen Reiterhof Retzenhöhe und dem Königsbachtal NE Züsch (Tr) (6308/132), CaS 95; Eingebürgert in einer Magerwiese SE Allmen SE Habkirchen (6808/415), DiK 97.

***Narcissus pseudonarcissus* - Gelbe Narzisse**

A: K-, S 163 / RL SL U, B 3

Rotbachtal (1) ca. 600 m SSW Rückersbergerhof rechts des Rotbaches, (2) ca. 1100-1200 m SSW Rückersbergerhof links des Rotbaches (Tr) (6307/223), Zimmer 95; Rotbachtal (1) ca. 300 m ESE Rückersbergerhof rechts des Rotbaches, (2) ca. 400-450 m ESE Rückersbergerhof links des Rotbaches (Tr) (6307/224), Zimmer 95; Magere Talwiese am Lösterbach/Dörrenbach unmittelbar N der B52 beim Eisenbahnmuseum Hermeskeil, ca. 600 Ex. (Tr) (6307/231), CaS & S. Zimmer 95; Altbekannte Stelle in den Wiesen am Einschiederhof S Börfink (Ko) (6308/125), ScC 97.

***Nardus stricta* - Borstgras**

A: K 840, S 177 / RL SL *

Meldungen außerhalb des montanen Verbreitungsschwerpunktes sind heute selten: Magerrasen am Elstersteinpark, St. Ingbert-Nord (6708/212), HeU 93; Magerrasen N Glashütter Weiher NE St. Ingbert-Rohrbach (6709/111), HeU 98; Magere Wiesen auf Mittlerem Buntsandstein in der Flur "Hoff" S Cité des Genêts zw. Diesen u. Ham (Lo) (6806/111), CaS, ScC & ScT 95.

***Nasturtium officinale* - Echte Brunnenkresse**

A: K 183, S 57 / RL SL 3

Graben in Bliesau SW Blickweiler (6709/335), HeU 97.

***Neottia nidus-avis* - Nestwurz**

A: K 911, S 191 / RL SL *

Der Nestwurz ist in den Räumen außerhalb der Muschelkalkgebiete selten, so auch im Keuperhügelland:

Mehrfach im Tiergarten-Wald S Colmen (Lo) (6605/133 u. 313), ScT 99; Neunkircher Heck NW Niedaltdorf (6605/135), ScT 99; Mehrfach im Forêt Domaniale de Bouzonville NW Filstroff (Lo) (6605/311, 312, 313, 321 u. 322), ScC & ScT 93, ScC & ScT 99, ScT & SaP 99; Forêt Communale de Filstroff (Lo) (6605/313), ScC & ScT 92; Grossenwald W Heining-lès-Bouzonville (Lo) (6605/335), ScC & ScT 99; Bois de Haerdtschen bei Rémelfang (Lo) (6705/121), ScT 88; Bois de Kobenloch E Holling (Lo) (6705/131), ScC & ScT 99; Bois de Velving E Velving (Lo) (6705/314), ScC & ScT 99; Bois d'Ottonville SW Ottonville (Lo) (6705/331), ScC & ScT 93.

***Nuphar lutea* - Gelbe Teichrose**

A: K 129, S 48 / RL SL 2

Nied N Bouzonville (Lo) (6605/332), ScT 99, verbreitet in der Nied und aus allen Rasterfeldern nachgewiesen zw. Niedwelling und der Niedmühle S Eimersdorf (6605/1, 2, 3, 4), u.a. ScT & StA 95, CaS 97; Altarm an der Niedmündung (6606/111), CaS 97.

***Nymphaea alba* - Weiße Seerose**

A: K 128, S 48 / RL SL 1

Heute wieder zerstreut in der Nied:

Vom Niedknie S Siesmorgen bis vor die Metzgerbachmündung (6605/224, 225 u. 235), CaS 97; Zw. Kerprich-Hemmersdorf u. Großhemmersdorf (6605/232 u. 233), CaS 97; Von Niedwelling bis in die Niederschleife (6605/315 u. 411), CaS 97.

***Oenanthe aquatica* - Großer Wasserfenchel**

A: K -, S 100 / RL SL 2

Étang de Merbette E Longeville-lès-St. Avold (Lo) (6806/321), ScT 91.

***Oenanthe fistulosa* - Röhriger Wasserfenchel**

A: K -, S 100 / RL SL 1, B 3

Flutmulden und Gräben in der Flur "Surwiese" u. Niedaue in der Flur "Niedra" W Bouzonville (Lo) (6705/111), ScC & ScT 99; Flutmulden in den Niedwiesen in der Flur "Klopp" NW Vaudreching (Lo) (6705/112), ScC & ScT 99; Flutmulden in den Niedwiesen NW Rémelfang (Lo) (6705/121), ScC & ScT 99; Feuchtwiesen E des Spitzwaldes SE Ipppling (Lo) (6808/331), ScC & ScT 92.

***Oenanthe peucedanifolia* - Haarstrangblättriger Wasserfenchel**

A: K 431, S 100 / RL SL 3, B 2

Wiesen NE Sportplatz Birkenfeld (Ko) (6309/131), ScC, ScT & HeU 97 (Bestätigung eines Fundes von O. Göhl); Nasse Randsenke der Illaue am Sportplatz in Calmesweiler (6507/433), ScT & StA 93; Niedermoor und Seggenbestände im Tal des Wurzelbaches zwischen Eichenhof und Wurzelbacher Ziegelhütte, sehr reiches Vorkommen (6508/233), CaS 99; Mehrfach in lange überschwemmten Senken in der Alsbachau S Marpingen (6508/313), ScT & StA 93; Nebental des Alsbaches SE der Kreuzhöfe W Marpingen (6508/313), StA 93; Nasse Senken in der Alsbachau an der Mündung des Frankenbaches NE Dirmingen (6508/322), ScT & StA 93; Seifenwies NW Hüttigweiler (6608/114), ScT 93.

***Ophioglossum vulgatum* - Gewöhnliche Natterzunge**

A: K 9, S 23 / RL SL 3, B 3

Wiesen "Im Grämel" W Meckenbach (Ko) (6308/431), ScC 97; Wiesen NE Sportplatz Birkenfeld (Ko) (6309/131), ScC, ScT & HeU 97; Wiesen in der Nahe-Schleife N Enzweiler (Ko) (6309/214), CaS 97; Wiesen S Idar-Oberstein (Ko) (6309/214), ScC & ScT 96; Wiesen SE Hammerstein (Ko) (6309/224), ScC & ScT 96; Eschenwald im Wald "Butterchen" SW Sillenberg zwischen Biringen u. Waldwisse (6505/324), ScT 99; Eschen-Bestand im "Giewerst"-Wald S Biringen (6505/333), ScT 99; Feuchte Wiese im Quellgebiet des Bruchelsbaches E des Wareswaldes NE Tholey (6508/114), ScT & StA 93; 2 Stellen in mageren Feuchtwiesen am Bärenbest S Marpingen (6508/314), StA 93; Magere Weiden N Seibertswald S Urexweiler (6508/325), ScT & StA 93; Magere Feuchtwiesen am Ruisseau de Weistroff SE Waldweistroff (Lo) (6605/131), ScT 99; Unter Pappeln am ehem. Roderweiher E Forêt Communale de Filstroff (Lo) (6605/313), ScC & ScT 92; Wiesen im Quellgebiet des Weinbaches ("Gisinger Wiesen") E Gisingen (6605/425), ScC & ScT 99; Niedwiesen NW Rémelfang (Lo) (6705/121), ScC & ScT 99; Quellhorizont am S-Hang E Moulin de Felschling S Berviller (Lo) (6705/224), SkR 85; Quellhorizont am W-exponierter Stufenhang zum Berviller Bachtal N Merten (Lo) (6705/235f), ScT & SkR 86; Wiese S Dalhauser Klamm SW Heckendalheim (6708/423), Quellige Wiese W Lauterbachklamm E Heckendalheim (6708/424), HeU 98; Quellige kalkreiche Nassbrache am Stufenhang zum Kalbenberg E Ballweiler (6709/334), MaM 96; Wiese u.

Waldstück am Birzberg E Bübingen (6808/124), WeJ 97; Sumpf-Seggenried in Nassbrachenkomplex am Kot-Bach nahe Hasen-Quelle S Medelsheim (6809/422), MaM 96.

***Ophrys apifera* ssp. *apifera* - Gewöhnliche Bienen-Ragwurz**

A: K 932, S 196 / RL SL 3, B 2

Halbtrockenrasen am S-Hang des Kreuzberges zwischen Kirf und Meurich S Pkt. 363,3, mind. 5 Ex., noch knospend (Tr) (6404/235), CaS 95; Hammelsberg NE Apach (Lo) (6504/134φ), DiK 98; NW-Hang N der Straße D 55 NW Velving (Lo) (6705/312), DiK 93; Gemähte Halbtrockenrasen am Birmichel N Velving (Lo) (6705/313), ScC & ScT 99; Halbtrockenrasen in der Flur "Neuglen" E Velving (Lo) (6705/314), ScC & ScT 99; Kalksteinbruch Berus (6706/121), ScT u. P. Maas 85; Wiese auf dem Forbacher Berg N Spicheren (Lo) (6707/433), KSb 97; St. Arnualer Wiesen in Saarbrücken (6708/322 u. 332), HoW 98; Bebuschter Halbtrockenrasen SE Güdingen (6708/333), StP 93; Halbtrockenrasen in altem Steinbruch am Wickersberg W Ensheim (6708/431), HeU 99; Halbtrockenrasen am Altgeheg SW Ballweiler (6709/333), StP 99; Halbtrockenrasen am Kalköfenhübel, an der Skihütte Kirrberg S Kirrberg (6710/113), HeU 97-99; Origaneten-Brachflächen auf Neuves Terres E Betting-lès-St. Avoird (Lo) (6806/425), ScC & ScT 90; Halbtrockenrasen W Steinbruch S Schornwald NW Rubenheim (6809/113), HeU 94; Bebuschter Halbtrockenrasen am Mühlenbach E Bebelsheim (6809/121φ), StP 99; Halbtrockenrasen am Südhang d. Rohrentales W Rubenheim (6809/122), StP 98; Halbtrockenrasen oberhalb des Elektrizitätswerks W Herbitzheim (6809/123), StP 95; Halbtrockenrasen am Bubenberg NE Guiderkirch (Lo) (6809/422), StP 94; Halbtrockenrasen am Osthang b. Schäfersmühle N Guiderkirch (Lo) (6809/422), StP 96; Magerer Saum nahe Kalkquellmoor S Ormersviller (Lo) (6809/425), ScC & ScT 93; Halbtrockenrasen nordöstl. Buchenbusch W Epping (Lo) (6809/434), StP 94.

***Ophrys apifera* ssp. *friburgensis* - Freiburger Bienen-Ragwurz**

A: K -, S 196

Mehrfach in verbrachten Halbtrockenrasen zw. St. Oswald und dem Grand Bois de Bibiche N Beckerholz (Lo) (6605/311), ScT u. SaP 99; Gemähte Halbtrockenrasen am Birmichel N Velving (Lo) (6705/313), ScC & ScT 99.

***Ophrys araneola* - Kleine Spinnen-Ragwurz**

A: K-, S- / RL SL -, B 2

Badstube S Mimbach, in ca. 30 Exemplaren im Halbtrockenrasen am W-Rande des Kerbtälchens (6709/423), u.a. StP, CaS, ScT, ScC, A. Werno 99.

Das Indigenat dieses Vorkommens muss als ausgesprochen unsicher gelten. Die Verbreitungsgrenze der Kleinen Spinnen-Ragwurz verläuft in Lothringen etwa parallel mit der Dogger-Stufe. Vorkommen auf der rechten Moselseite sind nur aus der Umgebung von Nancy, Delme und Lorry-Mardigny bekannt. Neben der reinen Art sind in der Badstube zudem auch Bastarde der Kleinen Spinnen-Ragwurz mit der Hummel-Ragwurz beobachtet worden. Gleichfalls tritt seit einigen Jahren *Ophrys insectifera* x *O. holosericea* in der Badstube auf, obwohl das eine Eltern-teil, die Fliegen-Ragwurz, dem Gebiet und seiner Umgebung fehlt. Die Häufung dieser "Spezialitäten" legt den Verdacht nahe, dass sie alle in der Badstube künstlich eingebracht wurden.

In der näheren und weiteren Umgebung von Homburg treten seit einigen Jahren immer wieder vermutlich oder zweifelsfrei angesalbte Orchideen auf, wie *Ophrys sphegodes* agg. bei Kirrberg und *Orchis tridentata* bei Böckweiler. Die Kalk-Halbtrockenrasen des Bliesgaus und des Westrich sind von Natur aus außergewöhnlich reich an Orchideen und anderen seltenen Arten. Sie bedürfen keiner weiteren Artenanreicherung. Ansalbungen und Einbürgerungen sind zudem aus mehreren Gründen abzulehnen: Eingebürgerte oder eingeschleppte Arten sind z.T. konkurrenzstärker und können einheimische Arten verdrängen (z.B. die Robinie); durch das Einbringen fremder Sippen können einheimische Sippen oder Populationen durch Introgression genetisch verändert werden, so dass die Ergebnisse jahrhundertelanger - ja jahrtausendelanger - Evolution und damit auch lokaler Anpassungen zunichte gemacht werden, mit möglicherweise negativen Auswirkungen auf den Artbestand des Gebietes; die Ansalbung von Arten, die in der entsprechenden Region nicht vorkommen, erschwert die Erforschung der heimischen Pflanzenwelt unnötig, indem natürliche Ausbreitungsvorgänge - wie sie bei Orchideen in den letzten 200 Jahren in großem Rahmen stattgefunden haben - verwischt werden und Neufunde prinzipiell erst einmal in Frage gestellt werden müssen.

***Ophrys holosericea* - Hummel-Ragwurz**

A: K 931, S 196 / RL SL 3, B 2

W-Hang im Tal des Hollenbach NE Freching (Lo) (6504/333), DiK 93; Wiese SW Bambusch NE Téterchen (Lo) (6705/314), DiK 93; Battenberg S Zinzing (Lo) (6808/132), ScC & ScT u. WoP 92; Halbtrockenrasen am Wingertsberg W Wittersheim (6808/215), StP 98; Halbtrockenrasen am Lochfeld SW Wittersheim (6808/225), StP 99; Halbtrockenrasen am Südhang d. Rohrentales W Rubenheim (6809/122), StP 98; Halbtrockenrasen am Bubenberg NE Guiderkirch (Lo) (6809/422), StP 94; Halbtrockenrasen NE Buchenbusch W Epping (Lo) (6809/434), StP 94.

***Ophrys insectifera* - Fliegen-Ragwurz**

A: K 930, S 196 / RL SL 3, B3

Altbekannte Stelle am W-Hang im Tal des Hollenbach NE Freching (Lo) (6504/333φ), DiK 89; SW Waldrand Bambusch NE Téterchen (Lo) (6705/314), DiK 93; Halbtrockenrasen N Wbh. am Brandenbusch NW Grosbliederstroff (Lo) (6808/131), StP 93; Halbtrockenrasen am Südwesthang d. Rußtales E Altheim (6809/225), StP 99; Halbtrockenrasen am Westhang d. Billenberges S Altheim (6809/234), StP 99; Halbtrockenrasen am W-Hang des Buchenbergs SE Niedergailbach (6809/324), DiK 96, StP 98; Halbtrockenrasen S d. "Buchenbösch" SE Ormersviller (Lo) (6809/425), StP 98.

***Ophrys x albertiana* (= *O. holosericea* x *O. apifera*) - Hybride zw. Hummel-Ragwurz u. Bienen-Ragwurz**

A: K -, S 196

"Wolferskopf" W Haustadt (6506/333), ScT 82-86, DiK 88, ScT 96; Gebüschrund W-Hang Hirnberg NE Ihn (6605/412), DiK 84.

***Ophrys x devenensis* (= *O. insectifera* x *O. holosericea*) - Hybride zw. Fliegen-Ragwurz u. Hummel-Ragwurz**

A: K -, S 196

Hammelsberg NE Apach (Lo) (6504/134f), DiK 98 (alte, schon Haffner seit ca. 1960 bekannte Fundstelle, vermutlich irrtümlich als verschollen angegeben); "Wolferskopf" W Haustadt (6506/323φ), DiK 89, ScT 96 (alte, schon Haffner bekannte Fundstelle im Zentrum des NSG Wolferskopf).

***Orchis mascula* ssp. *mascula* - Großes Knabenkraut**

A: K 924, S 194 / RL SL 3

Mehrfach in den Wiesen SE Hammerstein (Ko) (6309/214 u. 224), ScC & ScT 96; Wiesen in der Nahe-Schleife N Enzweiler (Ko) (6309/214), ScC & ScT 97; Hammelsberg NE Apach (Lo) (6504/134φ), DiK 95; W-Hang im Tal des Hollenbach NE Freching (Lo) (6504/333φ), DiK 93; Laubwälder oberhalb (NW) der Niederschleife NW Niedaltdorf (6605/135), ScT 99; Neunkircher Heck NW Niedaltdorf (6605/135), ScT 99; Buschwerk bei Moulin de Grafenthal W Hemmersdorf (Lo) (6605/231), DiK 93; Bois du Haerdtschen bei Rémelfang (Lo) (6705/121), ScT 88; Bois de Kobenloch E Holling (Lo) (6705/131), ScC & ScT 99; Wiese u. Waldrand SW Bambusch NE Téterchen (Lo) (6705/314), DiK 93; Magerwiese oberhalb d. Karcherhofes W Ensheim (6708/431), StP 98; Verbrachter Halbtrockenrasen an der Landstraße S Auersmacher (6808/313), StP 92.

***Orchis militaris* - Helm-Knabenkraut**

A: K 922, S 194 / RL SL 3

W-Hang im Tal des Hollenbach NE Freching (Lo) (6504/333φ), DiK 89; Mehrfach in verbrachten Halbtrockenrasen zw. St. Oswald und dem Grand Bois de Bibiche N Beckerholz (Lo) (6605/311), ScT & SaP 99; Magerwiese am südexponierten Prallhang der Nied NW Niedaltdorf (6605/315), ScT u. StA 95; Krekelsberg bei Rémelfang (Lo) (6705/121), ScT 88; S-Hang E Moulin de Felschling S Berviller (Lo) (6705/224), SkR 85; Waldsäume am Seitert S Rémeringlès-Hargarten (Lo) (6705/233), ScT & SkR 86; W-exponierter Stufenhang zum Berviller Bachtal N Merten (Lo) (6705/235), ScT & SkR 86; Verbrachte Halbtrockenrasen in der Flur "Neuglen" E Velving (Lo) (6705/314), ScC & ScT 99; Wiese SW Bambusch NE Téterchen (Lo) (6705/314), DiK 93; Halbtrockenrasen am "Bovenberg" NW Ottonville (Lo) (6705/321), ScC & ScT 99; Kalksteinbruch Berus (6706/121), ScT u. P. Maas 85; "Verkehrinsel" in der AS St. Ingbert-West N Sengscheid (6708/232), ScT 98; St. Arnualer Wiesen in Saarbrücken (6708/322 u. 332), HoW 98; Straßenrand an der Flughafenstraße W Ensheim (6708/431), StP 97; Griesfeld W Etzling (Lo) (6807/222), ScT 91; Bebuschter Halbtrockenrasen am Mühlenbach E Bebelshausen (6809/121), StP 99; Halbtrockenrasen am Bubenberg NE Guiderkirch (Lo) (6809/422), StP 94; Halbtrockenrasen am Westhang des Niedersberges NE Guiderkirch (Lo) (6809/432), ScC & ScT 94; Westhang am Ortseingang bei Guiderkirch (Moritzbrunnen) (Lo) (6809/432), ScC & ScT 94.

***Orchis morio* - Kleines Knabenkraut**

A: K 920, S 194 / RL SL 3, B2

Mehrfach in den Wiesen S Ellenberg (Ko) (6308/235), ScC & ScT 97; Wiesen "Im Grämel" W Meckenbach (Ko) (6308/431), ScC 97; Wiesen in der Nahe-Schleife N Enzweiler (Ko) (6309/214), ScC & ScT 97; Wiesenhang N der Straße Mettweiler-Breitsesterhof E Mettweiler (Ko) (6409/225), ScC & ScT 97; Magerwiese auf einer hochgelegenen Saarterrasse SE des Dorf-Baches S Mechern (6505/433), ScT & G. Winter 95; Westl. Schmelz (6507/311!), StA 99; Magere Wiesen auf Mittlerem Buntsandstein in der Flur "Hoff" S Cité des Genêts zw. Diesen u. Ham (Lo) (6806/111), CaS, ScC & ScT 95; Wiesen S des Aérodrome SW des Waldes "Forst" NE Neunkirch-lès-Sarreguemines (seit einigen Jahren zum großen Teil durch Pferdebeweidung stark gefährdet) (Lo) (6808/422), ScC & ScT 94; Halbtrockenrasen E Hannock SW Rubenheim (6809/123), W. Hild & HoW 99; Altbekannte Stelle am W-Hang des Buchenbergs SE Niedergailbach (6809/324), DiK 97; Verbreitet am Buchenberg N Obergailbach (Lo) (6809/324), ScC & ScT 89; Kalk-Quellmoor am Ham-Bach S Ormersviller (Lo) (6809/425), ScC & ScT 93; Magere Wiesen am Waldrand in der Flur "Blauspatsch" W Bousseviller (Lo) (6810/422), ScC & ScT 95.

***Orchis purpurea* - Purpur-Knabenkraut**

A: K 923, S 194 / RL SL 3, B 3

W-Hang im Tal des Hollenbach NE Freching (Lo) (6504/333φ), DiK 93; Wärmeliebende Gebüsche am Südhang der Niederschleife NW Niedaltdorf (6605/315), ScT 93, ScT & StA 95; Prallhang der Nied N Filstroff (Lo) (6605/323), ScC & ScT 92; Buschwerk am W-Hang des Hirnberges NE Ihn (6605/412), DiK 98; Wald "In den Ulmen" NW Gisingen (6605/414φ), DiK 98; Krekelsberg bei Rémelfang (Lo) (6705/121), ScT 88; "Hoemerich" E Holling (Lo) (6705/131), ScC & ScT 99; S-Hang E Moulin de Felschling S Berviller (Lo) (6705/224), SkR 85; W-exponierter Stufenhang zum Berviller Bachtal N Merten (Lo) (6705/235), ScT & SkR 86; S Waldrand am Bambusch NE Téterchen (Lo) (6705/315), DiK 93; Halbtrockenrasen im NSG Badstube SE Mimbach (6709/423), StP 98; Winterberg N Farébersviller (Lo) (6807/322), ScC & ScT 90; Halbtrockenrasen am Lochfeld SW Wittersheim (6808/225), StP 99; Aufgelassener Weinberg am Sommerberg NW Bliesbolchen (6808/232), StP 92; Halbtrockenrasen oberhalb des Elektrizitätswerks W Herbitzheim (6809/123), StP 95; Gebüschsäume am Kloppberg SE Reinheim (6809/321), StP 98; Gebüsche am Ham-Bach S Ormersviller (Lo) (6809/425), ScC & ScT 93.

***Orchis simia* - Affen-Knabenkraut**

A: K -, S 194 / RL SL 2, B 2

Halbtrockenrasen am Kreuzberg S Bliesmengen (6808/413), StP 93-99.

***Orchis ustulata* - Brand-Knabenkraut**

A: K 921, S 194 / RL SL 2, B 2

Halbtrockenrasen im NSG Badstube SE Mimbach (6709/424), StP 98; Halbtrockenrasen im NSG Letschenfeld SE Gräfinthal (6808/233), StP 97; Halbtrockenrasen im NSG Guldenfeld

NW Habkirchen (6808/414), StP 98; Wiesen S des Aérodrôme SW des Waldes "Forst" NE Neunkirch-lès-Sarreguemines (seit einigen Jahren zum großen Teil durch Pferdebeweidung stark gefährdet) (Lo) (6808/422), W. Hild, ScC & ScT 94; Halbtrockenrasen am Gipsbruch NW Gersheim (6809/133), StP 97; Trockenhang im Rußtal E Altheim (6809/225), StP 97; Halbtrockenrasen am Buchenberg N Obergailbach (Lo) (6809/324!), StP 97; Magere Wiesen am Waldrand in der Flur "Blauspatsch" W Bousseviller (Lo) (6810/422), ScC & ScT 95.

***Orchis x hybrida* (= *O. purpurea* x *O. militaris*) - Hybride zw. Purpur-Knabenkraut u. Helm-Knabenkraut**

A: K 925, S 194

Hammelsberg NE Apach (Lo) (6504/134), DiK 97; W-Hang im Tal des Hollenbach NE Freching (Lo) (6504/333), DiK 93.

***X Orchiaceras spurium* (*Aceras anthropophorum* x *Orchis militaris*) - Hybride zw. Ohnsporn und Helm-Knabenkraut**

A: K 927, S 195 / RL SL *

W-Hang des Hollenbach-Tales NE Freching (Lo) (6504/333φ), DiK 89, ScT 85-90; Heiligenkopf N Eimersdorf (6605/215φ), ScT 85, DiK 98.

***Oreopteris limbosperma* (= *Thelypteris limbosperma*) - Gewöhnlicher Bergfarn**

A: K 12, S 24 / RL SL 3

Östl. Seitental des Mühlenbachtals E Spiesermühle S Spiesen (6608/435), HeU 97; Tiefental S Wasserwerk N Niederwürzbach (6709/133), HeU 96; Schwarzweihertal N Blieskastel-Lautzkirchen (6709/135), HeU 96; Obertal W Niederwürzbach (6709/311), HeU 94.

***Ornithogalum pyrenaicum* - Pyrenäen-Milchstern**

A: K -, S 160 / RL SL 4, B 3

Gegenüber der Kirche von Valmunster (Lo) (6705/311), ScT & SkR 85; Mehrfach in mesophilen Gebüsch S Bois de Velving und in der Flur "Neuglen" E Velving (Lo) (6705/314), ScC & ScT 99.

***Orobanche lutea* - Gelbe Sommerwurz**

A: K 584, S 129 / RL SL 3, B 3

Weihertalkopf N-Hang S Dellfeld S B10 (Pf) (6710/425), Zehfuß 94.

***Orobanche purpurea* - Violette Sommerwurz**

A: K -, S 130 / RL SL 2, B 3

SSW- exp. Weinbergsbrache an der W-Spitze des Beulenberges E Helfant, > 200 Pflanzen (Tr) (6404/211), CaS 95.

***Orobanche teucrii* - Gamander-Sommerwurz**

A: K 589, S 131 / RL SL *

Badstube S Mimbach, Halbtrockenrasen am W-Rande des Kerbtälchens (6709/423), HeU 98.

***Papaver dubium* ssp. *confine* (= *P. confine*) - Verkannter Saat-Mohn**

A: K -, S - / RL SL •

Ruderalstelle im Ort Oberzerf (Tr) (6406/111), CaS 98.

***Parnassia palustris* - Sumpf-Herzblatt**

A: K-, S - / RL SL -, B 3

Bestätigung einer alten Fundstelle nahe der saarländisch-lothringischen Grenze. Die Art wird von Abbé J.J. Kieffer für Ormersviller angegeben. Er kannte die Art seit 1879 (KIEFFER 1884, 1887).

Kalk-Quellmoor auf artesischen Kalktuffquellen am Ham-Bach S Ormersviller (Lo) (6809/425), ScC & ScT 93, ScC & ScT 95, MaM 96.

***Pedicularis sylvatica* - Wald-Läusekraut**

A: K 584, S 129 / RL SL 3, B 3

Nasse Stelle auf dem Weg entlang der Großen Prims ca. 300 m NE Pkt. 582,4 E Thiergarten (Tr) (6308/111), CaS 95; Vernachlässigter Forstweg zwischen der Mittelschneise und der Großen Prims zwischen Abt. 124 und 132 an zwei Stellen 375 m WNW und 300 m NW Pkt. 627,5 E Thiergarten (Tr) (6308/112), CaS 95; Juncion squarrosi mit vereinzelt Fichtenaufwuchs bei Abt. 134 NE des Hengstbaches ca. 150 m NE Regierungsbezirks-Grenze E Muhl (Tr) (6308/124), CaS 95; Dombach N Züsch (Tr) (6308/131), StA 99; Quelliges Calthion im Tälchen am westlichen Ortsrand von Züsch, ca. 200 m N Wbh. und Pkt. 555,2 (Tr) (6308/131), CaS 95; Wiese am Arthenberg NW Abentheuer (Ko) (6308/231), ScC 95 u. 96; Wiesen "Im Grämel" W Meckenbach (Ko) (6308/431), ScC 97; Wiesen NE Sportplatz Birkenfeld (Ko) (6309/131), ScC, ScT & HeU 97.

***Peplis portula* - Sumpfquendel**

A: K 403, S 94 / RL SL 3

Kiesgrubenteiche E Buprich (6507/322), WoP 99; Verlandungsbereich eines Teiches am Lochwiesbach W Berschweiler (6508/311), ScT 93; Rand der Alsbachau zw. Dirmingen u.d. Franckenbachmündung (6508/322), ScT 93; Offenerdige Pionierstelle in einer Weide im Illtal talab

der Mündung des Ahlenbaches in Hirzweiler (6508/431), ScT 93; Acker u. überschwemmte Ackersenke auf einer Niedterrasse S Kemmersbach S Hemmersdorf (6605/412), ScT 99; Fuß des Absinkweihers in der Hahnwies S Merchweiler (6608/133), StA 93; Staunasse Halde am Kraftwerk Ensdorf (6706/212), WoP 95; Nasser Maisstoppelacker NE Glockenhof (Lo) (6706/311), CaS 99.

***Persicaria dubia* (= *Polygonum mite*) - Milder Knöterich**

A: K 58, S 36 / RL SL *

Acker u. überschwemmte Ackersenke auf einer Niedterrasse S Kemmersbach S Hemmersdorf (6605/412), ScT 99; Haut Bois u. Étang de Roderisse N Dourdhal (Lo) (6806/331), ScC & ScT 91.

***Petrorhagia prolifera* - Sprossende Felsennelke**

A: K 124, S 47 / RL SL *

Schwerpunktorkommen auf Grus und an Felsköpfen in den Vulkanitgebieten sowie auf Industriebrachen. Dort vergleichsweise selten. Vorkommen außerhalb der o. g. Räume: Lückige Erdstellen an Verteidigungsköpfen der Maginotlinie am "Bovenberg" NW Ottonville (Lo) (6705/321), ScC & ScT 99.

***Peucedanum carvifolia* - Kümmelblättriger Haarstrang**

A: K 440, S 102 / RL SL 3, B 3

In den Wiesen entlang der Nied im Muschelkalkgebiet etwa ab Filstroff verbreitet und häufig. Außerhalb der Auen der größeren Flusstäler eher selten. Einige Meldungen: Magere Talwiese in linkem Seitental der Blies S Winkenbacherhof NNW St. Wendel (6508/215), CaS 98; Tal des Ruisseau de Weistroff SW Flastroff (Lo) (6605/132), ScT 99; Wiesen zw. Daustauden und Grossenwald W Heining-lès-Bouzonville (Lo) (6605/335), ScC & ScT 99; Talaue N des Ruisseau d'Ottonville SW Ottonville (Lo) (6705/321), ScC & ScT 99; Ehem. Streuobstgebiet S der B 269 W Felsberg (6706/111), ScT 99; Wiesen in der Aue des Auerbaches WSW Niederhausen (Pf) (6710/213), SaE 99; Battenberg S Zinzing (Lo) (6808/132), ScC & ScT u. WoP 92.

***Peucedanum palustre* - Sumpf-Haarstrang**

A: K 441, S 102 / RL SL -

Niedermoor im Tal SW Reinsfeld-Ischert (Tr) (6307/123), CaS 98; Niedermoor E Eisenbahn beim Zusammenfluss von Senkelsbach und Staffelnbornbach bei der AS Reinsfeld (Tr) (6307/221), CaS 95; Ohne größere Unterbrechungen am Königsbach von den Weihern NW Gunnesbruch ca. 180 m NW Pkt. 563,6 abwärts bis unmittelbar jenseits der Quadrantengrenze zu 6308/3 N Neuhütten, weiter abwärts bisher noch nicht untersucht, bisher 14 Einzelvorkommen notiert (Tr) (6308/132-133 u. 312), CaS 94-95; Teich im Winkel von Großbach und B 268 nahe E-Rand MTB (Tr) (6405/225), SaE 95; Spanischloch an der Straße von Creutzwald nach Merten (Lo) (6706/311), SkR 85; Étang de Merbette E Longeville-lès-St. Avold (Lo) (6806/321), ScT 91; Étang de Roderisse N Dourdhal (Lo) (6806/331), ScC & ScT 91.

***Phegopteris connectilis* (= *Thelypteris phegopteris*) - Gewöhnlicher Buchenfarn**

A: K 13, S 24 / RL SL 3

Lambertsberg SW Kirkel (6709/133), HeU 96; Nordhang des Landscheider Waldes W Niederwüzbach (6709/311), HeU 99.

***Phyteuma spicatum* ssp. *spicatum* - Ährige Teufelskralle**

A: K 619, S 137 / RL SL -

Grand Bois de Waldweistroff (Lo) (6605/131), ScC & ScT 99; Verbreitet im Forêt Domaniale de Bouzonville N Filstroff (Lo) (6605/312, 321 u. 322), ScC & ScT 99, ScT & SaP 99; Le Stockholz N Bouzonville (Lo) (6605/331), ScC 93; "Rammelfanger Wald" S Kalksteinbruch Hemmersdorf (6605/413), ScT 99; Bois de Kobenloch E Holling (Lo) (6705/131), ScC & ScT 99; Bois de Velving E Velving (Lo) (6705/314), ScC & ScT 99; Bois d'Ottonville SW Ottonville (Lo) (6705/331), ScC & ScT 93.

***Plantago major* ssp. *intermedia* - Kleiner Breit-Wegerich**

A: K 591, S 132 / RL SL *

Krumenfeuchter Acker N Hart-Wald zw. Grindorff u. Zeurange (Lo) (6605/112), ScC & ScT 99; Acker S des Waldes "Ewig" S Grindorff (Lo) (6605/122), ScC & ScT 99; Krumenfeuchter Acker oberhalb des Heltener Bachtals zw. Flastroff u. Zeurange (Lo) (6605/123), ScT 99; Krumenfeuchter Acker im Tal des Ruisseau de Weistroff SW Flastroff (Lo) (6605/132), ScT 99; Waldweg im Forêt Domaniale de Bouzonville S Ferme de Dampont N Filstroff (Lo) (6605/312), ScC & ScT 99; Acker NE St. Oswald NW Filstroff (Lo) (6605/321), ScT u. SaP 99; Lehacker am Wasserbehälter E des Stockholzes N Bouzonville (Lo) (6605/332), ScT 99; Acker u. überschwemmte Ackersenke auf einer Niederterrasse S Kemmersbach S Hemmersdorf (6605/412), ScT 99.

***Platanthera bifolia* - Weiße Waldhyazinthe**

A: K 913, S 192 / RL SL 3, B 3

Hammelsberg NE Apach (Lo) (6504/134φ), DiK 98; W-Hang des Hollenbach-Tales NE Freching (Lo) (6504/333), DiK 89; Mehrfach in verbrachten Halbtrockenrasen zw. St. Oswald und dem Grand Bois de Bibiche N Beckerholz (Lo) (6605/311 u. 321), ScT & SaP 99; Forêt Communale de Filstroff, Säume am Waldrand S Roderweiher N Filstroff (Lo) (6605/313), ScC & ScT 92; Prallhang der Nied N Filstroff (Lo) (6605/323φ), ScC & ScT 92; Wald "In den Ulmen" NW Gisingen (6605/414φ), DiK 98; "Hoemerich" und "Wingertberg" E Holling (Lo) (6705/131φ), ScC & ScT 99; NW-Hang N der Straße D55 NW Velving (Lo) (6705/312), DiK 93; Halbtrockenrasen und Gebüsch in der Flur "Neuglen" E Velving (Lo) (6705/314), ScC & ScT 99; Wiese SW Bambusch NE Téterchen (Lo) (6705/314f), DiK 86; St. Arnualer Wiesen in Saarbrücken (6708/322), HoW 98; Battenberg S Zinzing (Lo) (6808/132), ScC & ScT u. WoP 92; Mähwiese am Osthang d. Lochfeldes SW Wittersheim (6808/225), StP 99; Halbtrockenrasen oberhalb Industriegebiet W Gungling (Lo) (6808/313), StP 98.

***Platanthera chlorantha* - Berg-Waldhyazinthe**

A: K 914, S 192 / RL SL 3, B 3

Wiesen am Einschiederhof S Börfink (Ko) (6308/125), ScC 97; Wiese am Arthenberg NW Abentheuer (Ko) (6308/231), ScC 95 u. 96; Wiesen W Ellenberg (Ko) (6308/234), ScC 97; Wiesen "Im Naumborn" SW Achtelsbach (Ko) (6308/325), ScC 97; Waldwiese im "Hinzhausen" NW Brücken (Ko) (6308/411), ScC 97; Wiesen "Im Grämel" W Meckenbach (Ko) (6308/431), ScC 97; Wiesen NE Sportplatz Birkenfeld (Ko) (6309/131), ScC, ScT & HeU 97; W-Hang des Hollenbach-Tales NE Freching (Lo) (6504/333φ), DiK 89; Wald "Butterchen" SW Sillenberg zwischen Biringen u. Waldwisse (6505/324), ScT 99; Mehrfach in verbuschten Halbtrockenrasen zw. St. Oswald und dem Grand Bois de Bibiche NW Filstroff (Lo) (6605/311 u. 321), ScT & SaP 99; Forêt Communale de Filstroff, Säume am Waldrand S Roderweiher N Filstroff (Lo) (6605/313), ScC & ScT 92; Krekelsberg bei Rémelfang (Lo) (6705/121), ScT 88; Halbtrockenrasen am Wingertsberg W Wittersheim (6808/215), StP 98; Magerwiesen westl. der Rebenklamm NW Reinheim (6809/131), StP 98; Magerwiese am "Forêt de Bellevue" NE Obergailbach (Lo) (6809/325), StP 94.

***Platanthera x hybrida* (= *P. bifolia* x *P. chlorantha*) - Hybride zw. Weißer Waldhyazinthe u. Berg-Waldhyazinthe)**

A: K -, S 192

"Heiligenkopf" N Eimersdorf (6605/215), DiK 98.

***Poa bulbosa* - Knolliges Rispengras**

A: K 914, S 192 / RL SL *

Mehrfach und häufig in Magerweiden in der Flur "le Wingert" W Château-Rouge (Lo) (6705/211 u. 221), ScC & ScT 99; In einem Zierrasen auf dem Eschberg N St. Johann (6708/313), WeJ 98.

***Poa chaixii* - Wald-Rispengras**

A: K 779, S 169 / RL SL *

Wiesen am Einschiederhof S Börfink (Ko) (6308/125), ScC 97; Wald auf pleistozänem Sand SW Schoeneck (Lo) (6707/335), WeJ 99; Nordrand Prachtwald W Kinkel (6709/123), HeU 94.

***Polemonium caeruleum* - Blaue Himmelsleiter**

A: K -, S 112 / RL SL u, B 3

Segelflugplatz SSE Kell, sich einbürgernd (Tr) (6307/321), CaS 98; Ohmbach-Aue Reismühle S Herschweiler-Pettersheim (Pf) (6510/131), WoP 99.

***Polygala amarella* - Sumpf-Kreuzblume**

A: K 362, S 86 / RL SL 2

Magerrasen am Westhang des Niedersberges NE Guiderkirch (Lo) (6809/432), ScC & ScT 94;
Westhang am Ortseingang bei Guiderkirch (Moritzbrunnen) (Lo) (6809/432), ScC & ScT 94.

***Polygala vulgaris* [s.l.] - Gewöhnliche Kreuzblume**

A: K 359, S 86 / RL SL *

Während die Art in den Silikatgebieten an Magerstandorten verbreitet ist, meist jedoch nur in wenigen Exemplaren auftritt, sind Vorkommen in den Kalkgebieten selten:

Wiesen oberhalb des Prallhangs der Nied N Filstroff (Lo) (6605/323), ScC & ScT 92; Flur "Neuglen" E Velving (Lo) (6705/314), ScC & ScT 99; N- und W-Hang "Neuves Terres" E Betting-lès-St. Avold (Lo) (6806/425), ScC & ScT 90.

***Polystichum aculeatum* - Gelappter Schildfarn**

A: K 22, S 26 / RL SL 3

N-exponierter Hang zur Saar N St. Gangolf (6505/211), ScC & ScT 94; In Kalktuffen an der Bahnunterführung am "Vorderstewald" S Guerstling (Lo) (6605/325), ScT 99; Alter Steinbruch E Ferme St. Jules S Falck (Lo) (6705/433), WeJ 98; Kerbtäler am Wirbelfels N Merten (6706/131), ScC & ScT 91; Mauer in der Alten Hütte Völklingen (6707/311), WeJ 99; Wald am Nordhang des Winterberges in St. Arnual (6708/321), WeJ 99; Nordexponierte Buntsandsteinwand S Walshausen, SW Zweibrücken (Pf) (6710/434), HeU 98; Kerbtal am "Wollscheid" NW Spicheren (Lo) (6807/212), ScT 91; Heckenstück im Steywald N Grosbliederstroff (Lo) (6808/122), KSb 99; Schacht (Kalkstein) im Ausgrabungsgelände N Bliesbruck (Lo) (6809/321), WeJ 97; Klamm N Sualbtal, E "Conrädchen" S Hornbach (Lo) (6810/123), HeU 99; Kerbtal SW Hochseiter-Wald WNW Großsteinhausen (Pf) (6810/212), WoP 94.

***Potamogeton berchtoldii* - Berchtolds Laichkraut**

A: K 724, S 158 / RL SL *

Kiesgrubenteiche SW Nalbach (6606/222), WoP 99; Teich an der ehemaligen Kläranlage SE Hassel (6709/131), HeU 98.

***Potamogeton crispus* - Krauses Laichkraut**

A: K 726, S 158 / RL SL *

Nied am Wehr Siersdorf bei Siersburg (6605/225), CaS 97; Nied unterhalb Niedbrücke Hemmersdorf (6605/233), CaS 97; Remelbach W u. NW Niedaltdorf (6605/315), ScT & StA 95, CaS 97; Altarm an der Niedmündung E Rehlingen (6606/111), CaS 97.

***Potamogeton perfoliatus* - Durchwachsenes Laichkraut**

A: K 723, S 157 / RL SL *

In der Nied ab der Einmündung des Remelbaches zerstreut (6605/224, 225, 231-235 u. 411), CaS 97; Remelbach SW Niedaltdorf (6605/315), StA 95, CaS 97; Altarm an der Niedmündung W Rehlingen (66067111), CaS 97

***Potamogeton obtusifolius* - Stumpflättriges Laichkraut**

A: K -, S 158 / RL SL *, B 3

Geisweiler Weiher W Michelbach (6506/234), WoP 94.

***Potamogeton polygonifolius* - Knöterich-Laichkraut**

A: K 721, S 157 / RL SL *, B 3

Mutterbach W Brücke NE Kirkel (6609/335), WoP 96; Unteres Kleberbachtal E Glashütter Weiher NE St. Ingbert-Rohrbach (6709/111), HeU 98-99.

***Potamogeton pusillus* (= *P. panormitanus*) - Kleines Laichkraut**

A: K -, S 158 / RL SL 4

Graben im Tal der Bibiche N Bouzonville (Lo) (6605/332), ScT 99; Kiesgrubenteiche S Bilsdorf (6606/215), WoP 99; Teich im Hirschbachtal E Riegelsberg (6707/215), WoP 94.

***Potamogeton trichoides* - Haarförmiges Laichkraut**

A: K 725, S 158 / RL SL 3, B 3!

“Werthgraben” W Dillingen (6606/133), ScC 93; Nordteil der Rohrblies SE Blieskastel (6709/411), WoP 91.

***Potentilla erecta* - Aufrechtes Fingerkraut**

A: K 258, S 70 / RL SL *

P. erecta tritt in den Muschelkalkgebieten stark zurück. Die Art ist dort selten und meist auf Magerwiesen oder magere Waldwege und deren Säume über Decklehmen beschränkt:

Wiesen am Ruisseau de Weistroff SE Waldweistroff (Lo) (6605/131), ScC & ScT 99; Mehrfach auf hageren Waldwegen im Forêt Domaniale de Bouzonville NW Filstroff (Lo) (6605/311, 312, 321 u. 332), ScC & ScT 99, ScT & SaP 99; Forêt Communale de Filstroff (Lo) (6605/313), ScC & ScT 92; Wiesen im Quellgebiet des Weinbaches (“Gisinger Wiesen”) E Gisingen (6605/425), ScC & ScT 99; Wiesen NW der Kläranlage W Gisingen (6605/425), ScC & ScT 99; Wiesen am Forbacher Berg NW Spicheren (Lo) (6807/212), ScT 91; Feuchtweide am Ham-Bach S Chapel-le St. Joseph S Ormersviller (Lo) (6809/424), ScC & ScT 93.

***Potentilla intermedia* - Mittleres Fingerkraut**

A: K 255, S 69 / RL SL 3

Bhf Reinsfeld (Tr) (6307/123), CaS 98; Alte Schiefergrube an der B407 auf dem Eselsberg N Oberzerf (Tr) (6406/111), CaS 98; Geschotterte Ruderalfläche am Tannenhof SSE Rohrbach, Bestätigung eines älteren Vorkommens (6409/221!), CaS 99.

***Potentilla norvegica* - Norwegisches Fingerkraut**

A: K 254, S 69 / RL SL *

Waldwege im Saarkohlenwald NW Fischbach (6707/215), KSb 99; Waldwege im Saarkohlenwald E Rußhütte (6707/234 u. 235), WeJ 98; Eingeebnete Grubenschlacken SW Schoeneck (6707/335), KSb 99; Ruderalfläche am Bruchwald N Neuweiler (6708/115), WeJ 99; Feuchte Senke bei der Heidenkopfer Delle am Rotenbühl Saarbrücken (6708/312), WeJ 98.

***Potentilla palustris* - Sumpflutauge**

A: K 250, S 69 / RL SL 3

Wilmeswies SW Ruschberg (Ko) (6309/432), ScC 96; Wiesen am Eschelbach NE Zinkweilerohof (Ko) (6309/434), ScC 96; Wiesen NE Fohren-Linden (Ko) (6409/214), ScC 97; Seifenwies NW Hüttigweiler (6608/114), ScT & StA 93.

***Potentilla supina* - Niedriges Fingerkraut**

A: K 253 S 69 / RL SL 3

Staanasse Halde am Kraftwerk Ensdorf (6706/212), WoP 95; Ruderalfläche am Messengelände in Alt-Saarbrücken (6707/413), WeJ 98.

***Prenanthes purpurea* - Hasenlattich**

A: K 699, S 152 / RL SL *

Waldwegrand im Saarkohlenwald SW Riegelsberg (6707/213), KSb 98; Waldweg an den Weihern E Dudweiler (6708/124), ScC & ScT 90, HeU 99; Buchenwald am Osthang des Rothenkopfes S St. Ingbert (6708/224), HeU 97-99.

***Primula elatior* - Hohe Schlüsselblume**

A: K 454, S 105 / RL SL *

In den Muschelkalkgebieten und auf Keuper, vor allem im Bliesgau und im Niedgebiet, ist die Art verbreitet bis häufig. Selten dagegen im mittleren und nördlichen Saarland: Vernässte Stellen im Eichenwald am W-Hang des "Dimpel" NW Oberlinxweiler (6508/233), CaS 99; Vernässte Stellen im Eichenwald im Winkel der zwei Quellbäche des Hirzbaches NW "Höchst", NW Oberlinxweiler (6508/234), CaS 98.

***Prunus padus* - Echte Traubenkirsche**

A: K 286, S 74 / RL SL *

Die Art tritt im Kartiergebiet sehr zerstreut auf. Verbreitungsschwerpunkte liegen an der mittleren Prims, im Hochwaldvorland und an der oberen Nahe. Neue indigen anmutende Vorkommen:

Bachbegleitende Gehölze an der Bickenalb SW Mittelbach (Pf) (6710/331), SaE 99; Holzwald N Walshausen (Pf) (6710/434), SaE 99.

***Pseudofumaria lutea* (= *Corydalis lutea*) - Gelber Lerchensporn**

A: K 164, S 55 / RL SL *

Heute eingebürgert in warmen Lagen in Mauerspalten :

Alte Mauer in Wittersheim (6808/215), ScT 95.

***Pulicaria dysenterica* - Großes Flohkraut**

A: K 640, S 141 / RL SL *

Quellstellen in Wiesen N des Ruisseau de Weistroff SE Waldweistroff (Lo) (6605/131), ScC & ScT 99; Gräben an der Straße zw. Bouzonville u. der Ferme du Ruisseau de Bibiche N Bouzonville (Lo) (6605/332), ScT 99; Wiesen im Quellgebiet des Weinbaches ("Gisinger Wiesen") E Gisingen (6605/425), ScC & ScT 99; Quellhorizont am W-exponierten Stufenhang zum Berviller Bachtal N Merten (Lo) (6705/235), ScT & SkR 86; Flutmulden am südöstlichen Quellarm des Ruisseau d'Ottonville NE Ottonville (Lo) (6705/323), ScT & P. Haffner 86; Waldwegrand am Schwarzenberg N Rotenbühl Saarbrücken (6708/313), WeJ 98; Oberes Höllscheider Tal W Niederwürzbach (6709/311), HeU 98-99; Graben im unteren Rechental SE Blieskastel, S Wattweiler (6709/425), HeU 98; Kalk-Quellwiese in der Flur "Vorderste Berge" N Alsting (6807/215), WeJ 98; Wiesen in der Flur "Thal" NE Ebring (Lo) (6807/421), M. Greff, ScC, ScT & WoP 95; Feuchtwiese im Simbachtal N Alsting (6808/111), KSb 98; Feuchtwiese am Kappelberg NW Bliesransbach (6808/125), KSb 99; Gräben an der Straße am Ortseingang bei Guiderkirch (Moritzbrunnen) (Lo) (6809/432), ScC & ScT 94.

***Pulmonaria obscura* - Dunkles Lungenkraut**

A: K 490, S 114 / RL SL *

Wald zw. Bahn und Nied S Guerstling (Lo) (6605/325), ScT 99; Wald "Bruch" NE Heckling (Lo) (6605/334), ScC & ScT 99; Auwald am Ohmbach an der Brücke der Zufahrt zum Birkenbacherhof S Battweiler (Pf) (6710/223), SaE 99; NE-Hang vom Muehlenfeld zur Moulin Neuf NE Petit Eberswiller (Lo) (6806/335), KG Moose 97.

***Pulsatilla vulgaris* ssp. *vulgaris* - Gewöhnliche Küchenschelle**

A: K 138, S 50 / RL SL 3

Waldsaum des "Kleinbirk" SE Schweyen (Lo) (6810/135), HeU 98.

***Pyrola minor* - Kleines Wintergrün**

A: K 446, S 104 / RL SL *

Absinkweiher Luisenthal (6707/134), StA 99.

***Pyrola rotundifolia* - Rundblättriges Wintergrün**

A: K 447, S 104 / RL SL 2, B 3

Munitionsdepot im Schwarzbruch bei Eft-Hellendorf (6504/214), StA 99; Buschwerk im alten Kalksteinbruch N Hemmersdorf (6605/413!), DiK 98; Ehem. Sandgrube Dudweiler-Nord (6708/122), WoP 97; Kiesige Böschung unter Birken am Rande des Kléber-Geländes E St. Ingbert (6708/224), HeU 94-99.

***Ranunculus arvensis* - Acker-Hahnenfuß**

A: K 145, S 51 / RL SL *, B 3

Acker auf dem "Wingertberg" E Holling (Lo) (6705/131), ScC & ScT 99; Ackerrand NE Velving (Lo) (6705/313), ScC & ScT 99; Nasser Maisstoppelacker NE Glockenhof (Lo) (6706/311), CaS 99; Acker am Scharfenhübel W Alsting (Lo) (6807/214), WeJ 99; Acker am "Grosswitz" N Alsting (Lo) (6807/215), KSb 98.

***Ranunculus fluitans* - Flutender Hahnenfuß**

A: K -, S 53 / RL SL 1

Nied bei Rémelfang (Lo) (6705/121), ScT 88; Schwarzbach SW Einöd (6709/235), WoP 98.

***Ranunculus nemorosus* - Gewöhnlicher Hain-Hahnenfuß**

A: K 141, S 50 / RL SL *

Magerweiden S des alten Bahnhofes E Tholey (6508/113), ScT & StA 93; Magerwiesen u. -weiden an den SW-exponierten Talhängen des Bruchelsbachtals NW Alsweiler (6508/115), ScT & StA 93; An zahlreichen Stellen in Magerwiesen an den NE-exponierten Talhängen des Bruchelsbachtals NW Alsweiler (6508/125), ScT & StA 93; Magergrünland im Alsbachtal N der Mündung des Bruchelsbaches N Alsweiler (6508/125), ScT & StA 93; Magergrünland am Bärenbest S Marpingen (6508/314), StA 93; Mehrfach in Magergrünland am Frankenbach N Dirmingen (6508/322), ScT & StA 93; Magergrünland am Talhang zur III N Urexweiler (6508/411), StA 93; Magerwiesen S des Faulenberges SW Mainzweiler (6508/432), ScT 93; Magerer Grünlandsaum im Bärenbachtal S Georgshof zw. Uchtelfangen und Wustweiler (6608/112), ScT 93; Kleiner Magerwiesenrest im Quellgebiet des Harzbaches W Uchtelfangen (6608/121), ScT & StA 93; Steilberg u. Buchenwald SW der Ferme de Hellering N Macheren (Lo) (6806/432), ScC & ScT 90; Wegrand im Spicherer Tal N Alsting (Lo) (6807/215), WeJ 99; Wegrand im Steywald N Grosbliederstroff (Lo) (6808/122), KSb 99.

***Ranunculus serpens* - Wurzelnder Hain-Hahnenfuß**

A: K 142, S 51 / RL SL *

Waldweg im Obertal W Niederwürzbach (6709/311), HeU 99.

***Ranunculus platanifolius* - Platanenblättriger Hahnenfuß**

A: K 149, S 51 / RL SL 3

W-Hang des "Hoch-Berges" N Reinsfeld (Tr) (6307/113), CaS 98.

***Ranunculus sardous* - Sardischer Hahnenfuß**

A: K 144, S 51 / RL SL 3, B 3

Lehmacker am Wasserbehälter E des Stockholzes N Bouzonville (Lo) (6605/332), ScT 99.

***Ranunculus sceleratus* - Gift-Hahnenfuß**

A: K 147, S 51 / RL SL *

Gräben E des Spitzwaldes SE Ippling (Lo) (6808/331), ScC & ScT 92.

***Ranunculus trichophyllus* ssp. *trichophyllus* - Haarblättriger Wasser-Hahnenfuß**

A: K -, S 52 / RL SL *

Graben am Rande der Nied NW Rémelfang (Lo) (6705/121), ScC & ScT 99; Gräben E des Spitzwaldes SE Ippling (Lo) (6808/331), ScC, ScT & WoP 92.

***Rhamnus cathartica* (= *R. catharticus*) - Purgier-Kreuzdorn**

A: K 371, S 89 / RL SL *

In den Muschelkalkgebieten des Blies- und Moselgaus sowie im Keuperhügelland des Niederbietes zerstreut. Von der Nahe her eindringend, weitester Vorposten des Nahe-Teilareals: Gebüschsukzession auf einer kleinen Vulkanitkuppe innerhalb des Offenlandes E Bergwald NE Rohrbach (Ko) (6409/211), CaS 98.

***Rorippa amphibia* - Wasser-Sumpfkresse**

A: K 179, S 57 / RL SL *

Flutmulden in der Flur "Surwiese" u. Niedaue in der Flur "Niedra" W Bouzonville (Lo) (6705/111), ScC & ScT 99; Flutmulden in den Niedwiesen in der Flur "Klopp" NW Vaudrechung (Lo) (6705/112), ScC & ScT 99; Flutmulden in den Niedwiesen NW Rémelfang (Lo) (6705/121), ScC & ScT 99.

***Rosa canina* var. *andegavensis* (= *R. andegavensis*) - Anjou-Hunds-Rose**

A: K 232, S 67 / RL SL *

Côte de Thédning (W Klingelstauden) NW Thédning (Lo) (6807/313), M. Greff, ScC, ScT & WoP 95.

***Rosa inodora* - Duftarme Rose**

A: K -, S - / RL SL -

Wärmeliebende Gebüsche am "Hoemerich" E Holling (Lo) (6705/131), ScC & ScT 99.

***Rosa micrantha* - Kleinblütige Rose**

A: K 243, S 68 / RL SL *, B 3

Bovenberg NW Ottonville (Lo) (6705/321), ScC & ScT 99; Ehem. Streuobstgebiet S der B 269 W Felsberg (6706/111), ScT 99.

***Rosa pseudoscabriuscula* (= *R. scabriuscula*, = *R. tomentosa* ssp. *pseudoscabriuscula*) - Falsche Filzrose**

A: K 240, S 68 / RL SL *

Battenberg (Lo) (6808/132), ScT & StP 92.

***Rosa rubiginosa* - Wein-Rose**

A: K 241, S 68 / RL SL *

Wärmeliebende Gebüsche am "Hoemerich" E Holling (Lo) (6705/131), ScC & ScT 99; SE-Hang in der Flur "Faulheck" N Voelfing (Lo) (6705/212), ScC & ScT 99; Bovenberg NW Ottonville (Lo) (6705/321), ScC & ScT 99.

***Rumex aquaticus* - Wasser-Ampfer**

A: K -, S 38 / RL SL 3

Brache in der Erbach-Aue SW Homburg (6609/435), WoP 95.

***Rumex maritimus* - Ufer-Ampfer**

A: K -, S 38 / RL SL *

Saarufer am Messengelände Alt-Saarbrücken (6707/413), KSb 97; Am Drahtzug- u. Deutschmühlenweiher W Alt-Saarbrücken (6707/423), WeJ 97; Uferbereich im "Dritten Weiher" W St. Annual (6707/435), WeJ 97.

***Rumex palustris* - Sumpf-Ampfer**

A: K -, S 38 / RL SL 4

Étang de Merbette E Longeville-lès-St. Avold (Lo) (6806/321), ScT 91.

***Rumex x schmidtii* (= *R. aquaticus* x *R. obtusifolius* ssp. *obtusifolius*) - Hybride zw. Wasser-Ampfer u. Stumpfblättrigem Ampfer**

A: K -, S 39

Brache in der Erbach-Aue SW Homburg (6609/435), WoP 95.

***Sagina micropetala* - Aufrechtes Mastkraut**

A: K 106, S 44 / RL SL *

Ruderalstellen in Reinsfeld (Tr) (6307/123), CaS 98; Ruderalstelle in Züsch (Tr) (6308/131), CaS 95; Ruderalstelle in Zerf an der B268 (Tr) (6406/111), CaS 98; Pflasterfugen nahe der Schaffbrücke zwischen Merzig und Brotdorf (6506/131), ScT 99; St. Wendel-Alsfassen, an zahlreichen Stellen sich in den letzten Jahren etablierend (6508/225), CaS 99; Pflasterfugen in Saarbrücken-Neuscheidt (6708/323), ScT 99; Mehrfach zwischen den Steinen gepflasterter Straßen und Gehsteige (Pf) (6710/1, 3 & 4), SaE 99.

***Sagittaria sagittifolia* - Gewöhnliches Pfeilkraut**

A: K -, S 155 / RL SL 3

Verbreitet in der Nied:

Von der Remelbachmündung bis zum Ausgang der Niederschleife NW Niedaltdorf (6605/135, 231, 315 u. 411), ScT & StA 95, CaS 97; Vom Niedknie W Büren bis zur Niedmühle S Eimersdorf (6605/224, 225, 234 u. 235), CaS 97; In Hemmersdorf (6605/232 u. 233), CaS 97; Nied N Brücke Filstroff (Lo) (6605/232), WoP 94.

***Salix atrocinerea* (= *S. cinerea* ssp. *oleifolia*) - Rostrote Weide**

A: K -, S - / RL SL -

Grabenränder NE Hauptstuhl (Pf) (6510/435), WoP 97; Bachufer in Nassbrache W Altstadt (6609/422), WoP 99; Erbach-Aue SW Homburg (6609/435), WoP 95; aufgeschüttete Aue des Scheidter Baches, Scheidt (6708/134), WoP 97; Würzbachtal NE Oberwürzbach (6708/415), WoP 95; Brache N Neuhäuslerarm N Kirkel (6709/113), WoP 99; Brache N Prachtwald W Kirkel (6709/123), WoP 99; Ritterstal S Hassel (6709/131), WoP 95; Würzbachtal W Lautzkirchen (6709/135), WoP 98; Teichufer W Homburg-Beeden (6709/213), WoP 98; Teichufer NW Wörschweiler (6709/214), WoP 96; Straßenrand N Lautzkirchen (6709/231), WoP 96; Würzbachtal E Niederwürzbach (6709/314), WoP 98.

***Saxifraga tridactylites* - Dreifinger-Steinbrech**

A: K 219, S 64 / RL SL 3

Die Art ist im Bereich der Bahnanlagen auf Grus regelmäßig anzutreffen. An weniger hemeroben Standorten ist sie auch heute selten:
Kalksteinbruch Hemmersdorf (6605/413), ScT 99.

***Schoenoplectus lacustris* - Gewöhnliche Teichsimse**

A: K 858, S 181 / RL SL 3

An der Nied zerstreut und sonst sehr selten:

Geisweiler Weiher W Michelbach (6506/234), WoP 94; Mehrfach zw. Campingplätzen in Siersdorf und der Niedmühle (6605/225), CaS 97; Nied unterhalb der Niedbrücke in Hemmersdorf (6605/233), CaS 97; Nied zw. Niedknie u. Birkenbachmündung W Siersdorf (6605/234), CaS 97; Verbreitet in der Nied in der Niederschleife NW Niedaltdorf (6605/315 u. 231), ScT & StA 95, CaS 97; Nied um die Niedbrücke in Niedaltdorf (6605/411), CaS 97.

***Schoenoplectus mucronatus* - Stachelspitzige Teichbinse**

A: K -, S 181 / RL SL -, B 1

Sandiger Tümpel in aufgeschütteter Aue des Scheidter Baches in Scheidt (6708/134), I. Bruch 97.

***Schoenoplectus tabernaemontani* - Graue Teichsimse**

A: K -, S 181 / RL SL 2

Teich auf Grubenschlacken SE Maybach (6608/325), WeJ 97.

***Schoenus nigricans* - Schwarzes Kopfried**

A: K -, S - / RL SL -, B 2

Mit *Parnassia palustris* im Kalk-Quellmoor auf artesischen Kalktuffquellen am Ham-Bach S Ormersviller (Lo) (6809/425), ScC & ScT 93, ScC & ScT 95, MaM 96.

***Scilla bifolia* - Zweiblättriger Blaustern**

A: K 743, S 160 / RL SL *

S-Hang im Völklinger Stadtwald an der B 51 NW Völklingen (6706/225), DiK 98; Bewaldete Hänge auf Karbon N Luisenthal (6707/133), WeJ 99; Autochthon im alten Friedhof Alt-Saarbrücken (6707/424), WeJ 99; Südseite des Winterberges in St. Annual (6707/425), WeJ 99; Hang im Kasental in St. Annual (6708/321), WeJ 99; Bliestal W Allmends-Wald SE Blies-Ebersing (6808/425), HeU 93.

***Scleranthus perennis* - Ausdauernder Knäuel**

A: K 197, S 45 / RL SL *

Wiesen SE Hammerstein (Ko) (6309/224), ScC & ScT 96.

***Scrophularia auriculata* - Geöhrte Braunwurz**

A: K -, S 125 / RL SL *, B 3

Kalk-Quellsumpf in der Flur "In den Suden" auf der Verebnungsfläche des Mittleren Muschelkalkes am Stufenhang S Brotdorf (6506/132), ScT 91.

***Scutellaria minor* - Kleines Helmkraut**

A: K -, S 117 / RL SL 1, B 3

Niedermoor beim Zusammenfluss von Ochsenfloß, Erdbeerengraben und Traun im NSG Traunwiesen bei Börfink, reichlich (Ko) (6308/211), CaS 99.

***Selinum carvifolia* - Silge**

A: K 439, S 102 / RL SL *

Selinum carvifolia ist im Nordsaarland in den Naturräumen des Hunsrücks und seines Vorlandes sowie des Prims-Nahe-Berglandes häufig. Außerhalb dieser montan getönten Räume ist sie sehr zerstreut bis selten:

Wiesen S des Aérodrôme SW des Waldes "Forst" NE Neunkirch-lès-Sarrequemines (6808/422), ScC & ScT 94.

***Senecio aquaticus* [s.str.] - Gewöhnliches Wasser-Greiskraut**

A: K 658, S 145 / RL SL *

Wiesen im Quellgebiet des Weinbaches ("Gisinger Wiesen") E Gisingen (6605/425), ScC & ScT 99; Wiesen NW der Kläranlage W Gisingen (6605/425), ScC & ScT 99; Wiesen in der Flur "Surwiese" u. Niedwiesen in Flur "Niedra" W Bouzonville (Lo) (6705/111), ScC & ScT 99; Niedwiesen in der Flur "Klopp" NW Vaudreching (Lo) (6705/112), ScC & ScT 99; Niedwiesen NW Rémeffang (Lo) (6705/121), ScC & ScT 99; Wiesen am Ruisseau d'Ottonville SW Ottonville (Lo) (6705/321), ScC & ScT 99; Wiesen in der Flur "Thal" NE Ebring (Lo) (6807/421), M. Greff, ScC, ScT & WoP 95; Wiesen zw. Grossacker u. Kachelbrunnen SE Ebring (Lo) (6807/421), M. Greff, ScC, ScT & WoP 95.

***Senecio hercynicus* - Gewöhnliches Hain-Greiskraut**

A: K -, S 145 / RL SL 4

W-Hang des Hoch-Berges N Reinsfeld (Tr) (6307/113), CaS 98; N-exp. Feldheckenböschung am Weg von Reinsfeld nach W zu den Schießständen (Tr) (6307/123), CaS 98.

***Senecio inaequidens* - Schmalblättriges Greiskraut**

A: K -, S 145 / RL SL u

Staustufe Serrig (6405/221), StA 99; Absinkweiher bei Bildstock (6608/412), StA 99.

***Serratula tinctoria* ssp. *tinctoria* - Färber-Scharte**

A: K 680, S 148 / RL SL 2, B 3

Bois de Velving und in der Flur "Neuglen" E Velving (Lo) (6705/314φ), ScC & ScT 99.

***Setaria verticillata* - Quirlige Borstenhirse**

A: K -, S 179 / RL SL u

Feldwegrand über Muschelkalk ca. 300 m SE Pkt. 327,6 SE Kahren (Tr) (6405/111), SaE 95; Kirchgarten in Schwarzenholz (6607/312), CaS 99.

***Sherardia arvensis* - Ackerröte**

A: K 680, S 148 / RL SL 2, B 3

Heltener Bachtal u. Wald "le Busch" zw. Flastroff u. Zeurange (Lo) (6605/123), ScT 99; Acker S Flugplatz Düren (6606/331), ScC & ScT 99.

***Silene nutans* - Nickendes Leimkraut**

A: K 118, S 46 / RL SL *

Sandsteinfelsen am Forbacher Berg S Brême d'Or (Lo) (6707/433), KSb 97; Felsen am Steywald N Grosbliederstroff (Lo) (6808/122), WeJ 99.

***Sisymbrium altissimum* - Ungarische Rauke**

A: K 170, S 55 / RL SL *

Ruderalfläche auf Bauschutthalde N Forbach (Lo) (6807/115), KSb 99.

***Sisymbrium loeselii* - Loesels Rauke**

A: K -, S - / RL SL u

Mehrfach auf Ruderalflächen in der alten Hütte Völklingen (6707/131 u. 311), WeJ 99.

***Sorbus domestica* - Speierling**

A: K -, S 71 / RL SL -

Forêt Domaniale de Bouzonville nahe der Kreuzung des Filstroffer Weges und des Weges Beckerholz - Colmen S Ferme de Dampont N Filstroff (Lo) (6605/312), ScC & ScT 99; N St. Oswald W Filstroff (Lo) (6605/321), ScT & SaP 99; Côte de Thédning (W Klingelstauden) NW Thédning (Lo) (6807/313), M. Greff, ScC, ScT & WoP 95.

***Sparganium emersum* - Einfacher Igelkolben**

A: K 853, S 180 / RL SL 3

Geisweiler Weiher W Michelbach (6506/234), WoP 94.

***Sparganium natans* (= *S. minimum*) - Zwerg-Igelkolben**

A: K -, S 180 / RL SL 0, B 2

Waldtümpel im "Nassen Wald" S Neunkirchen (6609/331), HeU 99, WoP 99.

***Spergula morisonii* - Frühlings-Spark**

A: K -, S 45 / RL SL 2

Depotzaun S Sportplatz S Schönenberg (Pf) (6510/334), WoP 99; NSG-Limbacher Sanddüne S Limbach (6609/433!), SaP 98; Hebenpfehl-Sandackerbrache W Wadgassen (6706/221), SaP 98.

***Spirodela polyrhiza* - Teichlinse**

A: K 156, S 53 / RL SL *

Niedwehr an der Niedmühle SE Eimersdorf (6605/215), CaS 97; Niedbrücke Hemmersdorf (6605/232), CaS 97; Niederschleife NW Niedaltdorf (6605/315 u. 231), ScT & StA 95, CaS 97; Remelbachmündung SW Niedaltdorf (6605/411), CaS 99; Tümpel am Schlossweiher W Jägersburg (6609/225), WeJ 97; Tümpel im Messegelände Alt-Saarbrücken (6707/413), WeJ 97; Regenrückhaltebecken S Dudweiler, zu 100% bedeckt (6708/134), WeJ 99; Teich an der ehemaligen Kläranlage SE Hassel (6709/131), HeU 98.

***Stachys germanica* - Deutscher Ziest**

A: K 525, S 119 / RL SL 2

W Butzdorf (6404/421), StA 99.

***Stachys recta* - Aufrechter Ziest**

A: K 527, S 120 / RL SL 3

Weinbergsmauern und -brachen im Tälchen S Beulenberg E Helfant (Tr) (6404/211), CaS 95.

***Stellaria pallida* - Bleiche Sternmiere**

A: K-, S - / RL SL *

Aufgrund der frühen Blütezeit vermutlich häufiger übersehen:

Friedhof Ensdorf (6606/432), CaS 97; Zierrasen Dudweiler-Süd (6708/133), WoP 95.

***Symphytum officinale* ssp. *bohemicum* (= *S. bohemicum*) - Weißgelber Beinwell**

A: K -, S 114

Feuchte Wiese in Saaraue N Grosbliederstroff (Lo) (6808/122), KSb 99.

***Teesdalia nudicaulis* - Bauernsenf**

A: K 196, S 60 / RL SL 3

Felsheide über Schiefer am Westhang der Höhe 477,5 am Reinsfelder Industriegebiet (Tr) (6307/123), CaS, Sesterhenn & HeU 96; Offene *Festuca*-Heide mit einsetzender Ginster-Sukzession N Sonnenberg (Ko) (6309/222), ScC & ScT 94; Wiesen SE Hammerstein (Ko) (6309/224), ScC & ScT 96; Felsen im Schwohbachtal bei Kronweiler (Ko) (6309/231), ScC & ScT 94; Ginsterheide NE Kronweiler (Ko) (6309/232), ScC & ScT 94; Steinbruch an der Straße Reimsbach - Düppenweiler N des Hellbachs (6506/421φ), ScT 94; S-Rand Langeschachen NE Hauptstuhl (Pf) (6510/435), WoP 94; Rötchestal, Sandrasen mit *Jasione montana* u. *Ornithopus perpusillus* E Spiesen (6608/434), HeU 97-99; Magerwiese N Stumpfer Gipfel E Homburg (6610/323), HeU 94; Sandbrache S Rabenhorst N Kirrberg (6610/333), HeU 97-99; Sandsteinböschung am Dachsbau Dudweiler (6708/122), WeJ.

***Tetragonolobus maritimus* - Spargelbohne**

A: K -, S 81 / RL SL 3, B 3

Trockengefallener Absinkweiher N Dudweiler (6708/113), WeJ 99; Kalk-Quellmoor am Ham-Bach S Ormersviller (Lo) (6809/425), ScC & ScT 93, MaM 96.

***Teucrium chamaedrys* - Edel-Gamander**

A: K 510, S 117 / RL SL *

Waldsaum des "Kleinbirk" SE Schweyen (Lo) (6810/135), HeU 98.

***Thalictrum flavum* - Gelbe Wiesenraute**

A: K 156, S 53 / RL SL 2

Niedaue W u. NW Niedaltdorf (6605/315), ScT & StA 95, CaS 97.

***Thalictrum minus* (s.l.) - Kleine Wiesenraute i. w. Sinne**

A: K 155, S 53 / RL SL 2

Von den französischsprachigen Autoren (z.B. DE LANGHE et al. 1983, LAMBINON et al. 1992) wird neben einer grazilen, vor allem an trockenen Standorten in Magerwiesen und Halbtrockenrasen vorkommenden Sippe, eine robuste, an mesophilen Standorten vor allem in Stromtalwiesen auftretende Sippe unterschieden, die dem Taxon *Thalictrum minus* ssp. *majus* (Crantz) Hook f. zugeordnet wird. Die deutschen Floristen beschränken dieses Taxon auf eine vor allem in den Alpen vorkommende Sippe. Wir schließen uns hier, abweichend von KORNECK, SCHNITTLER & VOLLMER (1996), dem Artkonzept von LAMBINON et al. (l.c.) an und unterscheiden diese, wenn auch auch morphologisch nur schwach differenzierte Sippe der Stromtalwiesen von Nied und Mosel.

***Thalictrum minus* ssp. *majus* - Stromtal - Wiesenraute**

Moselwiesenrest zwischen den beiden Pferdemoseln rechts der Mosel E Kleinmacher (6404/312), CaS 98; NSG Taupeschwues, Moseltalwiese, 2 Ex. (Lu) (6404/322f), CaS 99; Linksseitige Niedaue zw. Grafenthal und Wackenmühle (6605/411, 235), CaS 97; Niedaue talabwärts d. Remelbachmündung S Niedaltdorf (6605/411), CaS 97.

***Thalictrum minus* ssp. *minus* - Kleine Wiesenraute**

Nackberg W Hilbringen (6505/411), ScC & ScT 97; Halbtrockenrasen S Jungenwald bei Hemmersdorf (6605/232), ScT 95; Magerwiesen und Halbtrockenrasen SE der Königsmühle N Leidingen (6605/423, 433), ScT & SaP 98.

***Thesium pyrenaicum* - Wiesen-Leinblatt**

A: K 53, S 34 / RL SL 4, B 3

Wiesen am Einsiederhof S Börfink (Ko) (6308/125), ScC 97; Magerweide am westlichen Ortsrand von Züsch ca. 130 m N Wbh. und Pkt. 555,2 (Tr) (6308/131), CaS 95; Magerwiese SE Reiterhof Retzenhöhe ca. 460 m SE Pkt. 592,7 (Tr) (6308/132), CaS 95; Violion-Brache SE Reiterhof Retzenhöhe ca. 350 m SE Pkt. 592,7 NE Züsch (Tr) (6308/132), CaS 95; Violion-Brache bei den beiden Teichen im Königsbachtal auf der östlichen Seite des Königsbaches ca. 180 m WSW Pkt. 563,6, N Zinershütten (Tr) (6308/133), CaS 95; Wiese am Arthenberg NW Abentheuer (Ko) (6308/231), ScC 95 u. 96; Wiesen W Ellenberg (Ko) (6308/234), ScC 95, 96 u. 97; Wiesen S Ellenberg (Ko) (6308/235), ScC & ScT 97; Skipiste im Hang zum Dollberg SE Neuhütten, spärlich (Tr) (6308/312), CaS & S. Mörsdorf 97; Wiesen in der Nahe-Schleife N Enzweiler (Ko) (6309/214), ScC & ScT 97.

***Trichomanes speciosum* - Prächtiger Dünnfarn**

A: K -, S - / RL SL -

Trichomanes speciosum kommt im Saarland und in angrenzenden Bereichen in Gametophyten-Populationen vor.

Stärkelsbachklamm NW Großbundenbach (Pf) (6610/335), WoP 97; Klamm NE Wiesbach (Pf) (6610/414), C. Stark 97; Klamm S Kleinbundenbach (Pf) (6610/432), C. Stark 97; Hollerlöcher E Kirkel (6709/211), C. Stark 97; Guldenschlucht N Wattweiler (Pf) (6709/234), C. Stark; Guldenschlucht N Wattweiler (Pf) (6709/235), C. Stark; Klamm NE Wattweiler (Pf) (6709/415), C. Stark; Klamm N Niederauerbach (Pf) (6710/124), C. Stark; Fels NE Niederauerbach (Pf) (6710/135), C. Stark; Fels N Oberauerbach (Pf) (6710/211), C. Stark; Fels Oberauerbach (Pf) (6710/221), C. Stark; Klamm E Kleinsteinhausen (Pf) (6710/435), C. Stark; Klamm NW Bottenbach (Pf) (6810/215), C. Stark.

***Trientalis europaea* - Europäischer Siebenstern**

A: K -, S 106 / RL SL 0

Talsole der Gr. Prims E Thiergarten, reichlich (Tr) (6307/215), CaS 95; An der Großen Prims unmittelbar an der westlichen MTB-Grenze sowie an zwei Stellen jeweils ca. 200 m W und E

Pkt. 582,4 E Thiergarten (Tr) (6308/111), CaS 95; Anmooriger Fichtenforst zwischen Höllenschlag und Pkt. 609,7 ca. 250 m SSE Pkt. 609,7 und ca. 440 m E Westrand MTB E Thiergarten (Tr) (6308/111), CaS 95; Linker Quellbach der Großen Prims, zugleich Abfluss des namenlosen Bruches in der SE-Ecke des Minutenfeldes E Thiergarten (Tr) (6308/111), CaS 99; Mehrfach in sumpfigen Mulden in Abt. 132 ca. 250 bis 400 m NNW und NW Pkt. 627,5 an der Mittelschneise (Quellgebiet der Gr. Prims) E Thiergarten (Tr) (6308/112), CaS 95; NW-exponierte Waldwegböschung direkt an der Mittelschneise ca. 400 m NE Pkt. 627,5 E Thiergarten (Tr) (6308/112), CaS 95; Völlig vernässter, nicht mehr nutzbarer ehemaliger Forstweg zwischen Abt. 121 und Jg. 123 E Thiergarten, von 150 m SSE Pkt. 627,5 bis 300 m SSW Pkt. 627,5 auf ca. 250 m "Weg"strecke reichlich (Tr) (6308/112), CaS 95; Quellgebiet des Hengstbaches: sumpfige Stelle im Fichtenforst nördlich der Forstweggabelung ca. 675 m NW Pkt. 618,0 NW Muhl (Tr) (6308/113), CaS 95; Sumpfige Stelle im Wald auf dem Sattel zwischen Sandkopf und der nordöstlich gelegenen Höhe 746,2 ca. 180 m N Pkt. 731,8 an der Pfaffenstraße E Thiergarten (Tr) (6308/113), CaS 95; Rechtes Seitental des Dombaches (Fraubaches) N Züsich in Abt. 65 in der Nähe eines in der Karte nicht verzeichneten (neuen) Teiches (Tr) (6308/121), CaS 95; An zahlreichen Stellen im Hengstbachtal oberhalb der Querung der Landstraße bei Pkt. 618,0 aufwärts bis zum nächsten querenden Forstweg auf ca. 600 m Bachlaufstrecke NW Muhl (Tr) (6308/123), CaS 95; Feuchtbrache am äußersten Westrand der Rodungsinsel Muhl N der Straße nach Züsich ca. 375 m WSW Pkt. 623,7 am Abzweig nach Zinershütten (Tr) (6308/123), CaS 95; Quellgebiet des Königsbaches in Abt. 100 ca. 175 m SE Pkt. 627,8 an der Straße Züsich-Muhl (Tr) (6308/123), CaS 95; Dombach N Züsich (Tr) (6308/131), StA 99; Ehemaliger Forstweg W des Dombaches (Fraubaches) zwischen Abt. 53 und 63 ca. 280 m NNW Parkplatz Dombachtal N Züsich (Tr) (6308/131), CaS 95; An mindestens 6 Stellen im ehemaligen Gunnesbruch NE Zinershütten und W Friedrichskopf (Tr) (6308/133), CaS 95; Östlicher Quellarm des Königsbaches ca. 250 m WSW Pkt. 576,2 bei der Querung des Königsbaches durch die Straße Zinershütten-Muhl (Tr) (6308/133), CaS 95.

***Trifolium aureum* - Gold-Klee**

A: K 319, S 80 / RL SL *

Außerhalb der montanen und submontanen Bereiche des Kartiergebietes ist der Goldklee selten:

Wegsäume S Wald "Ewig" S Grindorff (Lo) (6605/122), ScC & ScT 99; Waldwegrand im Eichertstal S Sengscheid (6708/411), WeJ 97; Sandstellen im Spicherer Tal N Alsting (Lo) (6807/215), WeJ 98.

***Trifolium fragiferum* - Erdbeer-Klee**

A: K 317, S 79 / RL SL *

Straßensaum N Hart-Wald zw. Grindorff u. Zeurange (Lo) (6605/112), ScC & ScT 99; Erdweg SE Wald "le Busch" zw. Flastroff u. Zeurange (Lo) (6605/123), ScT 99; Erdweg und Weiden am SE-lichen Quellarm des Ruisseau d'Ottonville NE Ottonville (Lo) (6705/323), P. Haffner & ScT 86; Störstelle in Feuchtgrünland E des Bahnkörpers NE Petit Eberswiller (Lo) (6806/335), KG Moose 97.

***Trifolium montanum* - Berg-Klee**

A: K 316, S 79 / RL SL 3

Halbtrockenrasen "Auf der Burg" W Ormersviller, SE Utweiler (6809/414), HeU 99; Magerrasen am Westhang des Niedersberges NE Guiderkirch (Lo) (6809/432), ScC & ScT 94; W-exponierter Halbtrockenrasen am Ortseingang bei Guiderkirch (Moritzbrunnen) (Lo) (6809/432), ScC & ScT 94.

***Trifolium ochroleucon* - Blassgelber Klee**

A: K 325, S 81 / RL SL *

Mehrfach in Halbtrockenrasen zw. St.Oswald u. d. Grand Bois de Bibiche NW Filstroff (Lo) (6605/311 u. 321), ScT & SaP 99; Magere Wegsäume im Forêt Domaniale de Bouzonville (Petit Kahlenhofen) NW Filstroff (Lo) (6605/322), ScC & ScT 99; Wiesen S des Aérodrome SW des Waldes "Forst" NE Neunkirch-lès-Sarreguemines (Lo) (6808/422), ScC & ScT 94.

***Trifolium striatum* - Gestreifter Klee**

A: K 321, S 80 / RL SL 2', B 3

Felsgrusflur W Steibericher Hof E Weiersbach (Ko) (6309/334), ScC & ScT 94; Geschotterte Fläche an einem Straßenrand in Weiskirchen, synanthrop (6406/234), CaS 98; Magerweide über sandigem Lehm am SE-Hang der Heisborner Höhe S Britten, unweit eines Feldweges, aber nicht erkennbar synanthrop (6406/321), CaS 99; Vulkanit-Felsgrusfluren in Viehweiden und Wiesen SSE Birkenhof, SE Rohrbach (6409/221), CaS 99; E Gries (Pf) (6510/325), Korneck 91.

***Typha angustifolia* - Schmalblättriger Rohrkolben**

A: K 854, S 181 / RL SL 2

Weiher im Bisttal S Colonie Neuland zw. Diesen u. Ham (Lo) (6806/111), CaS, ScC & ScT 95.

***Ulmus laevis* - Flatter-Ulme**

A: K 50, S 33 / RL SL *

Niedschleife NW Niedaltdorf (6605/231, 315), ScT & StA 95, CaS 97; Remelbach W Niedaltdorf (6605/315), CaS 97; Nied oberhalb der Mündung des Ihner Baches S Niedaltdorf (6605/411), CaS 97; Nied oberhalb Wackenmühle SW Hemmersdorf (6605/412), ScT 95, CaS 97.

***Utricularia australis* - Verkannter Wasserschlauch**

A: K 590, S 132 / RL SL 2', B 3

Teich im Taubental W Homburg-Beeden (6709/213!), WoP 98; Lambsbachtal W Kirrberg (6710/111), WoP 98.

***Utricularia vulgaris* - Gewöhnlicher Wasserschlauch**

A: K -, S 132 / RL SL 2', B 3

Tümpel mit Pioniervegetation im NSG Birkenfelder Tongruben W Birkenfeld (Bestätigung eines Fundes von O. Göhl) (Ko) (6308/415), ScC 94-97.

***Vaccinium oxycoccos* - Gewöhnliche Moosbeere**

A: K 452, S 105 / RL SL 0', B 3

Moorrest im Fichtenbestand ca. 150 m NNW Pkt. 558,3 NE Züsch (Tr) (6308/132), CaS 95.

***Vaccinium uliginosum* - Rauschbeere**

A: K -, S 105 / RL SL 1'

E Jägersburger Moor NE Homburg (Pf) (6610/123), HeU 97.

***Valerianella dentata* - Gezähnter Feldsalat**

A: K 603, S 134 / RL SL 3

Ackerrand am Ehringer Berg 630 m SW Pkt. 398,2, Kirf (Tr) (6404/413), CaS 95; Westlicher Teil des Gipfelplateaus des Hirschholz-Kopfes SW Trassem, ab ca. 100 m W Pkt. 331,3 (Tr) (6405/121), SaE 95; Wirbelfels N Merten (6706/131), ScC & ScT 91.

***Valerianella rimosa* - Gefurchter Feldsalat**

A: K -, S 134 / RL SL 2, B 3

Acker zwischen L 131 und Pkt. 346,5 NNW Eiderberg N Freudenburg; ca. 200 m SE Pkt. 346,5 (Tr) (6405/132), SaE 95; Acker ca. 150 m SE Pkt. 247,1 Richtung Butschenwies E Serrig (Tr) (6405/221), SaE 95.

***Verbascum phlomoides* - Windblumen-Königskerze**

A: K -, S 124 / RL SL u

Burg Grimburg (Tr) (6307/333), CaS 95; Ruderalstelle in Züsch (Tr) (6308/131), CaS 95; Schuttstellen zwischen Bahnlinie und Straße S des Schwarzbaches ENE der Tschifflick-Niederauerbach (Pf) (6710/135), SaE 99; Rand der Industriebahn N der Brücke der Straße von Ixheim nach Mittelbach über den Hornbach bei Ixheim (Pf) (6710/322), SaE 99; Straßenrand am südlichen Ortsausgang von Rimschweiler (Pf) (6710/333), SaE 99.

***Veronica anagallis-aquatica* - Gewöhnlicher Gauchheil-Ehrenpreis**

A: K 570, S 127 / RL SL *

Graben am Linsenberg E Flastroff (Lo) (6605/123), ScT 99; Flutmulden in den Wiesen am Ruisseau de Weistroff SE Waldweistroff (Lo) (6605/131), ScC & ScT 99; Tümpel in den

Saarwiesen S Rockershausen (6707/411), WeJ 99; Feuchtwiesen E des Spitzwaldes SE Ipling (Lo) (6808/331), ScC & ScT 92.

***Veronica peregrina* ssp. *peregrina* - Fremder Ehrenpreis**

A: K -, S 128 / RL SL -

Aufschüttung am südöstlichen Ortsrand von Merten (Lo) (6706/311), CaS 99.

***Veronica scutellata* - Schild-Ehrenpreis**

A: K 568, S 127 / RL SL *

Randsenke der Illaue SE der Heistermühle zw. Gennweiler und Wemmetsweiler (6608/125), ScT & StA 93; Quellmulde in der Flur "Gebrannetickt" SW Merchweiler (Lo) (6608/133), ScT & StA 93; Uferbereich im "Dritten Weiher" W St. Arnual (6707/435), WeJ 99; Trockengefallener Weiher im Bornbachtal E Niederwürzbach (6709/134), HeU 94; Flur "Breitenbusch" S Gaubiving (Lo) (6807/411), ScC & ScT 95.

***Veronica teucrium* (*V. austriaca* agg.) - Großer Ehrenpreis**

A: K 564, S 127 / RL SL 3

Magere Weide W Tiergarten-Wald S Colmen (Lo) (6605/133), ScT 99; Magere Mähwiese der linken Talaue der Nied W der Wackenmühle SW Hemmersdorf (6605/315), ScT u. StA 95; Battenberg S Zinzing (Lo) (6808/132), ScC, ScT & WoP 92.

***Veronica triphyllos* - Dreiteiliger Ehrenpreis**

A: K 571, S 128 / RL SL *

Mehrfach auf sandigen Äckern der Bliesterrassen SW Blickweiler (6709/335), ScC & ScT 90, HeU 97.

***Vicia lathyroides* - Sand-Wicke**

A: K 302, S 77 / RL SL 3

Magere Schafweide über sandigem Lehm des Oberrotliegenden W St. Wendel-Alsfassen (6508/225), CaS 99; Zw. Ensdorf u. Bous (6706/212), StA 99; Sandbrache Gewerbegebiet West, W HELA-Markt St. Ingbert (6708/222), HeU 93; Magere Wiesen auf Mittlerem Buntsandstein in der Flur "Hoff" S Cité des Genêts zw. Diesen u. Ham (Lo) (6806/111), CaS, ScC & ScT 95.

***Vitis vinifera* ssp. *vinifera* - Kultur-Rebe**

A: K -, S 89 / RL SL *

Am nördlichen Ortsausgang von Contwig in der Schwarzbachau zwischen B10 und Schwarzbach längs von Gräben geschlossene Gebüsche bildend. Hier als eingebürgert zu betrachten (Pf) (6710/231), SaE 99.

***Vicia tenuifolia* [s.str.] - Feinblättrige Vogel-Wicke**

A: K 297, S 76 / RL SL *

Säume am Prallhang der Nied N Filstroff (Lo) (6605/323), ScC & ScT 92; "Hoemerich" und "Wingertberg" E Holling (Lo) (6705/131), ScC & ScT 99; Bovenberg NW Ottonville (Lo) (6705/321), ScC & ScT 99.

***Viola canina* ssp. *canina* - Hunds-Veilchen**

A: K 394, S 93 / RL SL *

Meldungen außerhalb der montan u. submontan geprägten Gebiete:

"Verkehrinsel" in der AS St. Ingbert-West N Sengscheid (6708/232), ScT 99; Magere Wiesen auf Mittlerem Buntsandstein in der Flur "Hoff" S Cité des Genêts zw. Diesen u. Ham (Lo) (6806/111), CaS, ScC & ScT 95; Magere Wiesenbrache am ehem. Étang de Roderisse N Dourdhal (Lo) (6806/331), ScC & ScT 91.

***Vulpia bromoides* - Trespen-Federschwingel**

A: K 775, S 168 / RL SL 4

Magerstelle auf einer Verkehrsinsel N Rodenhof (6707/235), WeJ 98; Halde St-Charles II W Großrosseln (6807/111), WoP 95.

***Wahlenbergia hederacea* - Efeu-Moorglöckchen**

A: K 621, S 137 / RL SL 2, B 2

(1) Reste von Waldbinsensümpfen einer aufgeforsteten Lichtung im Rotenbachtal ca. 375 m WNW Pkt. 510,3 sowie (2) vernässte Auflichtung etwas unterhalb des nach NW abzweigenden Forstweges ca. 150 m oberhalb von (1) (Tr) (6406/313!), CaS 96.

***Zannichellia palustris* ssp. *palustris* - Teichfaden**

A: K -, S 158 / RL SL 2

Leuk in Oberleuken (6404/433), WoP 98; Leuk in Kesslingen (6404/434 u. 435), WoP 98; Leuk an der Haselmühle E Kesslingen (6405/331), WoP 98.

5. Literatur:

- DE LANGHE, J.-E., DELVOSALLE, L., DUVIGNEAUD, J., LAMBINON, J. & C. VANDEN BERGHEN (1983): Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des Régions voisines (Ptéridophytes et Spermatophytes). Troisième édition — Meise.
- HAFFNER, P. (1960): Pflanzensoziologische und pflanzengeographische Untersuchungen im Muschelkalkgebiet des Saarlandes mit besonderer Berücksichtigung der Grenzgebiete von Lothringen und Luxemburg. — In: KREMP, W. [Hrsg.]: Untersuchungsergebnisse aus Landschafts- und Naturschutzgebieten im Saarland [= Naturschutz und Landschaftspflege im Saarland, Bd. 2]. — Saarbrücken S. 66-164.
- HAFFNER, P. (1990): Geobotanische Untersuchungen im Saar-Mosel-Raum. (= Abh. DELATTINIA **18**: 1-383), Saarbrücken.
- KIEFFER, J. J. (1884): Contributions à la faune et à la flore de Bitche. — Bull. Soc. Hist. Nat. de Metz. 2e série, **16**: 35 - 111.
- KIEFFER, J. J. (1887): Suites aux contributions à la faune et à la flore de Bitche. — Bull. Soc. Hist. Nat. de Metz. 2e série, **17**: 1 - 47.
- KORNECK, D., SCHNITTLER, M. & I. VOLLMER (1996): Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta et Spermatophyta) Deutschlands. — In: Bundesamt für Naturschutz [Hrsg.]: Rote Liste der gefährdeten Pflanzen Deutschlands. [= Schriftenreihe Vegetationsk. **28**]. — Bonn S. 21-187.
- LAMBINON, J., DE LANGHE, J.-E., DELVOSALLE, L. & J. DUVIGNEAUD (1992): Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des Régions voisines. (Ptéridophytes et Spermatophytes). Quatrième édition. — Meise.
- LANG, W. & P. WOLFF (1993): Flora der Pfalz - Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen für die Pfalz und ihre Randgebiete. — Speyer.
- LEMOINE, Y. (1985): Découverte d'une nouvelle station de *Botrychium matricariifolium* (Retz) A. Braun (= *B. rutaceum* Sw.) — Bull. Soc. Hist. Nat. Moselle **44**: 109 - 112.
- SAUER, E. (1993): Die Gefäßpflanzen des Saarlandes mit Verbreitungskarten [= Aus Natur und Landschaft im Saarland, Sonderband **5**]. — Saarbrücken 707 S.
- SAUER, E. (1988): Die gefährdeten Pflanzenarten. Die höheren Pflanzen. — In: Minister für Umwelt [Hrsg.]: Rote Liste. - Bedrohte Tier- und Pflanzenarten im Saarland, S. 52 - 68.
- SKALICKY & SUTORY (1990): *Montia* — In: KVETENA: Flora der Tschechischen Republik Bd. **2**. S. 72 - 74
- WISSKIRCHEN, R. & H. HAEUPLER [Hrsg.] (1998): Standardliste der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. — Stuttgart (Hohenheim).

Anschriften der AutorInnen:

Thomas Schneider, Klinkerstr. 92, D-66663 Merzig, Deutschland

Claudia Schneider, Klinkerstr. 92, D-66663 Merzig, Deutschland

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Delattinia](#)

Jahr/Year: 1999

Band/Volume: [25](#)

Autor(en)/Author(s): Schneider Thomas, Schneider Claudia

Artikel/Article: [Funde bemerkenswerter und gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen im Saarland und seinen Randgebieten, 1. Folge \(1993-1999\) 211-296](#)