

Bemerkungen zu europäischen *Elater*-Arten.

Von

Edm. Reitter in Mödling bei Wien.

Elater rubidus Reitt., Ent. Nachr. 1889, pg. 112, ist nach Einsichtnahme des typischen Originalexemplares nicht mit der gleichnamigen Candèze'schen Art identisch; ich schlage demnach für meine Art, welche mir nur in einigen Exemplaren aus Ostsibirien vorliegt, den Namen *latiusculus* vor. Meine Exemplare messen 12.1 mill.

Der *Elater rubidus* Cand. ist eine gröfsere Art (17 mill.) mit sehr grober Punktur des Halsschildes und fast vollständiger, tiefer Mittelfurche am Halsschild. Er steht den *sanguinolentus* sehr nahe, und ist von diesem kaum spezifisch verschieden.

Elater angusticollis Heyd. ist eine Var. des *cinnabarinus* mit etwas längerem, nach vorn mehr verengtem Halsschild, das ich für eine individuelle Abweichung halte, da ich eine ähnliche bei *pomoniae*, *crocatu*s etc. bemerkt habe.

Elater straminipennis Heyd. aus Asturien, als Var. von *ochropterus* beschrieben, ist eine selbstständige Art, deren Flügeldecken dunkel, der Rest des Körpers gelblich behaart ist. Von dem ähnlich behaarten *E. ochropterus* var. *auranticulus* m. ist *straminipennis* durch viel feinere, am Dorsum sehr spärliche Punktur des Halsschildes und von *coenobita* Costa (*ochripennis* Reitt.) durch die letztere und den Mangel einer Mittelfurche an der Basis des Thorax zu unterscheiden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [1889](#)

Autor(en)/Author(s): Reitter Edmund

Artikel/Article: [Bemerkungen zu europäischen Elater- Arten. 260](#)