

*Malthodes caudatus*: *Piceus*, *nitidus*, *subtilissime griseo-pubescens*, *prothorace subquadrato marginato*, *lateribus flavo limbatis*, *elytris subtiliter subrugoso-punctulatis*, *abdomine flavo-marginato*. — Long. 5 mill.

Var. *Prothorace anguste flavo-cincto*.

Mas: *Antennis corporis longitudine*, *capite prothorace latiore pone oculos angustato*; *segmentis analibus sat elongatis*, *penultimo utrinque acute et longe spinoso*, *spinis leviter curvatis*, *ultimo parvo*, *apice paullo emarginato*; *segmentis genitalibus penultimo profunde emarginato*, *lobis utrinque sat rotundatis*, *ultimo stylum subcurvatum*, *apice triangulariter emarginatum exhibente*.

Größe und Gestalt des *M. marginatus*, aber viel dunkler gefärbt. Die Kniee eine Spur rötlich, ebenso die Basis einzelner Fühlrglieder, Bauch und Halssch. gelb oder rötlich gelb gesäumt, ebenso die Epimeren der Mittel- und Hinterbrust. Das Halssch. ist eine Spur länger als breit, an den Seiten gerandet, die Vorderecken schräg abgestutzt, die Scheibe mit einigen weiten und flachen Vertiefungen vor und hinter der Mitte. Der helle Saum der Seiten ist breit, bisweilen auch schmaler. Fld. einfarbig, etwas heller als pechschwarz, glänzend, dicht und fein punkulirt, die Zwischenräume an der Basis fast eben, nach hinten fein gerunzelt. ♂ Kopf schmaler, Augen weniger gewölbt, wie bei *marginatus*; das vorletzte Analsegment<sup>1)</sup> ist ziemlich lang, am Hinterrande jederseits in einen langen, schwach gebogenen schwarzen Dorn ausgezogen. Beide Dornen neigen sich hinten gegeneinander und schliessen das kleine, etwa rechteckige letzte Segment ein, welches in der Mitte des Hinterrandes eine kleine Ausbuchtung besitzt. Die Hülle der Geschlechtsteile besteht aus einem Segmente, das durch einen Ausschnitt in einen gerundeten Zipfel jederseits geteilt ist und aus einem Bügel. Dieser ist von der Mitte bis zur Spitze in die Höhe gekrümmt und etwas erweitert, an der Spitze selbst dreieckig ausgeschnitten. In der Bildung des Hinterleibes erinnert die Art an *misellus* Ksw.

Von Hrn. Liegel bei Gnesau in Kärnthen gesammelt.

<sup>1)</sup> Ich habe bereits Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, 348 darauf hingewiesen, daß die Bezeichnung „Rücken- und Bauchsegmente“ nicht richtig ist; erstere enthalten den Darmkanal und bilden also den eigentlichen Anus, während die sogenannten Bauchsegmente die überraschend gebauten Fortpflanzungsorgane einhüllen.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: [1892](#)

Autor(en)/Author(s): Weise Julius

Artikel/Article: [Malthodes caudatus 410](#)