

Eine neue deutsche Varietät
von *Leptura rubra* L. (*testacea* L., *rubro-testacea* Ill.)

Von

C. H. Bickhardt, Postsekretär, Frankfurt (Main).

Im Laufe dieses Sommers gelang es mir, auf einem meiner Sammel-Ausflüge in nächster Nähe Frankfurts eine zweifellos neue Varietät der bekannten *Leptura rubra* L. ♀ zu finden.

Ich nenne das Thier meinem verehrten Freunde und Sammelcollegen Stadtbaumeister W. Sattler zu Ehren:

Leptura rubra L. ♀ var. *Sattleri* nov.

Char. Differt a typo thorace nigro, lateribus thoracis solum anguste et dilute rubro-marginatis. — Long. 17 mill.

Von der Stammart ist die Varietät durch das schwarze Halsschild unterschieden. Die schmalen rothen Lateralflecken sind noch als Ueberreste der Farbe des Halsschildes von *Leptura rubra* zu betrachten.

Von *Leptura erythroptera* Hagenb. ist die Varietät durch die Farbe der Fühler und der Beine, sowie durch die mehr ziegelrothe Färbung der Flügeldecken getrennt. Auch die rudimentären rothen Flecken am Rande des Halsschildes lassen eine Verwandtschaft mit dieser Art — die sich außerdem noch durch schlankeren Habitus auszeichnet — ausgeschlossen erscheinen.

Das bis jetzt einzige Exemplar der Varietät¹⁾ wurde von mir am 30. Juli 1901 Nachmittags 4 Uhr bei Sonnenschein auf dem Sachsenhäuser Berg nahe der Stadt Frankfurt (Main) nicht weit von der Goetheruhe im Fluge gefangen.

¹⁾ Herr Prof. Dr. L. von Heyden sah das Thier!

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1901

Band/Volume: [1901](#)

Autor(en)/Author(s): Bickhardt Heinrich

Artikel/Article: [Eine neue deutsche Varietät von *Leptura rubra* L. \(testacea L., rubro-testacea Ill.\) 362](#)