

Head large (4 mm across eyes); vertex declivous to neck; front with two deep rounded depressions; under surface sparsely beset with long hairs. Prothorax subcordate (3×5 mm), very little narrower at base (3.6 mm) than at apex (3.8 mm); sides lightly rounded and shortly sinuate posteriorly to meet base at right angles; apex emarginate; anterior margin lightly advanced in a convex curve on each side of neck; anterior angles widely obtuse and distant from neck; base truncate, sloping forward a little on each side; basal angles almost rectangular; lateral margins widely explanate and reflexed, narrowly bordered; 2 marginal setae on each side on explanate margin, the anterior one a little distance from edge, the posterior on edge at basal angle; upper surface setose. Elytra wider than prothorax (10×5.5 mm); shoulders rounded; apex sinuate-truncate, with membranous border; striae 1—6 strongly impressed, 7th fainter (except at base and apex), 9th faint throughout; interstices finely and closely setose-punctate, 1—6 lightly convex, 7th lightly convex at base and apex, 8th depressed, 9th narrow, depressed (convex just behind humeral angles), seriate-punctate — (the punctures duplicated and closely placed just behind shoulders) —; lateral border narrow; inflexed margin setose. Abdomen sparsely punctate and with decumbent short setae.

Length 18, breadth 5.5 mm.

Hab.: New Pomerania, Gazelle Peninsula.

At once distinguished by its much greater size from all other described species.

Coleopterologisches Ergebnis einiger in der Umgebung Fiumes vorgenommener Siebe-Exkursionen.

Von Paul Meyer, Fiume.

Die Umgebung Fiumes, als ein Gebiet des südlichen Karstes, ist steril, und das Sieben verlohnt sich nur in den entsprechend bewachsenen kleineren Tälern und in den Dolinen.

Die nachstehende Aufzählung einiger von mir gesammelter, interessanterer Käferarten dürfte vielleicht einiges Interesse bieten.

Den Herren Dr. M. Bernhauer und Kaiserl. Rat E. Reitter gestatte ich mir an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank aus-

zudrücken für die bereitwilligst durchgeführte Bestimmung der sich jetzt in der Sammlung meines Onkels, des Herrn Wilh. Koltze in Hamburg, befindenden Coleopteren.

1. In der Umgebung Fiumes sammelte ich:

- Leistus rufomarginatus* Duft.
Nebria Dahli Strm. nebst var. *littoralis* Dej.
Laemosthenes elongatus Dej.
Harpalus atratus Latr., *rubripes* Duft., *honestus* Duft., *sulphuripes* Grm.
Stenolophus teutonius Schrank.
Hydraena nigrita Grm.
Calodera (Amarochara) Bomairei Bernh.?
Atheta (Homalota) Pertyi Heer, (*Alaobia*) *oblita* Er.
Xantholinus relucens Grav.
Medon piceus Kr., *fuscus* Kr.
Stenus maculiger Wse., *asphaltinus* Er., *pumilio* Er., *cyaneus*
Baudi, *subaeneus* Er., *Erichsoni* Rye.
Trimium Emonae Reitt., *longipenne* Rtrr.
Bythinus longulus Ksw., *Curtisi* Denny, *securiger* Reichb., *lunicornis* Rtrr.
Tychus rufus Motsch.
Cephennium Saulcyi Rtrr.
Neuraphes geticus Saulcy.
Euconus oblongus Strm., *Motschulskyi* Strm. var. *Kiesewetteri* Kiesw.
Bathyscia montana Schiödte.
Hydnobius punctulatus Hampe.
Orthoperus pilosiusculus Duv.
Alexia laevicollis Reitt., *pilosa* Panz., v. *lunigera* Rtrr.
Cryptophagus labilis Er., *Thomsoni* Rtrr., *hirtulus* Kr.
Atomaria rubricollis Rtrr.
Laemophloeus Krüperi Rtrr. (bisher nur aus Griechenland bekannt).
Curimus lariensis Villa.
Athous cavus Grm.
Agriotes ustulatus Schaller.
Rhagonycha femoralis Brull.
Dasytes tardus Schauf.
Danacea murina Küst.
Oligomerus Reji Bris.
Euglenes testaceus Kolen., *populneus* Panz.
Otiorrhynchus cardiniger Host., *latipennis* Boh., *rugosostriatus* Goeze, *duinensis* Grm., *elegantulus* Grm., *Sequensi* Rtrr., *alutaceus* Grm.

Polydrusus dalmatinus Stierl.
Brachysomus hirtus Boh.
Omius concinnus Boh.
Acalles Capiomonti Bris. (*Trachodius*) *vicarius* Dan.
Miarus distinctus Boh.
Apion holosericeum Gyll., *varipes* Grm., *apricans* Hbst., *dichroum*
 Bedel, *tenuis* Kirby.
Leptidea brevipennis Muls.
Callidium aeneum Deg.
Phymatodes testaceum L.
Hylotrupes bajulus L., var. *lividus* Muls.
Dorcadion pedestre Poda.
Psylliodes algerica All. (Von Herrn J. Weise bestimmt, bis-
 her nur aus Algier und Sicilien bekannt.)
Scymnus arcuatus Rossi v. *Hausmanni* Gredl.

2. In den kroatischen Waldungen bei Lič, Fuzine und Lokve
 erbeutete ich:

Dyschirius (Reicheiodes) rotundipennis Chd.
Trechus croaticus Dej.
Synuchus nivalis Panz., var. *silvalis* Motsch.
Abax carinatus Duft.
Molops ovipennis Chaud.
Ocalea puncticollis Rey.
Colpodota consanguinea Epp.
Lioghluta melanocephala Heer, *hypnorum* Kiesw., *nitidula* Kr.
Leptusa Ludyi Epp., *injirma* Wse.
Quedius scitus Grav., *ochropterus* Er., *obliteratus* Er., *scintillans*
 Grav., *fulvicollis* Steph.
Ocypus fulvipennis Kr.
Philonthus lucens Er.
Stenus Hopffgarteni Epp.
Protinus brachypterus F., *limbatus* Mäkl.
Bythinus Heydeni Reitt., *crassicornis* Motsch., *bulbifer* Reichb.,
nodicornis Aub., *Stussineri* Rtt., *validus* Aub.
Cephemium carnicum Reitt., *latum* Motsch., *Saulcyi* Reitt.
Neuraphes elongatulus Müll., *Capellae* Reitt.
Euconmus pubicollis Müll., *styriacus* Grim.
Bathyscia celata Hampe.
Clambus minutus Strm.
Alexia globosa Strm., *Seidlitzi* Reitt.
Cryptophagus abietis Payk.
Lathridius nodifer Westw.

Laena viemensis Strm.
Orchesia blandula Brancsik.
Zonabris floralis Pallas.
Otiorrhynchus illyricus Stierl., *corruptor* Host.
Acalles turbatus Boh.
Scleropterus fallax Otto.
Leptura rubrotestacea Illig.
Lamprosoma concolor Strm.
Psylliodes cucullata Illig., *thlaspis* Foudr.
Longitarsus rubellus Foudr.

3. Auf dem Monte Maggiore (Istrien), in der Nähe des Kronprinzessin Stefanie-Schutzhauses, ungefähr 1000 m über dem Meere, fing ich:

Ocalea badia Er.
Amischa validiuscula Kr.
Atheta trinotata Kr., *crassicornis* F.
Leptusa piceata Rey.
Gyrophaena laevipennis Kr.
Quediis mesomelinus Marsh., *xanthopus* Er.
Bythinus Brusinae Reitt., *puncticollis* Denny.
Cephenium delicatulum Reitt.
Ptiliolium Oedipus Flach.
Aderces suturalis Heer.
Geotrupes vernalis var. *autumnalis* Er.
Otiorrhynchus dalmatinus Gyllh., *masticæ* Oliv., *crinipes* Mill., *infernalis* Grm.
Phyllobius argentatus L., *Heydeni* Stierl.
Omius Viertli Wse.
Lepyrus binotatus F.
Cotaster uncipes Bohem.
Acalles Aubei Boh., *roboris* Curt., var. *Naviesi* Boh., *hypocrita* Boh.
Apion reflexum Gyllh.
Phaenotherion fasciculatum Rtrr.
Dorcadion arenarium Scopoli.
Chrysomela coerulea Oliv.
Orina cacaliae var. *coeruleolineata* Duft.
Batophila rubi Payk.
Phyllotreta vittula Redtb., *nemorum* L., *atra* F.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: [1907](#)

Autor(en)/Author(s): Meyer Paul

Artikel/Article: [Coleopterologisches Ergebnis einiger in der Umgebung Fiumes vorgenommener Siebe-Exkursionen. 185-188](#)