

Trigonotoma (Col. Carabidae) *Kuntzeni* n. sp. aus Borneo.

Von Pfarrer **Wilhelm Hubenthal**, Buflieben bei Gotha.

Mit *Trigonotoma psyche* Tschitscherine am nächsten verwandt, von dieser durch andere Färbung, schmälere, gestrecktere Gestalt, hinten noch stärker und ausgeschweift verengten Halsschild, viel breitere und tiefere Seitenrandkehlen desselben, viel feinere Streifen und flache Zwischenräume der Flügeldecken, sowie andere Bildung der Tarsen, leicht zu unterscheiden.

Dunkel violett, Flügeldecken etwas kupferig schimmernd; glatt, glänzend. Kopf und Mandibeln etwas kürzer als bei *psyche* gebaut. (Fühler fehlen). Halsschild wenig breiter als lang, gewölbt, hinten noch stärker als vorn verengt, ausgeschweift, Hinterwinkel stumpfwinklig, viel mehr dem Rechten genähert als bei *psyche*. Seitenrandkehle sehr breit und tief, ebenso der hintere Längseindruck, mit dem sie verbunden ist. Seitenrand dicker und viel mehr aufgebogen als bei *psyche*. Flügeldecken gewölbter, hinten mehr zugespitzt als bei dieser, viel feiner punktiert gestreift, hinten und an den Seiten viel schwächer vertieft; die Zwischenräume sind flach, an den Seiten und hinten etwas gewölbt. Dritter Zwischenraum vorn und in der Mitte mit je einem eingestochenen Punkt. Mittel- und Hintertarsen von *psyche* dadurch abweichend, daß das erste Glied kürzer, das zweite und dritte etwas länger als bei dieser sind. — Beim ♂ sind die Vordertarsen herzförmig erweitert.

Kina Balu, Borneo (Dr. Staudinger und A. Bang-Haas), 1 ♂ in Sammlung Langenhahn-Gotha.

Herr Dr. Kuntzen, der diese Gattung bearbeitet hat (Entom. Rundschau 1911. Nr. 23 p. 182. 183), erklärte diese Art für neu. Ich widme sie ihm in freundschaftlicher Verehrung.

Vier neue Arten der Carabiden-Gattung *Pheropsophus* Solier, nebst Bemerkungen zu bekannten Arten.

Von Pfarrer **Wilhelm Hubenthal**, Buflieben bei Gotha.

1. *Pheropsophus* (subg. *Stenaptinus* Maindron) *Kolbei* m. nov. sp. — Diese ausgezeichnete Art schließt sich durch die fast erloschenen Rippen der Flügeldecken an *Protopheropsophus* an und kommt an die Spitze des subg. *Stenaptinus* zu stehen. Sie unterscheidet sich von allen Arten durch den großen Kopf,

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1914

Band/Volume: [1914](#)

Autor(en)/Author(s): Hubenthal Wilhelm

Artikel/Article: [Trigonotoma \(Col. Carabidae\) Kuntzeni n. sp. aus Borneo. 437](#)