

## Ergänzungen zur Thüringer Käferfauna.

Von Pfarrer Wilhelm Hubenthal, Buflieben bei Gotha.

## XIV.

*Cicindela germanica* L. a. *coerulea* Hbst, Fahner Höhe, Waldlichtung, offen nach der Südseite, Kiefernbestand, mit vielen *germanica*, einzeln. 29. VII. 1922 (Heymes).

*Calosoma inquisitor* L. a. *viridimarginatum* und a. *nigrum* Ltnz., beide bei Erfurt mit der Nominatform n. s.

*Carabus coriaceus* L. v. *angusticollis* Mot. Gotha, Krahnberg. 14. V. 1893. 1 St. (Hbthl.). — *violaceus* L. a. *Suffriani* Wsth. bei Gotha. 28. V. 1901. 1 St. (Hbthl.). — *auratus* L. a. *Worlei* Beuth. Kösen. IX. 1920, unter einem Stein, von einer Erdspinne erfaßt (van Emden). — *cancellatus* Ill. v. *intersculptus* Flsch. Thüringen (coll. Meyer-Darcis). 1 St. — Kommt auch bei v. *saxonicus* und anderen Formen vor.

*Leistus rufomarginatus* Dft. Buflieben, Pfarrwohnung am Eingang, 1 ♀, 5. VII. 1925 (Hbthl.).

*Notiophilus laticollis* Chaud. Zeyern, Frankenwald. VIII. (Dorn).

*Bembidion decorum* Pz. a. *munganasti* Reitt. Blankenburg, an der Schwarza, 1 St. (Hbthl.).

*Trechus montanellus* Gemm. nicht in Thür., die Stücke der Sammlung Maaß sind *splendens* Putz. (cf. Ergänzung XI. D. E. Z. 1917, 117). (Hbthl. vidit.)

*Ophonus azureus* F. a. *chlorophanus* Pz. Überall häufig. Die blaue Nominatform ist selten.

*Harpalus aeneus* F. a. *virens* Schils. n. s. — *distinguendus* Dft. a. *virens* Schls. Erfurt; a. *coeruleus* Schls. Salzsee, Schwellenburg; a. *melas* Trr. Salzsee (Ms.). — *progrediens* Schaubberger. Ent. Anzeiger (Wien) 1922, 77. Suhl, 24. IV. 1901. 1 St. (Fiedler). — *zabroides* Dej. Freyburg a. d. Unstrut, Kalkboden, 5. VI. 1921. 1 ♂ (Halbauer, van Emden. Ent. Blätt. 1922, 93). Erfurt, Drosselberg einzeln, Schwellenburg zahlreich (Ms.), Sömmerda (Ms.). — *hirtipes* Pz. am Drosselberg. IV. 2 St. von Maaß gefunden.

*Bradycellus collaris* Pz. v. *alatus* Schaubberger. Gr. Seeberg bei Gotha, einzeln (Hbthl.).

*Pterostichus marginalis* Dej. Eisleben (Feige). Ottenhausen, Pflingstwoche 1923, zehn Stück (Dorn).

*Demetrias imperialis* Grm. a. *interruptus* Schls. Wormsleben bei Eisleben. IV. (Feige).

*Hygrotus inaequalis* F. a. *parvulus* F., a. *fasciatus* Trr. Siebleber Teich (Hbthl.). — *versicolor* Schall. a. *collaris* Pz. Siebleber Teich (Hbthl.).

*Bidessus*, nicht *Badister* heißt die sechste Art in meiner VII. Ergänzung (D. E. Z. 1912, 72).

*Omalius caesum* Grv. a. *apicicorne* Reitt. F. G. II. 192 (non Solsky Luze!) verbreitet. Nach Gusmann (Ent. Bl. 1925, 3) mit Recht einzuziehen, da unwesentlich.

*Anthophagus bicornis* Blch. a. *marginicollis* Epp. Friedrichroda, 1 St. (Grave). Elgersburg. V. 1 St. (Rapp).

*Bledius fracticornis* Pk. mit roten Flgd. Frankenhäuser, Salz-  
boden. V. 1 St. (Hbthl.). Wurde früher als v. *elongatus* Mnh.  
angesehen, der aber nach dem Catalogus Winkler eigne Art  
ist; v. *laetior* Rey kann auch nicht ohne weiteres auf die helle  
Form des *fracticornis* bezogen werden, da *laetior* Rey vielleicht auch  
eigne Art ist.

*Lathrobium gracile* Hampe. Aus angeschwemmtem Genist der  
Werra an der Brücke von Untermaßfeld bei Meiningen gesiebt.  
19. III. 1922. 1 St. (Fiedler). — *filiforme* Grv. v. *suturale* Wck.  
Siebl. Tch. IV. 1 St. (Hbthl.). — *spadiceum* Er. Erfurt, Aue.  
25. VI. 1909. 1 ♀ (Maab).

*Philonthus sanguinolentus* Grv. a. *suturalis* Schils. Fahner Höhe.  
V. X. 2 St. (Hbthl.).

*Staphylinus caesareus* Ced. v. *parumtomentosus* Stein. Siebleben,  
am Rotgraben, unter Stein. 24. X. 1888. 1 St. (Hbthl.).  
Nürnberg. V. 1 St. Sachsenburg. IV. 1 St. (Rapp). — *com-  
pressus* Mrsh. Schnepfenthal bei Waltershausen. 1 St. (Gerbing,  
in seiner Sammlung im Gothaer Museum).

*Quedius molochinus* Grv. a. *niger* Sahlb. (*nigrinus* Porta, *nigri-  
pennis* Hänel Roubal) (Flgd. schwarz). Auf diese Form bezieht  
sich das in meiner III. Ergänzung (D. E. Z. 1908, 38) unter  
a. *picipennis* Pk. Gesagte. *Picipennis* Pk. gehört zur Nominatform.  
Paykull führt als zweite Form jene Varietät an: „elytris nigro-  
piceis vel fusco-nigricantibus“.

*Mycetoporus corpulentus* Luze. Kyffhäusergebirge. 1 St. (U-  
mann, Ent. Blätt. 1924, 57).

*Tachyporus chrysomelinus* L. a. *immaculatus* Lze. Sättelstädt,  
Genist. 1 St. (Ir.).

*Bolitochara mulsanti* Shp. Gehlberger Mühle, aus einem ver-  
pilzten Buchenstamm. 29. VI. 1924. 1 St. (Liebmann).

*Tachyusa coarctata* Er. a. *cyanea* Krtz. Gispersleben. V.  
(Hbthl.). Kösen (Habelmann).

*Atheta eichhoffi* Scrb. Nordhausen. 1 ♂ (Heymes). — *georgiana*  
Mot. Bernh. (Ent. Blätt. 1922, 85). Fahner Höhe, Buchenlaub.  
IV. selten (Hbthl.).

*Zyras confragosus* Hochh. Remschlitztal bei Zeyern. 17. VIII.  
1906. 1 St. (Dorn).

*Thiasophila angulata* Er. v. *peza* Mot. Thür. Wald, Gabel. VII. 1920. 1 St. (Heymes).

*Phloeopora angustiformis* Bdi. Arnstadt, im Tieftal unter Kiefernrinde. 11. XII. 1921. 2 St. (Liebmann).

*Aleochara puberula* Klug. Arnstadt, im Garten aus Pferdemit gesiebt. 20. VIII. 1921. 1 St. (Liebmann). Eisleben, Mohrenapotheke, Kompost. 29. VIII. 1921 (Feige, Ent. Bl. 1924, 20). — *vagepunctata* Krtz. Eisleben, beim Süßen See. 29. V. 1922. 1 St. fliegend (Hbthl.). — *bipustulata* L. (*nitida* Grv.) v. *pauvilla* Rey. Verbreitet. Jena. Gotha. Unwesentlich, da viele *Aleochara*-Arten solche Zwergformen bilden.

*Euplectus nitidus* Frm. Zeyern, in Erlenstümpfen in geringer Anzahl. ♂♀. 7. IV. 1905, 21. IV. 1922 (Dorn).

*Choleva spadicea* Strm. Bei: „Jeannel, Révision des „Choleva“ Latreille (Abeille XXXII, 1923, Nr. 1) heißt es auf Seite 43: „W. Hubenthal (1913, Ent. Bl. IX, p. 256) cite le vrai *Ch. spadicea* de Thuringe et de Dessau.“ — *pascoviensis* Reitt. Bei Jeannel l. c. auf Seite 50 heißt es: „En tout cas les citations, par G. Kraatz, de Darmstadt, de Halle, de Bautzen et d'Erlangen en Allemagne, se rapportent, certainement, au *Ch. pascoviensis*, comme en témoigne la description que cet auteur donne des trochanters postérieurs mâles de son espèce.“ Kraatz (Stett. Z. 1852, 399) spricht nur von einem ♂. Dieses ist sicher nach der Beschreibung zu *pascoviensis* zu ziehen. Da Kraatz seine *spadicea* mit der eigentümlichen braunroten Färbung der *pascoviensis* ausstattet, dürfen wir annehmen, daß auch alle seine ♀ zu letzterer gehören, also auch das Stück von Halle, welches Kraatz nicht besitzt. Es war vermutlich in Habelmanns Sammlung. In Sammlung Kraatz ist keine *spadicea* Strm. vorhanden (Hbthl.). — Die *Choleva* in Kellners Sammlung: Kellners *angustata* F. und *intermedia* Krtz. sind dieselbe Art, nämlich: *oblonga* Latr. ♂♀. Kellners 12 Stücke der *cisteloides* Fröl. sind: 1 *sturmi* ♂, 4 *cisteloides* ♂♀, 7 *angustata* F. Jeannel ♂♀. — *sturmi* Bris. Erfurt: Steiger. VI. (Maab). Bufe, Pfarrgarten, vermutlich in Maulwurfsgängen. V. IX. (Hbthl.). — *angustata* F. Jeannel. Erfurt: Steiger. VI. Stotternheim. V. je 1 St. (Ms). Stedten. VI. 1 St. (Rapp). Blankenburg. VIII. 1 ♀ (Hbthl.). — *glauca* Britten Jeannel, Laucha a. Unstrut, mehrfach in Dahlem (coll. Schenkling). Naumburg a. Saale. Alte Saale. VII. (von Dr. Staudinger erhalten). — *bicolor* Jeannel. Sachsenburg. 22. V. 1917 1 ♂ geschöpft (Hbthl.).

*Colan brunneum* Latr. a. *nigriceps* Reitt. Fahner Höhe. IX. 1 St. (Hbthl.).

*Necrophorus humator* Gze. Rotgelb. 1 St. aus Thüringen, wahrscheinlich von Neuhaus bei Sonneberg (Bauer). — *interruptus* Steph. a. *centrimaculatus* Rtt. Göttingen (Soc. Ent. XXXII, Nr. 2, S. 9).

*Silpha carinata* Hbst. In Thüringen kommt die von Herbst beschriebene Form nicht vor, sondern nur v. *austriaca* Otto (Hbthl.).

*Ablattaria laevigata* F. v. *meridionalis* Gglb. Sachsenburg. V. 1 St. (Hbthl.).

*Liodes calcarata* Er. a. *nigrescens* Fleisch. hat für v. *picta* Rehe. einzutreten (III. Ergänzung D. E. Z. 1908, 39).

*Ptilium caesum* Er. Mühlberg, aus abgemähem Schilf geklopft. 7. IV. 1923. 1 St. (Liebmann).

*Hydraena testacea* Curt. Erfurt, Brühler Hohlweg. 29. IV. 1900. 2 St. (Maaß). Wandersleben. 2. IX. 1906. 1 St. (Rapp). — *longior* Rey. Wandersleben. 21. VI. 1900. Häufig (Maaß). (Pretner mit ? det.; die Stücke sind etwas rauher skulptiert als solche aus dem Süden.) Auch von Rapp daselbst am 13. V. 1907 und 2. IX. 1906 je ein Stück gefunden (Hubenthal det.). Schon von Schilsky aus Mitteldeutschland angegeben.

*Hydrobius fuscipes* L. v. *subrotundatus* Stph. Töpfler Teiche bei Gotha. III. 3 St. (Hbthl.).

*Cantharis livida* L. a. *subrufipes* Bauer (Ent. Blätt. 1914, 57). Plauen im Vogtlande. 1 St. (Bauer).

*Necrobia rufipes* Deg. v. *pilifera* Rtt. Eisleben. VII. 1912 (Kühlhorn, Ent. Blätt. 1924, 22).

*Byturus fumatus* F. a. *bicolor* Rtt. Gotha, Krahnberg. VI. 2 St. (Hbthl.).

*Epuraea neglecta* Hr. a. *convergens* Rtt. Friedrichroda. 1 St. (Grave).

*Meligethes viridescens* v. *auratus* Bauer (Ent. Blätt. 1914, 56) gehört nach der jetzt in meiner Sammlung befindlichen Type zu *aeneus* F. als Aberration. Damit wird die dort gegebene Zusammenstellung von Färbungsabweichungen des *viridescens* wertlos.

*Omosita discoidea* F. a. *cincta* Hr. 1 St. bezettelt: Thüringen, in meiner Sammlung; von mir gefunden (Hbthl.).

*Silvanus mercator* Fauv. Mit einer Sendung Bablah (indischer Akazienschoten) in Arnstadt importiert. 1922. 1 St. (Liebmann).

*Laemophloeus turcicus* Grouv. Buflieben, Pfarrwohnung. VIII. 1920. 2 St. (Hbthl.).

*Henoticus serratus* Gyll. Frankenwald, Harra a. d. Saale. VII. 1916 (Uhmänn, Ent. Blätt. 1924, 57) ist wieder zu streichen (Uhmänn, Ent. Blätt. 1925, 80).

*Cryptophagus silesiacus* Gglb. Frankenwald, Harra a. d. Saale. VII. 1916. 1 ♀ (Heymes det.) (Uhmänn, Ent. Blätt. 1925, 80).

*Atomaria atra* Hbst. ist für Thüringen zu streichen. Kellners Stücke sind meist *analis*, 1 *apicalis*, 1 *ruficornis*, 1 *gutta* v. *rhenana*. Die echte *atra* kenne ich nur durch Schilsky und Künne-  
mann (cf. IV. Ergänzung D. E. Z. 1908, 267, welche danach zu berichtigen ist).

*Stilbus atomarius* L. v. *sulcatus* Grh. Gotha. 1 St. (Hbthl.).

*Enicmus transversus* Oliv. v. *alutaceus* Rtt. Gotha, Berggarten.  
23. I. 1918. 1 St. (Hbthl.).

*Mycetophagus 4-pustulatus* L. a. *ruficollis* Schils. Erfurt, Stotternheim. VIII. 1 St. (Frank.).

*Cis fissicollis* Mell. Schmücke. 1 ♂, 1 ♀ (Heymes). —  
*dentatus* Mell. Seeburg, am Süßen See. 14. IV. 1914. 2 St.  
(in Sammlung Fiedler). — *punctulatus* Gyll. Arnstadt. 11. XII.  
1921. 1 St. (Liebmann).

*Pycnomerus inaepectus* Duv. Sachsenburg. 6. VI. 1903. 1 St.  
(Maaß).

*Anisosticta 19-punctata* L. a. *thoracica* Wse. Jena. IX. (Frank.).

*Adalia bipunctata* L. a. *simoni* Wse. Bufleben. 1 St. (Hbthl.).

*Coccinella 7-punctata* L. a. *externepunctata* Wse. Grimmenthal.  
VI. 1 St. (Fiedler). — *distincta* Fald. a. *magnifica* Rdtb. und  
a. *domiduca* Wse. Gr. Seeburg, Nordseite, auf Kiefern n. s.  
(Heymes).

*Micraspis 16-punctata* L. a. *flavidula* Wse. Saalfeld. VIII.  
(Maaß). Links oben Flecken fehlend, rechts normal gefärbt.

*Anatis ocellata* L. a. *linnei* Wse. Gr. Seeburg. VII. 1 St.  
(Hbthl.). Erfurt, Steiger. V. (Maaß).

*Myrrha 18-guttata* L. a. *ornata* Hbst. Fahner Höhe. VII.  
1 St. (Hbthl.).

*Microcara testacea* L. a. *luteicornis* Rtt. Stotternheim. VII.  
1 St. (Hbthl.).

Bei *Trogoderma*: gen.? sp.? Arnstadt. 2. IX. 1914. 2 St.,  
importiert (Liebmann).

*Byrrhus fasciatus* Forst. a. *fabricii* Rtt. Thür. W., Gabel.  
VI. 1 St. (Hbthl.).

*Syncalyptra paleata* Er. Siebleber Teich, Genist. III. 1913.  
1 St. (Hbthl.).

*Agriotes gallicus* Lac. a. *atacinus* Buys. Erfurt, Sömmerda.  
VII. VIII. (Maaß). — *sobrinus* Ksw. v. *integricollis* Rtt. Grimmenthal.  
20. V. 1906. 1 St. (Fiedler).

*Cardiophorus atramentarius* Er. Gispersleben. 10. V. 1905.  
1 St. (Rapp).

*Elatér pomonae* Steph. Friedrichroda. 1 St. (Grave).

*Denticollis linearis* L. a. *variabilis* Deg. Gotha, Krahnberg.  
VI. 1 St. (Hbthl.).

*Agrilus elongatus* Hbst. a. *pragensis* Obenbg. Erfurt, L. W. VII. (Frank).

*Trachys problematica* Obenbg. Stotternheim. 30. VIII. 1898. 1 ♂ (Maaß).

*Niptus unicolor* Pill. a. *salinus* Schill. Gotha, im Haus (Hbthl.).

*Hedobia imperialis* L. a. *interrupta* Pic. Erfurt, Dreienbrunnen. VI. (Frank).

*Dryophilus pusillus* Gyll. a. *semipallidus* Pic. Sachsenburg. VI. einzeln (Maaß).

*Ernobius mulsanti* Ksw. (XIII. Ergänzung D. E. Z. 1922, 71) ist zu streichen. Das Stück ist ein dunkler *abietis* (Hbthl.).

*Sitodrepa panicea* L. a. *ireos* Rey. Gotha. 1 St. (Hbthl.).

*Anoncodes adusta* Pz. Für Thüringen von Zebe angeführt (nach Seidlitz, Ins. D. V. 2, pag. 807).

*Anthicus humilis* Grm. a. *peranxius* Rey. Stotternheim, Numburg, Salzboden. V. (Hbthl.). — *gracilis* Pz. a. *subobliteratus* Pic. Eisleben, Seeburg. III. (Feige). — *luteicornis* Schm. Suhl, gestreift. 21. VI. 1922. 1 St. (Fiedler). — *nectarinus* a. *maltae* Pic. Eisleben. VII. (Eggers, in meiner Sammlung).

*Anaspis flava* L. v. *thoracica* Em. Altenburg (Mehrhardt). 1 St. (ex coll. Grave).

*Alphitobius piceus* Oliv. Gotha, in Reis, an den Füßen beschädigt, tot gefunden. XI. 1924. 1 St. (Heymes).

*Rhamnusium bicolor* Schrk. a. *atripenne* Bed. Flgd. grünlich schwarz (mit hellerer Schulter = a. *humerales* Bed.), mit einfarbig rotgelben Fühlern. Jena, Mühlthal. 8. VII. 1892. 1 St. (Hbthl.). — *gracilicorne* Théry. Thüringen, 2 Stück in coll. Noeske-Blasewitz. Eisleben. 1 St. (ex coll. Grave). Diese Form wird im Katalog *Aurivillius* (Katalog Junk-Schenkling) als Art angeführt. Die Dicke der Fühler scheint aber variabel zu sein.

*Oxymirus cursor* L. a. *niger* Ltn. Bei Schnepfenthal. VI. 1 St. (Sammlung Gerbing). — a. *nigricollis* Ltn. Waltershausen, Tenneberg. VI. 1 St. (Sammlung Gerbing).

*Stenochorus quercus* Gtz. a. *scutellaris* Krtz. Sachsenburg. VI. (Maaß).

*Acmaeops marginata* F. a. *spadicea* Schls. Auch bei der Sachsenburg. 17. VI. 1906. 1 St. (Maaß).

*Gaurotes virginea* L. a. *violacea* Deg. Schnepfenthal, Friedrichroda. VI. einzeln (Gerbing's Sammlung).

*Cortodera femorata* F. a. *suturifera* Rtt. Sachsenburg. V. 2 St. (Maaß).

*Leptura rubra* L. a. *maculiceps* Gabr. Thür. Wald. n. s. — *maculata* Pod. a. *sinuata* F. Sachsenburg. V. VII. einzeln (Maaß). — *bifasciata* Müll. a. *immaculata* Pic. Sachsenburg. VI. 1 St. (Hbthl.).

*Phymatodes testaceus* L. a. *rufipes* Cost. Erfurt, Stadt. VI. VII. mehrfach (M a a ß).

*Plagionotus arcuatus* L. a. *reichei* Thms. Sachsenburg. VI. 3 St. (M a a ß).

*Morimus funereus* Mls. Erfurt, Steiger. VII. 1914. 1 St. (Hillmann). In der Sammlung des Thüringer Naturwissenschaftlichen Heimatmuseums in Erfurt. Schon von Strübing für Erfurt angegeben, aber später bezweifelt (Rapp).

*Coptocephala unifasciata* Scop. a. *4-maculata* Lac. Sachsenburg. VIII. 3 St. (M a a ß).

*Cryptocephalus coryli* L. a. *benoiti* Pic. Bahndamm nach Seebergen. VI. 1 St. Sachsenburg. VI. 1 St. (Hbthl.). — *aureolus* Sffr. a. *discolor* Grh. Zwischen Georgenthal und Tambach. VI. 1 St. (Hbthl.). — *sericeus* a. *purpurascens* Wse. Bahndamm nach Seebergen. VII. 3 St. Arnstadt. 1 St. (Hbthl.). — *crustula* Duf. a. *rugulipennis* Sffr. Erfurt, Steiger. VI. 1 St. (M a a ß). Saalfeld. VI. 1 St. (M a a ß). — *crustula* a. *auratus* Grh. Gotha. 1 St. Bahndamm nach Seebergen. VI. VII. 2 St. (Hbthl.). — *labiatus* L. a. *ocularis* Hdn. Gr. Seeberg. VII. 1 St. (Hbthl.).

*Pachybrachys hieroglyphicus* Laich. a. *ictericus* Wse. Alperstedt, Wandersleben, Dietendorf. VII. VIII. (M a a ß).

*Chrysomela hyperici* Frst. a. *ambigua* Wse. Rothenstein, Sachsenburg. VI. (M a a ß).

*Phytodecta 5-punctatus* F. a. *melanopterus* Pen. Inselsberg. VI. 1 St. (Gerbing's Sammlung).

*Phaedon grammicus* ist in Kellners Sammlung von ihm selbst zu *cochleariae* F. gezogen.

*Chalcoides plutus* Latr. a. *foudrasi* Wse. Eisleben, Lüttchendorf. 7. II. 1912 an *Salix* (Feige, Ent. Bl. 1924, 24).

*Psylliodes chrysocephala* v. *anglica* F. Fahner Höhe, an *Brassica Napus*. 7. VIII. 1922 (Heymes). — *thlaspis* Fdr. kann für Thüringen nicht bezweifelt werden. Das einzige Stück der Sammlung Kellners entspricht genau den Beschreibungen (cf. Reitter, F. G. IV, 206) (Hbthl.). — *fusciformis* Ill. ist für Thüringen zu streichen. Die Stücke der Sammlung Kellners sind *cuprea* v. *isatidis* Hktgr. Kellner hatte den Namen mit Fragezeichen versehen (Hbthl.).

*Haltica brevicollis* Fdr. a. *azurescens* Wse. Gr. Seeberg, Siebeler Teich. V. (Hbthl.).

*Longitarsus apicalis* Beck. a. *4-maculatus* Wse. Seeberg, Kalkboden, mit der Stammform. 1. IX. 1917. 1 St. Ein sehr auffälliger Fundort für diese Art, die sonst nur in feuchten Tälern des Thür. Waldes lebt, aber allerdings von Kellner auch ähnlich gefunden wurde, was wir früher bezweifelten. *Suturellus* Dft. hat

eine ähnliche Verbreitung (Hbthl.). — Kellners *pratensis* All. sind helle *atricillus* L. Sonst sind die Verwandten des *melanocephalus* in Kellners Sammlung richtig. Auch die Verwandten des *luridus* sind richtig (cf. D. E. Z. 1908, p. 50, Zeile 12). — *suturrellus* v. *testis* Kolbe. Thür. Wald, Freibach. V. (Hbthl.). — *rubiginosus* v. *profugus* Wse. Fahner Höhe. IX. 1 St. Sachsenburg. IX. 1 St. (Hbthl.).

*Dibolia femoralis* Rdtb. v. *aurichalcea* Först. Erfurt, Brühler Hohlweg. 17. VII. 1897 mehrfach (Maaß).

*Cassida sanguinosa* Sffr. v. *viridissima* Rtt. Sättelstädt (Jänner). Friedrichroda (Grave). — *panzeri* Weise. Grimmenthal. 5. VI. 1921. 1 St., später 1923 noch ein Stück daselbst; beide Male nicht auf Lappa (Fiedler). Alperstedt, sumpfige Wiese, gekötschert, keine Lappa. 14. V. 1925. 2 St. (Hbthl.).

*Caryoboris curvipes* Latr. Erfurt. 27. VII. 1913. Erfurt (Schröder) (in coll. Maaß, daselbst als *bactris*, von mir nach einem von Künnemann erhaltenen Stück als obige Art bestimmt; *bactris* ist viel kleiner).

*Laria atomaria* L. a. *fuscipes* Rey Schilsky. Erfurt, Steiger. VI. (Maaß). — *rufimana* Boh. v. *velutina* Mls. Erfurt. 25. I. 1908. n. s. (Maaß).

*Acanthoscelides* sp. (als *andreae* von Hartmann-Fahrnau det., den es aber nicht gibt). Erfurt, Acacia arabica, aus Nordafrika. 1 St., in Benarys Gärtnerei; im Museum in Erfurt (Schröder). — *lallemani* Mrs. wie voriger. 1 St. (Schröder).

*Pachymerus ornatus* Fahrs? (oder nov. sp.). Erfurt, Benarys Gärtnerei, importiert, n. s. (Schröder).

*Polydrosus mollis* Str. a. *cupreus* Schils. Sachsenburg. V. (Maaß). — *confluens* Steph. a. *rubi* Stl. Gr. Seeberg, Struth. VII. 1 St. (Hbthl.).

*Sciaphilus asperatus* Bnsd. a. *lucidulus* Boh. Siebleben. III. 1894 (Riemann). Krahnberg. VI. (Hbthl.).

*Liophloeus tessulatus* Müll. a. *geminatus* Boh. Stotternheim. V. 1 St. (Rapp).

*Cotaster uncipes* Boh. Saalfeld. 19. VIII. 1902. 1 St. (Maaß). [Richtig. vidi (Hbthl.)]

*Pytonomus nigrirostris* F. v. *stierlini* Cap. Eisleben, Sittichenbach. 29. X. 1920 (Kühlhorn, Ent. Bl. 1924, 25). — *plantaginis* Deg. a. *aurolineatus* Brll. Erfurt, Haarberg, im Moos. III. 1 St. (Hbthl.).

*Notaris acridulus* L. v. *montanus* Trn. Freibach. 2. VI. 1907. 1 St. (Maaß).

*Cryptorrhynchus lapathi* L. a. *obsoletus* Rtt. Thüringen. 3. VI. 1898. Buch (? unleserlich) (Frank, in meiner Sammlung).



- Anthonomus rectirostris* L. a. *unicolor* Fst. Arnstadt (Jung).  
*Nanophyes marmoratus* Gze. v. *mülleri* Rtt. Stotternheim (Maaß).  
*Apion hookeri* Krb. a. *nigricans* Gerh. Seeberg, Bahndamm.  
 VII. 1 St. (Hbthl.). — *buddebergi* Bed. Fahner Höhe. 30. VII. 1901. 1 St. (Hbthl.). — *seniculus* Krb. v. *meieri* Debr. Friedrichroda, Dachsberg, Wachtwiese (Hbthl.). — *aestimatum* Fst. Meiningen. 8. VII. 1923. 1 St. (Fiedler). — *virens* Hbst. a. *coeleste* Schils. Bocksberg bei Gotha. IX. 1 St. (Hbthl.).  
*Diodyrhynchus austriacus* Oliv. a. *pallidicolor* Pic. Gr. Seeberg. V. 1 St. (Hbthl.).  
*Kissophagus hederæ* Schm. Erfurt, Glacis. 5. IV. 1913. 3 St. (Maaß).  
*Coccotrypes dactyliperda* F. a. *obscurus* Rey. Erfurt, Benarys Gärtnerei, s. h. in Dattelkernen (Schröder).  
*Trox hispidus* Lch. v. *insularis* Schnd. Wandersleben. IX. 2 St. (Hbthl.).  
*Aphodius lividus* Oliv. Erfurt, Drosselberg. V. 4 St. Jüchnitz. VI. 1 St. (Maaß). — *pusillus* Hbst. a. *rufulus* Muls. Eisleben, Unterrißdorf, Kuhmist. 10. IX. 1916 (Feige, Ent. Blätt. 1924, 25). — *maculatus* Strm. a. *fasciatus* Trr. Thür. Wald (Jänner). — *luridus* F. a. *gagates* Müll. Eisleben, Helfta. 1. V. 1912. Wormsleben. 29. IV. 1916 (Feige, Ent. Blätt. 1924, 26).  
*Melolontha melolontha* L. m. *colpopygæ* Petz. Gotha. 1 St. (Riemer). Bufeleben. 1 St. (Hbthl.).  
 In meiner XIII. Ergänzung (D. E. Z. 1922, 75) muß es am Schlusse heißen: *Hoplia subnuda*.  
*Gnorimus nobilis* L. a. *rubrocupreus* Mls. Gotha, Galberg. VI. (Gundermann).  
*Trichius fasciatus* L. v. *albohirtus* Rtt. Thüringen. 1 St. (von der Firma Dr. O. Staudinger erhalten).  
*Potosia cuprea* F. v. *obscura* And. Eisleben, Hausberg, Weißdorn. 24. V. 1920 (Kühlhorn, Ent. Blätt. 1924, 26).  
 In meiner Sammlung ist noch eine Anzahl von Varietäten von mir benannt worden. Diese sind nicht beschrieben und sollen nicht veröffentlicht werden. Leider sind die Kataloge und Bestimmungswerke nicht konsequent, sowohl was die Benennung der Aberrationen, als auch die Berücksichtigung der bereits benannten (z. B. bezüglich Mulsant, Letzner, Dalla Torre, Schilsky) betrifft. Dieser unwissenschaftliche Zustand scheint unüberwindbar. Im übrigen halte ich die Benennung von Farbenaberrationen in der Literatur für unnötig; wenn sie in der Beschreibung erwähnt würden, genügte dies.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1926

Band/Volume: [1926](#)

Autor(en)/Author(s): Hubenthal Wilhelm

Artikel/Article: [Ergänzungen zur Thüringer Käferfauna. 51-59](#)