

In der Czerna hora finden sich nun *orbicularis* und *Transsylvaniaicus* nicht selten, dazwischen aber auch Stücke, die der Körperform nach zu beiden gehören, ja die mit Sicherheit auch von *Carniolicus* nicht mehr zu unterscheiden sind.

Die Farbe der besprochenen Thiere ist durchweg ein Metallgrün und die zahlreichen Abänderungen bestehen darin, daß entweder gelb oder grün vorherrschend wird, oft mit starker Beimischung von roth und blau; ganz dunkle Stücke sind fast schwarz. Die Punktirung ist bei sämtlichen Arten dieselbe: Kopf u. Halschild sind nie dicht, sondern weitläufig punktirt, die Punkte bald feiner, bald stärker; die Flügeldecken zeigen eine mehr oder weniger grobe Punktirung, nach Suffrian in 9, nach Fuß, der die Punktreihe am äußersten Flügeldeckensaume noch mitzählt, in 10 ganz oder theilweise regelmässigen Reihen; auf der Unterseite endlich ist die Punktirung variabel, auf der Brust stärker, auf den Hinterleibsringen schwächer.

Die Larven des Käfers waren in den schlesischen und ungarischen Gebirgen Anfang Juli zahlreich an jedem schattigen Gebirgsbache anzutreffen, wo sie die Blätter von *Stellaria nemorum* ganz so zerfressen, wie die der Oreinen Blätter von *Mulgedium* etc.

In den Karpathen findet sich eine sehr ansehnliche Varietät, die wenigstens in der Czerna hora die häufigste zu sein scheint, entschieden aber die ausgezeichnetste mir bekannte ist; dieselbe würde sich kurz so charakterisiren lassen:

Var. *Carpathicus*: *Ovatus*, *brunneo-aeneus*, *antennis tarsisque laete rufis*, *thoracis lateribus subrectis*, *elytris prope basin latissimis*, *apice acuminatis*. — Long. 2 —  $2\frac{1}{2}$  lin.

J. Weise in Berlin.

---

#### A n h a n g.

Im Gemminger-Harold'schen Cataloge S. 3405 ist der *Phaedon orbicularis* Suffr. als Synonym des *pyritosus* Rossi aufgeführt, auf wessen Autorität weiß ich nicht; ich werde in Heft I. 1876. der Deutschen entomol. Zeitschrift nachweisen, daß im genannten Cataloge außer dem *orbicularis* Suffr. auch der *neglectus* Sahlb. falsch unter *pyritosus* Rossi citirt ist, ebenso *neglectus* Dej., *pyritosus* Duft. Dahl. — Der *pyritosus* Rossi ist = *pyritosus* Oliv. Suffr.

G. Kraatz.

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1875

Band/Volume: [19](#)

Autor(en)/Author(s): Kraatz Gustav

Artikel/Article: [Anhang. 366](#)