

Ricerche entomologiche sopra i monti Partenii nel Principato Ulteriore per Ach. Costa. Napoli 1858.

Berliner Entomologische Ztschr. 1873. p. 105 erwähnt Chaudoir in seiner Monographie der *Cymindis*-Arten, daß er das genannte Werk, worin Costa die *Cym. angustata* beschreibt, nicht kenne. —

Im Besitze dieser bibliographischen Seltenheit, kann ich über den Inhalt Auskunft geben.

Die Provinz Prin. Ult., mit der Hauptstadt Avellino im ehemaligen Königreich Neapel, liegt östlich von Neapel. —

p. 1—12 enthält eine Beschreibung des Landes etc. — p. 13—23 eine Aufzählung der dort gesammelten Insekten und von p. 25 an in Noten die Bemerkungen und Beschreibungen der neuen Arten.

#### *Coleoptera:*

p. 25. *Cymindis angustata* Costa. *Simile a primo aspetto all' omagrica, ma diverso pel corpo più angusto, le elitre più allungate, il protorace nel disco punteggiato poco men fortemente che presso i margini. Il colore nero; antenne, bocca, lembo del protorace, piedi, margine esterno dell' elitre (assai assottigliato verso dietro) e macchia omerale (breve ed un poco staccata dal margine) di color testaceo. Elytre piane, ad intervalli irregolarmente punteggiati, a punti un poco più stivati verso la base.*

p. 25. *Ragonycha angulatocollis* Costa. *Flavo livida, capite pronotoque flavo-fulvescentibus, illo postice nigro-castaneo, oculis nigris, pectore subfuscescente; pronoto subquadrato, basin versus paullum latiore, antice subrotundato, basi truncato, lateribus pone medium obtuse angulatis, angulis posticis subrectis. — Long. corp. 3¼ lin.*

Affine alla *R. translucida* Cast.

p. 25. *Malthodes cognatus* Costa. *Niger, nitidulus, parce brevissimeque pubescens, abdominis lateribus croceis, pedibus brunneis; pronoto latitudine paullum brevior, antice posticeque modice rotundato, basin versus parum angustato, lateribus subrectis, angulis anticis prominulis.*

Mas: *Segmento dorsali ultimo valde elongato, deorsum ver-*

gente, apice latiore triangulariter exciso, penultimo ventrali profunde emarginato, lobo utrinque subtriangularem ciliato, ultimum stylum tenuem, modice curvatum, profunde fissum ramis divergentibus, apicibus segmentum dorsalem ultimum amplectentibus exhibente (Fig. 1).

Affinissimo pe' colori al *M. spretus*; diverso per la forma e disposizione delle appendici sessuali del maschio.

p. 25. *Plinthus Parthenius* Costa. Oblongo-ovatus dense brunneo-cinnamomeo squamulosus, pronoti linea utrinque postica obliqua, elytrorum linea minuta laterali media, fascia postica irregulari subobsoleta, vittaque postica brevi silaceo-squamosis; fronte foveolata; rostro pronotoque carinatis, hoc punctato - scabro, elytris obsolete punctato-striatis, interstitiis alternis dorso obsoletissime, postice modice elevatioribus, granulis minutis denudatis nitidis conspersis. — Long. 5 lin. (absque rostro), lat. max. abd. lin. 2½.

Affine al *Pl. Megerlei* ed al *Finderlei* (*Findelii!*), ma assai ben distinto per gl' intervalli dell' elitre ben diversamente conformati.

Sul cacume della Tavola, fra le piccole erbe, raro. Settembre.

p. 26. *Otiorrhynchus rugulipennis* Costa. Oblongo-ovatus, ater, subnitidus, glaber, rostro tricarinato, carina media apice bifida; pronoto latitudine vix longiore, lateribus modice rotundatis, obtuse crebre granulato; elytris nitidioribus striato-punctatis, interstitiis irregulariter rugulosis, punctisque raris subseriatis; femoribus omnibus valde dentatis.

Affine al *rugosus*, precisamente per la struttura del protorace e dell' elitre; ne differisce pel rostro che è punteggiato e con tre delicate carene, di cui le laterali un poco convergenti verso la base, la media, che comincia men dietro, avanti l'estremità si divide in due ad angolo poco acuto; la fronte tra gli occhi à pochi grossi punti impressi. Antenne con gli articoli 3—7 del funicello più corti che larghi: i medii (4—6) quasi globosi.

Presso il Cenobio. Settembre.

#### Hymenoptera:

##### *Hylotoma discus* Costa.

Simile del tutto alla *Hyl. segmentaria*: diversa pel dorso dell' addome il quale offre nel mezzo uno spazio più o meno esteso giallo-spórco, di cui non si parla affatto dagli autori nella descrizione della *segmentaria*. Dalla *Hyl. ustulata* poi, della quale si potrebbe essere indotto a considerarla varietà, siccome pure Jurine dubitò per la *segmentaria*, distinguesi per le ali anteriori segnate

d'una striscia marginale apicale che occupa la cellola radiale: pel primo anello addominale dorsale occupato interamente dalla membrana bianca, che nella *ustulata* occupa soltanto un piccolo spazio triangolare: in fine per tutti gli anelli addominali finamente marginati di pallido. — Individui identici a questi de Montevergine avevamo raccolti sulla Majella.

p. 26. *Schizocera cognata* Costa. *Nigra, nitida, abdominis dorso croceo, segmento primo, et tertii fascia nigris, ultimo fusco; ventre flavo, ano nigro; pedibus luteis, coxis et femorum basi late nigris, posteriorum tibiis apice tarsisque fusco-piceis: alis fusco-fuliginoso-hyalinis, stigmatate venisque nigris.* — Long. corp. lin. 3, lat. alis exp. lin. 7. Un solo individuo femina. Luglio.

p. 26. *Allanthus costalis* Costa. *Niger, antennarum basi, clypeo, labro, palpis, pronoti lobis, maculis pectoris, scutello, et margine postico segmentorum abdominalium dorsalium 1°, 5°, 8°—9° integro, 6° et 7° interrupto, flavis; ventre flavo, ♂; nigro, segmentis postice anguste flavo-marginatis, ♀; pedibus flavis, posticorum femorum tibiisque latere postico tarsisque nigris, ♂; femorum omnium latere postico nigro, tarsis rufescentibus ♀; alis flavescenti-hyalinis, costa radio stigmatateque testaceis.* — Long. corp. 5—5½, lat. alis exp. 9—10 lin.

*Variat fronte macula inter antennis flava; mas tibiis mediis linea vel macula apicali nigra in latere postico; femina abdominis segmenti dorsalis tertii margine flavo interrupto: vel segmento sexto etiam flavo marginato.*

Non raro. Luglio.

p. 27. *Macrophya trochanterica* Costa. *Nigra, nitida, abdominis segmentis 3—6 lateribus postice anguste albido marginatis: pedibus anticis antice albido lineatis; posticis macula coxarum externa alba; trochanteribus pallidis, femoribus, summo excepto apice, tibiisque basi sanguineis, alis subfumato-hyalinis, venis stigmatateque nigris, fem.* — Long. 4 lin., exp. al. 9 lin. Tab. fig. 2.

Rarissima. Luglio.

p. 27. *Torimus igneiventris* Costa. *Viridi-cyaneus, violascens; abdomine igneo, antennarum scapo, mandibulisque testaceis; pedibus rufo-testaceis, coxis omnibus, femoribusque quatuor anterioribus viridibus, femoribus posticis incrassatis, dente valido ante apicem armatis; alis hyalinis puncto stigmatico obsoleto: terebra corpore longiore.* — Long. corp. 2½, tereb. 2¼ lin.

Rarissimo. Raccolto in agosto.

p. 27. *Sphex Parthenia* Costa. *Fusco-nigra, cinereo-pubes-cens, clypeo argenteo-sericeo-micante, mandibulis basi rufis; abdominis segmentis dorsalibus 2—7 brevissime holosericeo tomentosis, margine postico denudato nigro, nitido: segmentis ventralibus 2—7 ante marginem posticum transverse hispido pilosis; metanoto subtiliter coriaceo; alis cinereo-lutescente hyalinis, apice fumatis, cellula cubitali secunda parum latiore quam alta.* — Long. corp. 9, exp. alar.  $14\frac{1}{2}$  lin.

Rarissima. Un solo individuo raccolto dal sig. C. Beck, dal quale ci è stato comunicato.

p. 27. *Priocnemis consimilis* Costa. *Niger, abdominis segmentis primis tribus rufis, tertio postice fusco marginato: capite thoraceque subtilissime punctulato-coriaceis: metanoto postice irregulariter, lateribus transverse-rugoso, alis saturate fumato-hyalinis, venis fuscis.* ♀. — Long. corp. 5, exp. alar. 9 lin.

Priocnemibus fusco et coriaceo medius: ab illo alis totim aequae fumatis, et metanoto postice irregulariter rugoso: ab hoc capite thoraceque subtilissime coriaceis et foveolis frontalibus nullis facile dignoscendus.

Raro. Luglio.

p. 27. *Harpactes niger* Costa. *Gracilis, niger, nitidulus, tibiis tarsisque piceis, metanoti area cordata subtiliter oblique rugulosa, canaliculata, parte postica subpolita, nitida, punctata, linea media impressa; alis subfumato-hyalinis, cellula cubitali secunda antice parum angustata, tertia oblique rectangula.*

Rarissimo. Agosto.

p. 27. *Cerceris spreta* Costa. *Nigra parum nitida, cinereo fuscoque pilosa, mandibulis basi; facie superne triramose, mas: maculis tribus facialibus, femina: pronoti punctis duobus, abdominis fasciis dorsalibus in medio angustioribus 5, mas (in segm. 2—6) —4; fem. (in segm. 2—5), geniculis tibiis tarsisque flavis, tibiis posticis apice cum tarsis nigris, alis hyalinis, cellula radiali limboque apicali fumatis; fem.: clypei lobo medio lamina apicali brevi, antice angustiore, truncata, parum emarginata.* — Long. corp.  $4-4\frac{1}{2}$  lin.

Assai affine alla Cerc. 4-fasciata; però ne differisce principalmente pel lobo medio del clipeo della femmina diversamente formato.

Frequente Luglio, Agosto.



p. 28. *Vespa pilosella* Costa. *Nigra, longe cano-nigroque pilosa; macula frontali, linea ante- et post-orbitali clypeo (puncto vel lineola nigra), antennarum scapo antice, loborum pronoti margine superiore, scutelli maculis duabus, lineis duabus post scutelli, abdominis segmentis fascia marginali aequali, femoribus apice, tibiis tarsisque flavis, mandibulis pallidis margine nigro vel piceo; alis hyalinis, venis fusco-testaceis, tegulis nigro-piceis.* — Long. corp. 6, exp. alar.  $11\frac{1}{2}$  lin.

*Variat postscutello immaculato.*

I due sessi si somigliano in quanto a' colori. Le fasce gialle addominali nei primi quattro anelli sono anguste, appena un poco smarginate nel mezzo anteriormente, e con un punto nero da ciascun lato che si unisce al nero del fondo; negli anelli 5—6 (mas) 5—7 (fem.) sono più larghe, ed occupano quasi per intero l'anello. L'ano è anche giallo.

Rara. Luglio, Agosto.

p. 28. *Stelis sexsignata* Costa. *Nigra, capite thoraceque cum scutello inermi punctulatis, albido pilosellis; abdomine subnudo, dorso nitido subtilissime punctulato, segmentis tribus primis macula utrinque albido-flava notatis; tarsis anterioribus brunneo-piceis, posticis articulo primo incrassato; alis fumato-hyalinis, cellularum disco dilutiore.* — Long. corp.  $2\frac{3}{4}$ —3 lin.

Le macchie bianco-giallicce dell' addome nel primo anello sono minutissime puntiformi, ne' due seguenti sono un poco più grande e trasversalmente ovali. L'ultimo (sesto) anello addominale posteriormente è ritondato, col margine un poco rilevato.

Non molto rara. Luglio.

p. 28. *Prosopis cervicornis* Costa. *Nigra, facie usque ad antennarum insertionem, mandibulis (apice ferrugineo excepto) pronoti lineola angusta interrupta, tuberculis humeralibus puncto antico squamarum picearum, geniculis tibiis tarsisque albidis; tibiis mediis macula postica, posticis annulo subapicali incompleto nigris; alis fumato-hyalinis, stigmatibus venisque fuscis: antennis articulo primo lato transverse subquadrato, extus ultra flagelli insertionem oblique rotundato-producto, postice profunde transverse excavato, flavo, dimidio supero diagonaliter nigro, flagello fulvo, articulis duobus primis nigris, 3—6 in dorso fuscis.* — Long. corp.  $2\frac{1}{2}$  lin. Tab. fig. 6.

Affine alla *Pros. dilatata* Schem. ma ben distinta per la forma del primo articolo delle antenne assai diversa.

Rara. Luglio.

*Hemiptera:*

p. 29. *Berytus angustipennis* Costa. *Linearis*, antennarum articulo primo clavato, tertio secundo sexies longiore; elytris abdomen superantibus, angustissimis, linearibus, alis parum explicatis; femoribus clavatis; fulvus, antennarum articulo quarto nigro, apice rufescente, elytrorum membrana vitta fusca unica. Tab. fig. 7.

Diverso dal clavipes, 1° pel corpo proporzionalmente più allungato e più angusto; 2° per le antenne più lunghe, col secondo articolo entrante sei volte nella lunghezza del terzo (vi entra quattro sole volte nel clavipes); 3° per la lamina frontale che veduta di lato è troncata obliquamente d'avanti in dietro e da sopra in sotto, e quasi triangolare, ed al di sotto posteriormente separata dalla base del canale rostrale per una profonda scissura; 4° pel protorace il cui dorso è in uno stesso piano (nel clavipes si eleva posteriormente); 5° per l'elitre assai anguste con la porzione membranosa non più larga della coriacea. La forcipola del maschio è prolungata assai più che nel clavipes.

Rarissimo. Luglio.

Dr. L. v. Heyden.

---

 Termesztetrajzi Füzetek.

Das ungarische National-Museum giebt seit diesem Jahre eine Vierteljahresschrift unter dem Titel „Termesztetrajzi Füzetek“ (Naturhistorische Hefte) heraus, unter der Redaction von Otto Herman. Die Hauptarbeiten erscheinen in ungarischer oder lateinischer Sprache; am Schluß jedes Heftes werden unter dem Titel „Revue“, wie es p. 49 heisst, „Uebersetzungen oder Auszüge der im ungarischen Theile enthaltenen Arbeiten gegeben; minder wichtige Sachen werden blos angeführt. Die Arbeiten ausländischer Autoren erscheinen vollinhaltlich in der Revue und werden im ungarischen Theile auszugsweise mitgetheilt. Bei jedem Artikel der Revue wird auf die Seitenzahl des ungarischen Textes gewiesen.“ — Es ist dies eine lobenswerthe Einrichtung, die dieser neuen Zeitschrift nur zum Vortheil gereichen kann. Die meisten Arbeiten von E. v. Frivaldszky, wenn auch mit lateinischen Dignosen versehen, blieben dem nicht ungarischen entomologischen Publikum meist fremd, da alle andere Arbeiten ausschliesslich in dieser Sprache publicirt wurden.

Heft I. enthält p. 17 (Rev. p. 51) unter dem Titel *Coleoptera nova e Hungaria meridionale* eine Anzahl Beschreibungen

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1877

Band/Volume: [21\\_1877](#)

Autor(en)/Author(s): Heyden Lucas [Lukas] Friedrich Julius Dominicus von

Artikel/Article: [Ricerche entomologiche sopra i monti Partenii nel Principato Ulteriore per Ach. Costa. 423-428](#)