

[Deutsche Entomologische Zeitschrift XXI. 1877. Heft II.]

Beschreibungen einiger *Oedionychis*-Arten

von

E. v. Harold in Berlin.

Nachstehende Diagnosen einiger Arten der Gattung *Oedionychis* schicke ich einer monographischen Bearbeitung dieser Gruppe hiermit voraus.

*Oed. Kiesenwetteri*: Nitida, luteo-testacea, capite clypeo excepto nigro, thorace lateribus rotundatis, angulis anticis non mucronatis, elytris subtiliter punctulatis, apicem versus laevibus, basi et utriusque macula oblonga magna nigris; corpore subtus cum pedibus fusco-badio, abdominis apice et lateribus dilutioribus. — Long. 5—6 mill. Brasilia.

*Oed. generosa*: Dilatato-ovalis, nitida, rufo-testacea, elytris dense et sat fortiter punctatis, cyaneis, fasciis duabus sat angustis flavis, una subarcuata ante apicem, altera nonnihil ante medium, hac lateraliter per limbum usque circum humerum conducta; epipleuris antice concavis, omnino testaceis; corpore subtus cum pedibus rufo-testaceo, femoribus posticis apice nigris. — Long. 9 mill. Brasilia: Bahia.

*Oed. florigera*: Nigra, thorace testaceo, medio transversim nigro-signato, elytris testaceis, vario modo nigro- vel rufopiceo-signatis, plerumque basi, macula subhumerali affixa, fascia transversa media, lata, irregulari et apice ipso nigris vel rufo-piceis, interdum omnino fere piceis, maculis tunc 6 in circulum fere dispositis, 2 oblongis ad suturam ante medium, 2 marginalibus in medio, 2 majoribus apicalibus flavis. — Long. 6—7 mill. Brasilia.

*Oed. formosa*: Capite nigro, oculis flavo-marginatis, thorace flavo, nigro-fasciato, elytris subtiliter dense punctulatis, violaceis, vittis utriusque tribus angustis flavis, una subsuturali, una laterali, tertia marginali; epipleuris flavis, corpore subtus cum pedibus antennisque piceo. — Long. 9 mill. Montevideo.

*Oed. Fairmairei*: Capite nigro, thorace punctulato, flavo, transversim nigro-fasciato, elytris dense punctulatis, cyaneis vel cyaneo-viridibus, vitta marginali alteraque discoidali, circa humerum at non apice cum illa connexa, flavis; epipleuris flavis; corpore subtus cum pedibus aeneo-nigro, abdominis segmento ultimo utrinque flavo-maculato. — Long. 5,4 mill. Chili.

*Oed. magica*: Subnitida, rufo-testacea, vertice fusco-aeneo, elytris dense punctatis, macula communi oblonga scutellari et utrius-

## 434 E. v. Harold: Beschreibungen einiger Oedionychis-Arten.

que alteris tribus, una humerali, altera magna transversa pone medium, tertia apicali nigro-aeneis; epipleuris latissimis concavis; antennis filiformibus, articulo 2 minuto, 3 illo plus duplo longiore; metatarso postico articulis 2 sequentibus multo longiore. — Long. 7 mill.

Darjeeling. Propter antennarum structuram, metatarsi longitudinem et prosternum subdilatum planum, novum genus *Hypphasis* formans.

*Oed. coccinelloides*: Nigra, clypeo flavo, thorace margine laterali maculisque duabus basalibus mediis albido-testaceis, elytris testaceis, utriusque maculis duabus parvulis albidis, nigro-annulatis, una submarginali media, altera apicali. — Long. 6,5 mill. Brasilia.

*Oed. lativittis*: Capite nigro-aeneo, ad oculos flavo, thorace nigro, lateribus flavis, elytris fortiter punctatis, flavis, sutura late vittaque laterali, apice angustiore, nigro-viridiaeneis, corpore subtus cum pedibus piceo. — Long. 9 mill. Brasilia.

*Oed. sanguinipes*: Valde convexa, modice nitida, densissime punctata, capite, corpore subtus antennisque ferrugineis, pedibus rubris, thorace elytrisque flavis, his vitta utriusque discoidali, postice abbreviata, picea, humeris intus non sulcatis, epipleuris flavis. — Long. 7—8,5 mill. Brasilia.

*Oed. longula*: Oblonga, ferruginea, thorace flavo, obsolete punctato, ferrugineo-fasciato, elytris humeris intus non sulcatis, asperulato sat dense punctulatis, sutura vittaque discoidali fusco-ferrugineis; epipleuris flavis, intus ferrugineis; antennis fuscis, articulis 1—3 rufescentibus, 3 quarto dimidio brevioribus. — Long. 6,5 mill. California.

*Oed. Dejeani*: Nitida, rufa, thorace punctulato, elytris obscure viridi-aeneis, rufo-marginatis, dense punctulatis; corpore subtus cum pedibus rufo-piceo. — Long. 6,5 mill. Buenos-Aires.

*Oed. rustica*: Nitida, flava, capite postice piceo, elytris basi fasciaque ante medium, postice ad suturam emarginata, vitta marginali inter se connexis rufo-piceis; metasterno infuscato, antennis fuscis, articulo 1—3 testaceis, 3 quarto aequilongo. — Long. 5 mill. Bahia.

*Oed. lineola*: Capite piceo, thorace elytrisque flavis, illo macula media transversa, his sutura vittaque laterali piceis; humeris intus non sulcatis; elytris sat dense punctulatis, epipleuris flavis; corpore subtus cum pedibus, abdomine rufo-testaceo excepto, rufo-piceo. — Long. 8 mill. Montevideo, Corrientes.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1877

Band/Volume: [21\\_1877](#)

Autor(en)/Author(s): Harold Edgar Freiherr von

Artikel/Article: [Beschreibungen einiger Oedionychis-Arten 433-434](#)