

[Deutsche Entomologische Zeitschrift XXVII. 1883. Heft I.]

Neue *Zonabris* (*Mylabris* Ol.) aus Turkestan

mitgetheilt von

Dr. L. v. Heyden.

1. *Zonabris pullata* Heyd. *Elongata, nigra, griseo-hirsuta.* *Elytra puncto basali rotundato mediano, margines non attingente;* *fascia unica anteapicali in singulo elytro margines non attingente,* *antice non procul a sutura angulo producto, postice bisinuata, extus* *angustata signaturis flavis; capite rotundato, lucido, fortiter dense* *punctato, medio magis laevigato, linea parva mediana lucida elevata.* *Thorace (sicut capite) longe erecte griseo-nigro villoso, ovali,* *antice non angustato, punctato, medio magis laevigato, soveola minuta* *profunda postmediana instructo. Elytris pilis parvis griseis depre-* *satis, punctatis, transversim rugulosis, apice rotundatis. Antennis me-* *dium thoracis attingentibus, articulis quinque ultimis opacis, clavam* *formantibus, ultimo acuto. Femoribus tibiisque anticis intus flavo-* *pilosis, spinis tibiarum unguiculisque rufis. — Long. 14 mill.*

Samarkand.

*Z. variabilis* varietati a., Marseul (fasciis duabus angustis) affi-  
nis sed diversa fascia mediana deficiente, macula basali rotundata,  
sed non transversa, corpore angustiore, antennis brevibus clavifor-  
mibus, capite thoraceque magis punctatis.

2. *Z. sodalis* Heyd. *Minus elongata, nigro caerulea, macula*  
*basali elytri magna integra, prope scutellum interrupta, intra humer-*  
*rum dilatata et postice leviter sinuata; fascia mediana, antice si-*  
*nuata, postice bisinuata, interdum medio interrupta, suturam non*  
*attингente, fasciaque anteapicali, interdum interrupta, medianae si-*  
*mili-rubo-flavis. Capite, thorace longe nigro - griseo - villosis, dense*  
*sed non profunde punctatis, elytris pilis brevibus griseis depresso-*  
*ris antice nigris longe erectis intermixtis. Antennis longis, thoracem*  
*superantibus, nigris. Capite medio, thorace medio postice impressis.*  
*Elytris rugulosis, punctis impressis intermixtis. Pedibus nigro-cae-*  
*ruleis, anticis intus flavo-pilosis; spinis tibiarum rufis, unguiculis in-*  
*ternis rufis, externis nigris. Corpore subtus longe nigro-villoso. —*  
*Long. 12—13 mill. — Samarkand.*

*Z. Frovoli* Germ. (1824) et *intermediae* Fisch. affinis, sed fascia basali integra, semper callum humerale tecta, corpore antennisque brevioribus, diversa.

3. *Z. undecimnotata* Heyd. *Oblonga, nigra, nigro-villosa;* *elytris brunneo-flavis, maculis (simil sumptis) 4. 3. 4. nigris, parvis, plus minusve rotundatis, 1 oblonga posthumerali, callum non attingente, 2 inter primam et suturam minore, 3 in medio elytri sed magis ad marginem remota, 4 in sutura communi antice angustissima, 5 et 6 anteapicalibus, inter se et marginem et suturam aequa distantibus, externa rotundata, interna intus leviter bisinuata; elytris parce griseo-depresso hirsutis. Capite transverso, lateribus sinuatis, genis rotundatis, medio depresso, parce leviter punctato, antennis nigris articulis quinque ultimis clavam formantibus, thoracis basin attingentibus. Thorace antrorsum e medio angustato, disperse non profunde punctato. Scutello nigro. Pedibus nigris, unguiculis rufis. Corpore subtus nigro-villoso. — Long. 10 mill.*

Samarkand.

Affinis *Z. crocatae* Pall., sed macula communi, antennis fortioribus, capite thoraceque latioribus, fortius punctatis et villosis, maculis minus regularibus diversa.

4. *Z. impedita* Heyd. *Magna, lata, nigra, capite thorace corpore subtus flavo-griseo villosis. Elytris rufis, macula basali inter callum et scutellum, maculis duabus rotundatis, externa majori, inter se et marginem et suturam aequa distantibus; fascia mediana suturam et marginem fere attingente, antice extus producta postice bisinuata; fascia altera anteapicali suturam et marginem attingente, antice medio bilacerata, postice a margine ad medium recta, dein fortiter antrorsum sinuata; apice ipso quadrangulari nigro; maculis faciisque nigris omnibus linea pallida cinctis (elytris simul sumptis punctis 2, 4, duae fasciae sequuntur). Capite transverso fortiter disperse punctato, medio rufo-foveolato. Antennis thoracis basin*

NB. In meinem Sibir. Catal. sind zu streichen *Gebleri* Heyd. (*Frolovi* Gebl.). — Gebler hat hier wohl einige Arten und wohl auch die später begründete *intermedia* Fisch. (nicht *media* wie es bei Kraatz Dtsche Ent. Ztschr. 1881. 327) vermengt. Das Gebler-sche Citat 1829. 164. gehört zu *Frolovi* Germ., ebenso wie *Heydeni* Kraatz i. l. (= *Frohlovi* Mars.). — Bei *intermedia* ist die Mittelbinde stets rund.

v. Heyden.

*attingentibus, non clavatis, articulis 7—10 aequalibus, ultimo e medio abrupte acuminato. Thorace lateribus a medio calloso postice et antice angustato, ut in capiti punctato, medio linea laevigata et foveola profunde impressa. Elytris perparce pilis nigris depresso instructis, opacis, rugulosis. Pedibus nigris longe griseo-villosis, tarsis ♂ intus rufis et spongiosis.* — Long. 9—19 mill.

Samarkand, multa exemplaria.

Variat elytris rufis

- a. fasciis linea longitudinali mediana inter se conjunctis (in exempl. typ.) 17 mill.
- b. fascia mediana in maculis duabus magnis medio divisa (in elytro dextro divisa, in elytro sinistro linea minutissima conjuncta) 19 mill.
- c. fasciis linea mediana longitudinali inter se conjunctis, ♀ (13 mill.) in copula cum:
- d. ut c. sed sutura postice nigra, ita ut pars dimidia postica elytri nigra, maculis tribus rufis 2, 1 ♂. (9 mill.)
- e. pars dim. post. elytr. nigra, macula luniformi mediana, macula medio strangulata, extus cum puncto rufo marginali triangulari linea angusta conjuncta. 13 mill.
- elytris flavis: f. ut e. 11½ mill.
- g. pars dim. post. elytr. nigra, macula magna lunari communi in sutura, macula anteapicali ad suturam, puncto minuto externo in margine flavis. (11 mill.)
- h. ut g. sed macula anteapicali a sutura usque ad marginem externam producta.
- i. ut typus sed elytris flavis. (10 mill.)

5. Species quam nomine *alienigenae* Heyd. i. l. designavi cum descriptione *Z. Marseuli* Ballion (non Kirsch) Bull. Mosc. 1878. 336. e Kuldsha convenit.

6. *Z. excisofasciata* Heyd. *Oblonga, nigra, nitida, nigro-hirta. Capite lato, fronte deplanata, laevigata, parce punctata, vertice convexo; antennis thoracis medium attingentibus, nigris, articulo tertio quarto duplo majore, quinque ultimis clavatis, ultimo apice acuminato. Thorace oblongo, antice angustato, laxe punctato, disco late laevigatissimo. Scutello nigro. Elytris sanguinolentis, fasciis tribus marginem non attingentibus, sutura fusca; fascia prima obliqua (e maculis duabus composita), antice leviter, postice profunde excisa suturam non attingente, fascia secunda mediana, medio*

*latissima et antice producta, ad suturam, quam attingit recta et in suturam prorecta, postice medio excisa, dein ad suturam recta, externe magis rotundata et fere ad marginem extremum extensa; fascia tertia, e punctis duobus composita, externo minore magis rotundato cum interiori majori triangulari conjuncta; apice ipso anguste nigro. Elytris punctatis et rugulosis, antice erecte villosis, a medio ad apicem pilis parvis nigris depresso. Pedibus nigris, tibiis anticis flavo-pilosis. Corpore subtilis lucido, evidenter punctato.* — Long. 11 mill.

Var.: *a.* fascia prima in medio fere divisa, suturam attingente et usque ad scutellum producta; in elytro sinistro fascia tertia maculis divisus. 1 Expl. in coll. Heyd.

*b.* fascia prima lata ad suturam et ad scutellum producta; fascia mediana cum tertia medio laciinis 2—3 conjuncta.

Samarkand. Nonnulla exemplaria.

*Z. sanguinolentae* Oliv. Egypti affinis, sed fasciis latis minus dilaceratis, marginem externum non attingentibus, fascia tertia non completa, corpore multo minus punctato, inde lucidore, diversa.

Aus Samarkand besitze ich ferner:

7. *Z. magnoguttata* Heyden. Von den Margelan-Stücken nicht verschieden, nur bei einem Ex. (10 mill. lang) sind die zwei sonst großen Flecke klein, aber sie bleiben immer noch viel größer als die andern. — Vier weitere Stücke sind entschieden größer (14 mill.), und bei einem ist der hinterste Punkt merkwürdigerweise der größte und quer, während der mittelste (von 2. 1. 1.), der sonst der größte und rund ist, hier ein quergestelltes Parallelogramm bildet.

8. *Z. Audouini* Mars. 4 Stück. Verglichen mit der Abbildung bei Marseul sind 3 St. entschieden roth und nur 1 gelb.

Var.: *a.* Die 2te „chevron“-Binde ist außen getheilt, wie bei meinem Margelan-Stücke.

*b.* Bei dem gelben Expl. sind die beiden chevron-Binden sehr scharf ausgeprägt und die 2te reicht bis zur Naht.

9. *Z. ocellata* Pallas. Scheint kaum in der Größe der Flecken zu variiren.

10. *Z. calida* Pall. var. *maculata* Oliv. (Die 2 Binden erreichen die Naht und Außenrand), 12—21 mill. lang.

11. *Z. Schrenkii* Gebl. 19—25 mill.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: [27\\_1883](#)

Autor(en)/Author(s): Heyden Lucas [Lukas] Friedrich Julius Dominicus von

Artikel/Article: [Neue Zonabris \(Mylabris OI.\) aus Turkestan 65-68](#)