## [Deutsche Entomologische Zeitschrift XXVII. 1883. Heft II.]

## Bestimmungs-Tabelle der Orina-Arten 1)

von

## J, W e i s e.

1.	Die 2 ersten Fühlerglieder wenigstens an der Spitze roth . 2.
-	Fühler durchaus einfarbig 12.
	Umschlag der Fld. breit. Seitenwulst des Halssch. breit,
۵.	hochgewölbt, innen durch einen regelmäßigen, geraden
	und sehr tiefen Eindruck abgesetzt. Fld. ohne Längs-
	binden, mit einem gewölbten, besonders in der vorderen
	Hälfte durch einen tiefen Eindruck begrenzten Wulste
	über dem Seitenrande; Zwischenräume geschuppt. Long.
	9—11.5 mill. Alpen
-	Umschlag der Fld. schmal. Seitenwulst des Halssch. flach.
	Fld. ohne merklichen Seitenwulst 3.
3.	Fld. überall grob darmartig gerunzelt. Seitenwulst des
	Halssch. der ganzen Länge nach breit abgesetzt, und
	sehr flach gedrückt. Fld. ohne Längsbinde, ihre Zwischen-
	räume polirt. Long. 7-11 mill. Sudeten, Karpathen,
	Alpen intricata Germ.
-	Fld. wenigstens im inneren Drittel punktirt, nach außen
	zu oft gerunzelt. Der Längseindruck, welcher den Seiten-
	wulst des Halssch. absetzt, besteht aus 2 Theilen, der
	hintere ist tiefer als der vordere, beide sind durch eine
	mehr oder weniger deutliche Erhebung dicht vor der Mitte
	getrennt
4.	Zwischenräume der Punkte auf den Fld. polirt 5.
-	" " " beschuppt 8.
5.	
	vereinigen. Long. 8.5—11 mill. Krain liturata Scop.
-	Fld. höchstens mit einer verwaschenen Längsbinde 6.
6.	
	sehr flach. Long. 7-10 mill. Schwarzwald, Thüringen,
	Sudeten, Karpathen alpestris Schummel.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Eine sichere Bestimmung ist nur mit Hilfe der Form des Penis möglich.

6.	Von denselben sind die hinteren tief und heben den Seiten-
	wulst scharf und deutlich empor 7.
7.	Punktirung der Fld. doppelt, fein. Körper flach. Long.
	8-11 mill. Centralalpen bifrons F.
_	
	Long. 8—11 mill. Bairische Alpen, Krain, Kodscha-
	Balkan pretiosa Suffr.
0	Halssch. fast gleichmäßig bis zum Seitenrande gewölbt,
0.	
	die 4 Eindrücke sehr flach. Long. 7—10 mill. Central-
	alpen viridis Duft.
-	Seitenwulst des Halssch. hinten deutlich emporgehoben . 9.
9.	[ ] [ ]
	drei meist deutlichen Doppelreihen von Punkten. Long.
	8-11 mill. Sudeten, Alpen decora Richter.
-	Fld. einfach punktirt 1) 10.
10.	Körper flach, einem Melasoma ähnlich. Eindrücke des
	flachen, fast viereckigen Halssch. zahlreich und grob
	punktirt. Die weitläufigen starken Punkte der Fld. ge-
٠	wöhnlich unregelmäßig gereiht. Fld. meist mit scharfer
	Naht- und Scheibenbinde. Long. 8-10 mill. Central-
	alpen vittigera Suffr.
-	Körper gewölbt. Punkte der Fld. ohne Spur von Reihen 11.
11.	Fld. mit je 2 rothen oder goldgelben Längsbinden, die
	sich meist vor der Spitze vereinigen. Long. 9-12 mill.
	Südlicher Abhang der Centralalpen superba Oliv.
-	Fld. außer der dunklen Naht, höchstens noch mit
	einer blauen Längsbinde. Long. 9-13 mill. Alpen,
	Pyrenäen gloriosa F.
12.	
	Fld. roth, rothbraun oder pechbraun
-	Körper metallisch blau oder grün gefärbt, oder rein schwarz,
	ohne rothe Beimischung 16.
13.	Halssch. gleichmäßig bis zum Seitenrande gewölbt, ohne
	Wulst. Körper sehr schlank. Long. 8-10 mill. Central-
	alpen melancholica Heer.
-	
	200000000000000000000000000000000000000

<sup>1)</sup> O. vittigera etc. haben zwar auch zwischen den Punkten hie und da einzelne Pünktchen, dieselben sind aber so fein, daß sie nur bei stärkerer Vergrößerung sichtbar werden und auf den Total-Eindruck der Art gar keine Wirkung ausüben.

14.	Oberseite glänzend. Halssch. schmal, mit schwach ge-
	rundeten Seiten. Körperform der O. alpestris. Fld. mit
	mehr oder weniger breiter, gemeinschaftlicher schwarzer
	Nahtbinde. Long. 8-10 mill. Karpathen . plagiata Suffr.
-	Oberseite ziemlich matt. Halssch. breit, mit stark ge-
	rundeten Seiten; Form des Seitenwulstes wie bei intricata 15.
15.	Körper breit, plump. Fld. fein und sehr dicht runzelig-
	punktirt, pechbraun, der Seitenrand und Umschlag roth.
	Long. 10-12 mill. Pyrenäen Ludovicae Muls.
_	Körper, besonders beim & schlank. Fld. roth, grob-gerun-
	zelt. Long. 9-11 mill. Centralalpen . melanocephala Duft.
16.	Halssch. gleichmäßig bis zum Seitenrande gewölbt 17.
_	" mit abgesetztem Seitenwulste 18.
17.	Fld. mit polirten Zwischenräumen. Long. 8 mill. Sudeten,
	Alpen virgulata Germ.
_	Fld. mit geschuppten Zwischenräumen. Long. 8-9 mill.
	Pyrenäen
18.	Fld. mit geschuppten Zwischenräumen. Long. 6-8.5 mill.
	Alpen elongata Suffr.
-	Fld. mit polirten Zwischenräumen 19.
19.	Fld. mit einer kupfrig rothen Längsbinde, die sich um
	die Innenseite des Schulterhöckers herumbiegt und den
	Grund jeder Fld. erreicht. Diese Binde ist gewöhnlich
	beiderseits von einer doppelten Punktreihe begrenzt. Long.
	6.5 — 8 mill. Westalpen elegans Arrag.
-	Fld. verworren punktirt, ohne oder mit einer beiderseits
	abgekürzten, meist blauen Längsbinde 20.
20.	Fühler kurz, von den Gliedern 5 bis 8 jedes nur wenig
	länger als breit. Halssch. und Fld. kräftig punktirt. Long.
	5-6.5 mill. Centralalpen frigida Weise.
-	Fühler schlank, Glied 5 bis 8 einzeln fast doppelt so lang
	als breit
21.	Körper verhältnissmässig schlank, Seitenwulst des Halssch.
	ganz oder theilweise grob punktirt. Punkte der Fld. durch
	scharfe Risse verbunden. Long. 8-11 mill. Gebirge
	Mitteleuropas cacaliae Schrank.
-	Körper meist kurz, nach hinten verbreitert. Seitenwulst
	des Halssch. fast glatt. Fld. einfach punktirt, selten die
	Punkte durch schwache Risse verbunden. Long. 7-10 mill.
	Gebirge Mitteleuropas speciosissima Scop.
	•

## ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: <u>Deutsche Entomologische Zeitschrift (Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung)</u>

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: 27 1883

Autor(en)/Author(s): Weise Julius

Artikel/Article: Bestimmungs- Tabelle der Orma-Arten 248-250