

Bestimmungs-Tabelle der *Orina*-Arten ¹⁾

von

J. W e i s e .

-
1. Die 2 ersten Fühlerglieder wenigstens an der Spitze roth 2.
 - Fühler durchaus einfarbig 12.
 2. Umschlag der Fld. breit. Seitenwulst des Halssch. breit, hochgewölbt, innen durch einen regelmässigen, geraden und sehr tiefen Eindruck abgesetzt. Fld. ohne Längsbinden, mit einem gewölbten, besonders in der vorderen Hälfte durch einen tiefen Eindruck begrenzten Wulste über dem Seitenrande; Zwischenräume geschuppt. Long. 9—11.5 mill. Alpen *luctuosa* Oliv.
 - Umschlag der Fld. schmal. Seitenwulst des Halssch. flach. Fld. ohne merklichen Seitenwulst 3.
 3. Fld. überall grob darmartig gerunzelt. Seitenwulst des Halssch. der ganzen Länge nach breit abgesetzt, und sehr flach gedrückt. Fld. ohne Längsbinde, ihre Zwischenräume polirt. Long. 7—11 mill. Sudeten, Karpathen, Alpen *intricata* Germ.
 - Fld. wenigstens im inneren Drittel punktirt, nach aufsen zu oft gerunzelt. Der Längseindruck, welcher den Seitenwulst des Halssch. absetzt, besteht aus 2 Theilen, der hintere ist tiefer als der vordere, beide sind durch eine mehr oder weniger deutliche Erhebung dicht vor der Mitte getrennt 4.
 4. Zwischenräume der Punkte auf den Fld. polirt 5.
 - " " " " " " " beschuppt 8.
 5. Fld. mit je 2 Längsbinden, die sich meist vor der Spitze vereinigen. Long. 8.5—11 mill. Krain . . . *liturata* Scop.
 - Fld. höchstens mit einer verwaschenen Längsbinde 6.
 6. Die den Seitenwulst des Halssch. absetzenden 4 Eindrücke sehr flach. Long. 7—10 mill. Schwarzwald, Thüringen, Sudeten, Karpathen *alpestris* Schummel.

¹⁾ Eine sichere Bestimmung ist nur mit Hilfe der Form des Penis möglich.

6. Von denselben sind die hinteren tief und heben den Seitenwulst scharf und deutlich empor 7.
7. Punktirung der Fld. doppelt, fein. Körper flach. Long. 8—11 mill. Centralalpen *bifrons* F.
- Punktirung der Fld. einfach, mäfsig stark. Körper gewölbt. Long. 8—11 mill. Bairische Alpen, Krain, Kodscha-Balkan *pretiosa* Suffr.
8. Halssch. fast gleichmäfsig bis zum Seitenrande gewölbt, die 4 Eindrücke sehr flach. Long. 7—10 mill. Centralalpen *viridis* Duft.
- Seitenwulst des Halssch. hinten deutlich emporgehoben . 9.
9. Fld. dicht doppelt punktirt, nach aufsen gerunzelt mit drei meist deutlichen Doppelreihen von Punkten. Long. 8—11 mill. Sudeten, Alpen *decora* Richter.
- Fld. einfach punktirt ¹⁾ 10.
10. Körper flach, einem *Melasoma* ähnlich. Eindrücke des flachen, fast viereckigen Halssch. zahlreich und grob punktirt. Die weitläufigen starken Punkte der Fld. gewöhnlich unregelmäfsig gereiht. Fld. meist mit scharfer Naht- und Scheibenbinde. Long. 8—10 mill. Centralalpen *vittigera* Suffr.
- Körper gewölbt. Punkte der Fld. ohne Spur von Reihen 11.
11. Fld. mit je 2 rothen oder goldgelben Längsbinden, die sich meist vor der Spitze vereinigen. Long. 9—12 mill. Südlicher Abhang der Centralalpen *superba* Oliv.
- Fld. aufser der dunklen Naht, höchstens noch mit einer blauen Längsbinde. Long. 9—13 mill. Alpen, Pyrenäen *gloriosa* F.
12. Körper nicht metallisch gefärbt, schwarz, Halssch. und Fld. roth, rothbraun oder pechbraun 13.
- Körper metallisch blau oder grün gefärbt, oder rein schwarz, ohne rothe Beimischung 16.
13. Halssch. gleichmäfsig bis zum Seitenrande gewölbt, ohne Wulst. Körper sehr schlank. Long. 8—10 mill. Centralalpen *melancholica* Heer.
- Halssch. mit deutlich abgesetztem Seitenwulste 14.

¹⁾ *O. vittigera* etc. haben zwar auch zwischen den Punkten hie und da einzelne Pünktchen, dieselben sind aber so fein, dafs sie nur bei stärkerer Vergröfserung sichtbar werden und auf den Total-Eindruck der Art gar keine Wirkung ausüben.

14. Oberseite glänzend. Halssch. schmal, mit schwach gerundeten Seiten. Körperform der *O. alpestris*. Fld. mit mehr oder weniger breiter, gemeinschaftlicher schwarzer Nahtbinde. Long. 8—10 mill. Karpathen . *plagiata* Suffr.
 - Oberseite ziemlich matt. Halssch. breit, mit stark gerundeten Seiten; Form des Seitenwulstes wie bei *intricata* 15.
15. Körper breit, plump. Fld. fein und sehr dicht runzelig-punktirt, pechbraun, der Seitenrand und Umschlag roth. Long. 10—12 mill. Pyrenäen *Ludovicae* Muls.
 - Körper, besonders beim ♂ schlank. Fld. roth, grob-gerunzelt. Long. 9—11 mill. Centralalpen . *melanocephala* Duft.
16. Halssch. gleichmäfsig bis zum Seitenrande gewölbt . . 17.
 - „ mit abgesetztem Seitenwulste 18.
17. Fld. mit polirten Zwischenräumen. Long. 8 mill. Sudeten, Alpen *virgulata* Germ.
 - Fld. mit geschuppten Zwischenräumen. Long. 8—9 mill. Pyrenäen *splendidula* Fairm.
18. Fld. mit geschuppten Zwischenräumen. Long. 6—8.5 mill. Alpen *elongata* Suffr.
 - Fld. mit polirten Zwischenräumen 19.
19. Fld. mit einer kupfrig rothen Längsbinde, die sich um die Innenseite des Schulterhöckers herumbiegt und den Grund jeder Fld. erreicht. Diese Binde ist gewöhnlich beiderseits von einer doppelten Punktreihe begrenzt. Long. 6.5—8 mill. Westalpen *elegans* Arrag.
 - Fld. verworren punktirt, ohne oder mit einer beiderseits abgekürzten, meist blauen Längsbinde 20.
20. Fühler kurz, von den Gliedern 5 bis 8 jedes nur wenig länger als breit. Halssch. und Fld. kräftig punktirt. Long. 5—6.5 mill. Centralalpen *frigida* Weise.
 - Fühler schlank, Glied 5 bis 8 einzeln fast doppelt so lang als breit 21.
21. Körper verhältnißmäfsig schlank, Seitenwulst des Halssch. ganz oder theilweise grob punktirt. Punkte der Fld. durch scharfe Risse verbunden. Long. 8—11 mill. Gebirge Mitteleuropas *cacaliae* Schrank.
 - Körper meist kurz, nach hinten verbreitert. Seitenwulst des Halssch. fast glatt. Fld. einfach punktirt, selten die Punkte durch schwache Risse verbunden. Long. 7—10 mill. Gebirge Mitteleuropas *speciosissima* Scop.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: [27_1883](#)

Autor(en)/Author(s): Weise Julius

Artikel/Article: [Bestimmungs- Tabelle der Orma-Arten 248-250](#)