©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Payk., *Lomechusa strumosa* F., *Calodera riparia* Er., *Megacronus formosus* Grav., *Medon dilutus* Er. Für die Rheinländischen Entomologen dürfte von besonderem Interesse sein, dafs *Donacia appendiculata* Ahr. im südlichen Theile von Holl.-Limburg (bei Nüth[1]) von Herrn Maurissen entdeckt) vorkommt; ferner dafs *Philonthus addendus* Sharp. bereits an zwei verschiedenen Punkten von Holland gefunden wurde (bei Breda [Nordbrabant] von Herrn Heylaerts und bei Blyenbeck [nördliches Limburg, unweit Cleve] von mir).

Der neue Katalog von Dr. Everts bedarf wohl kaum der Empfehlung bei Allen, die für die topographische Verbreitung der Europäischen Coleopteren und speciell für die Niederländische Käferfauna und deren Nachbargebiete sich interessiren.

E. Wasmann S. J.

---

[1]) 5 bis 6 Stunden von Aachen.

Melolontha hippocastani var. *Schwarzi* mihi.

Nigra, albo-pubescens, antennis fuscis, elytris testaceis, nigromarginatis, prothoracis rufi lateribus et basi nigris, pedibus nigris. — Long. 11 lin.

Die hier beschriebene Var. ist von Herrn Lehrer Schwarz in der Nähe von Fürstenberg i. M. in der Mark Brandenburg aufgefunden und gehört unzweifelhaft zu den selten vorkommenden Formen der *hippocastani* var. *nigripes* Com. Bei den braunbeinigen Stücken dieser Form ist der Thorax nicht selten zum Theil oder ganz röthlich (var. rex Dalla Torre); Ex. mit schwarzen Beinen und lebhaft rothem Discus des Thorax kommen aber nur selten vor. Ein solches ist *Schwarzi.* Westhoff besitzt Anklänge an seine *amasicola* (*thorace rufo*, *pedibus nigris*, Berl. Ent. Zeitschr. 1884, p. 68), welche noch gar nicht existirend nachgewiesen ist, denn Erichson citirt nur eine Var. der *nigripes* mit *prothoracis disco rufo;* dieses würde ungefähr unsere Form sein, aber sie befindet sich nicht auf dem Berliner Museum.

Werden erst gröfsere Mengen von Maikäfern sorgfältig untersucht, so werden wahrscheinlich auch noch mehr Ex. aufgefunden werden. Bei Fürstenberg fand sich die braunrothbeinige Form seltener als die schwarzbeinige. Bei dem beschriebenen Stücke ist auch die Mitte des Mesosternums rothbraun. Dr. G. Kraatz.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Deutsche Entomologische Zeitschrift (Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung)

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: 32_1888

Autor(en)/Author(s): Kraatz Gustav

Artikel/Article: Melolontha hippocastani var. Schwarzi mihi. 362