

Augenscheinlich bildet sich unsere Monstrosität unter dem Einflusse überreicher Feuchtigkeit aus, wie ich denn sämtliche Exemplare in nassen Jahren oder an sehr feuchten Stellen des Hochwaldes vorfand.

Ein einigermaßen entsprechender *Lusus*, gleichfalls als Produkt anhaltend feuchter Witterung, findet sich auch an *Reseda lutea* L. in der Innsbrucker Gegend, von wo ich dieselbe bereits in der Österr. bot. Zeitschrift 1881, p. 388 unter der Bezeichnung *Reseda lutea* L. b. *gracilis* Ten. (doch schwerlich mit Recht) erwähnte. An diesen Exemplaren entspringt aus jeder Blüte der Traube auf verlängertem Stiele ein zarter, trugdoldiger Blütenstand von 3—20 Blüten, wodurch die ganze Inflorescenz das Aussehen einer reichen, feinzerteilten Rispe erhält.

Linz, am 26. März 1896.

Einige neue Laubmoosstandorte aus Böhmen.

Von Dr. Ernst Bauer (Prag-Smichow).

Im Folgenden erlaube ich mir abermals einen kleinen floristischen Beitrag zur Moosflora Böhmens zu veröffentlichen. Allen, die mir durch Sammeln in verschiedenen Gegenden Böhmens behilflich waren, spreche ich meinen besten Dank aus.

Andreaea petrophila Ehrh. An Felsen und auf dürrem Boden, Schmiedeberg bei Weipert, c. fr. (Schauer)! — Var. *rupestris* Wallr. An sonnigen Felsen am Bärenstein bei Weipert, c. fr. (Schauer)!

Dicranella squarrosa (Starke) Sch. Im Wassergrunde am Pleil bei Weipert zwischen Niederholz, nicht häufig (Schauer)! — Rinnsale der Hornsprungwaldwiesen, 8 cm tiefe Rasen!

Dicranum undulatum Ehrh. Auf der Spitze des Knock (856 m) bei Lauterbach (Deschner)!

Dicranum scoparium Hedw. Weipert (Schauer)! — Zwischen Zinnwald und Geising (Wiesbaur)! — Var. *curvulum* Brid. Hornsprungwaldwiesen, c. fr.!

Fissidens incurvus Starke. Schwgr. Forma minor Limpr. Auf einem steilen Kalkfelsenhange bei Reichenau a. K., c. fr.!

Fissidens exilis Hedw. Bloss mit ♀ Blüten am Standorte des *F. incurvus* bei Reichenau!

Fissidens taxifolius (L.) Hedw. Hohlweg im Orte Reichenau a. K. auf lehmiger Erde und auf Steinen!

Ceratodon purpureus Brid. Felsen am Gipfel des Hausberges (712 m) bei Graslitz! — An Baumwurzeln, Schmiedeberg (Schauer)! — Doctorgassel bei Mariaschein, auf Gneiss am Knödelberg bei Mariaschein c. fr., Müglitz bei Ebersdorf, auf Gneiss am Geiersberg bei Hohenstein c. fr. (Wiesbaur)!

Barbula fallax Hedw. Auf Lehm Boden an der Waldstrasse von Reichenau a. K. zur Studanka c. fr.!

Tortula muralis (L.) Hedw. An Mauern in Hofberg, am Keilberge im Erzgebirge (Schauer)!

Tortula ruralis (L.) Ehrh. Felsspalten im Weiperter Grunde (Schauer)!

Schistidium apocarpum (L.) Br. eur. Auf Steinen im Kiefernwalde an der Luditzer Strasse bei Manetin, c. fr.! — Bahndamm im Bärensteiner Grunde bei Weipert, c. fr. (Schauer)!

- Schistidium gracile* (Schleich.) Limpr. An Baumstrünken (?) am Bärenstein bei Weipert, c. fr. (Schauer)! — Auf Felsen im Hornsbachthale bei Silbersgrün, c. fr.! — Auf Granit im Lobsbachthale zwischen Falkenau und Lauterbach, c. fr.!
- Coscinodon pulvinatus* (Hedw.) Spruce. Felsen am Gipfel des Hausberges bei Graslitz mit jungen Früchten, Juli 1891!
- Grimmia commutata* Hüben. An sonnigen Felsen am Bärensteine bei Weipert, c. fr. (Schauer)!
- Racomitrium canescens* Brid. Auf Thonschiefergeröll bei Bleistadt! — Var. *ericoides* Br. eur. An Felsen im Hornsbachthale bei Silbersgrün! — An Felsblöcken an der Neudeker Strasse bei Heinrichsgrün! — Felsen am Bärenstein bei Weipert (Schauer)! — Am Bahndamme daselbst (Schauer)! — Sehr schön, in bis 9 cm tiefen Rasen am Kohlschlag bei Oberbernau (Deschner)! — Auf blosser Erde und auf Steinen an Wegböschungen bei Silbersgrün verbreitet! — An Erdschlackenfeldern des Kammerbühls bei Eger im J. 1820 (Herb. Tempisky)!
- Hedwigia albicans* Lindb. Granitblöcke am Bahndamme bei Weipert (Schauer)! — Am Hausberggipfel bei Graslitz! — Auf Steinen im Tiergarten Heinrichsgrün! — Auf Granit im Lobsbachthale!
- Encalypta contorta* (Wulf.) Lindb. Zwischen *Hypnum molluscum* auf Kalkfelsen bei Reichenau a. K.!
- Georgia pellucida* (L.) Roth. Auf faulen Stämmen am Georgsberge bei Silbersgrün!
- Schistostega osmundacea* Mohr. Am Dillenberge bei Albenreuth unweit Eger (Buresch)!
- Funaria hygrometrica* Sibth. Bahndamm bei Weipert (Schauer)!
- Webera nutans* Hedw. An Baumwurzeln im Revier Schmiedeberg (Schauer)! — Var. *strangulata* (Nees) Schimp. An Baumwurzeln am Bärenstein bei Weipert (Schauer)!
- Bryum proliferum* (L.) Sibth. Mit *Mnium punctatum* an schattigen Bachufern im Revier Schmiedeberg bei Weipert (Schauer)! — Am Waldwege zwischen Lauterbach und Elbogen (Deschner)! — Zwischen *Mnium punctatum*, *Hypnum molluscum* u. A. auf Kalkfelsen bei Reichenau a. K., steril wie an den übrigen Standorten!
- Mnium undulatum* Neck. Inter alia auf Kalkfelsen bei Reichenau a. K.!
- Mnium cinclidioides* Blytt. Am Spitzbergmoore bei Gottesgab im Erzgebirge im Juni 1893!
- Mnium punctatum* Hedw. Quellgräben und nasse Wiesen im Hornsprungwalde bei Silbersgrün ♂ et c. fr.! — Inter alia auf Kalkfelsen bei Reichenau a. K.!
- Aulacomnium palustre* (L.) Schwgr. Nasse Wiesen bei Weipert (Schauer)!
- Oligotrichum incurvum* (Huds.) Lindb. Pleil bei Weipert, c. fr. (Schauer)!
- Pogonatum aloides* (Hedw.) P. de B. An Wegen Geiersburg bei Mariaschein, c. fr. (Wiesbaur)!
- Pogonatum urnigerum* (L.) P. de B. Kalvarienberg bei Mariaschein (Wiesbaur)! — Auf der Arsenhalde am Knödelberg bei Mariaschein, c. fr. (Wiesbaur)!
- Polytrichum piliferum* Schreb. Arsenhalde bei Mariaschein, c. fr. (Wiesbaur)! — Müglitz bei Ebersdorf, c. fr. (Wiesbaur)!
- Polytrichum juniperinum* Hedw. Eichwald bei Teplitz, Wanow bei Aussig, Fürstenau bei Zinnwald, Arsenhalde bei Mariaschein, c. fr. (Wiesbaur)! — Lichte Nadelholzwälder bei Schmiedeberg, c. fr. (Schauer)!

- Polytrichum strictum* Banks. Doctorgassel bei Mariaschein, c. fr., ad juniperinum vergens (Wiesbaur)!
- Polytrichum commune* L. Siebengiebel bei Zinnwald, c. fr. (Wiesbaur)! — Wiesen bei Kolling bei Lauterbach, inter sphagna!
- Diphyscium foliosum* (L.) Mohr. Wegböschungen zwischen dem Försterhause Silbersgrün und der Ruine.
- Leskea nervosa* Rbh. Mit sterilen Seten auf *Acer monspess.* Reichenau!
- Leskea polycarpa* Ehrh. Mauerritzen am Schlössel bei Weipert (Schauer)!
- Pylaisia polyantha* (Schreb.) Sch. An alten Weiden bei Klukowitz bei Prag, c. fr.! — Var. *homomalla* S. O. Lindb. contr. ad. fl. crypt. As. bor. or. An Fichtenrinde am Leitenbache bei Silbersgrün, steril (determ. Schiffaer)!
- Cylindrothecium concinnum* Schimp. Auf Kalkfelsen bei Reichenau an den Ausläufern des Adlergebirges steril! — Dasselbst auf lehmigem Waldboden am Fusswege zur „Studanka“ mit chlorot. Früchten! — Diese Standorte sind die ersten, welche aus dem Gebiete publiziert werden. Der an der Grenze nächstliegende, bisher bekannte Standort ist Waldmünchen in Baiern (Progel). Zweifellos kommt die Pflanze auch auf der böhmischen Lehne des Böhmerwaldes vor.
- Climacium daudroides* W. et M. Im Gestrüpp am Bahndamme zu Weipert (Schauer)! — Uferwiesen am Wolfsbache zu Bernau (Deschner)! — Bergwiese Hohenstein bei Mariaschein (Wiesbaur)!
- Isohecium myurum* Brid. Auf feuchten Granitfelsen auf der Erlwiese im Tiergarten Heinrichsgrün, steril!
- Brachythecium albicans* Br. et Sch. Zwischen Granittrümmern bei Neudek!
- Eurhynchium striatum* Br. et Sch. Am Bache unt. d. Forsthausr. Silbersgrün!
- Eurhynchium atrovirens* Klingg. Auf einem lehmigen Bahndamme bei dem Orte Hlubocep bei Prag, c. fr.!
- Plagiothecium denticulatum* Br. et Sch. Auf Wurzeln und Waldboden bei Schmiedeberg, c. fr. (Schauer)! — An faulen Strünken, Revier Pichelberg, c. fr.!
- Plagiothecium silvaticum* Br. et Sch. Schmiedeberg, an Bachrändern, steril (Schauer)!
- Plagiothecium undulatum* (L.) Br. et Sch. Fichtenwald bei der Station Moldau (Wiesbaur)!
- Amblystegium irriguum* (Wils.) Sch. An Steinen im Bache bei der Neuen Mühle bei Klukowitz bei Prag!
- Amblystegium serpens* (L.) Br. et Sch. Eine Form mit stark gezähnten Blättern an alten Mauern bei Schmiedeberg, c. fr. (Schauer)! — Auf Steinen unter Gebüsch bei der Ruine bei Silbersgrün, c. fr., mit *Ceratodon* und in reinen Rasen!
- Hypnum stellatum* Schreb. Sumpfwiese bei der Försterhausruine Silbersgrün (700 m)!
- Hypnum purum* L. An der Waldstrasse von Reichenau a. K. zur Studanka mit chlorot. Früchten!
- Hypnum mollusum* Hedw. Massenhaft mit *Hylocom. triquetrum*, *Mnium undulatum*, *Plagiochila*, *Hypnum purum* u. A. auch mit reifen Früchten an der Waldstrasse bei Reichenau auf Lehmboden, bedeckt daselbst auch in reichen Polstern die Kalkfelsenhänge, mitunter die schönen Fiederäste direkt dem Felsen anbreitend!
- Hypnum uncinatum* Hedw. Am Knödelberg und am Kesselteiche bei Mariaschein, c. fr. (Wiesbaur)!

- Hypnum fluitans* L. Hofberg am Keilberge (Schauer)!
- Hypnum cupressiforme* L. Var. *elatum* Br. et Sch. In schönen, weiten Poistern Kalkfelsen bedeckend bei Reichenau a. K.!
- Hypnum Lindbergii* Mitten. Mit *Blasia pusilla* auf Lehmboden unweit von der Ziegelei bei Zavist bei Prag!
- Hylocomium splendens* Br. et Sch. Mit Früchten: Schmiedeberg auf Waldboden und Baumstrünken (Schauer)! — Am Pleil bei Weipert (Schauer)! — Waldstrasse von Reichenau an d. K. zur Studanka!
- Hylocomium loreum* Br. et Sch. Wegränder im Hochwalde bei Weipert (Schauer)!
- Hylocomium triquetrum* Br. et Sch. Waldränder, Kolling bei der Bergstadt Lauterbach!

Beiträge zur Flora des Regnitzgebietes.

Zusammengestellt vom Botanischen Verein in Nürnberg.

VII. *)

4. *Thalictrum aquilegifolium* L. Erlengebüsch, Alfalter bei Hersbruck (Scherzer). Wandert im Pegnitzthal abwärts.
11. *Hepatica triloba* Gil. In der Windsheimer Gegend bei Scheinfeld, Baudenbach, Obersteinbach. Ferner auf dem Höhenzug rechts der Aisch zwischen Oberzenn und Westheim verbreitet. Sehr häufig auch um Sulzbürg bei Neumarkt. Dann Buchleiten bei Roth.
12. *Pulsatilla vulgaris* L. Gipsbrüche und Gräfholz bei Windsheim.
19. *Anemone ranunculoides* L. Im Keuper: Feuchter Wald bei Gsteinach.
54. *Ranunculus sceleratus* L. Strassengraben zwischen Sündersbühl und Grossreuth bei Nürnberg.
57. *Trollius europaeus* L. Feuchte Wiesen bei Grossweissmannsdorf und Wicklesgreuth (Keuper).
96. *Corydalis intermedia* P. M. E. Neuses im unteren Schwarzachthal. In Hecken bei Sulzbürg.
138. *Cardamine impatiens* L. Am Rednitzufer bei Roth (Honig).
145. *Dentaria enneaphyllos* L. Gebüschwald, Schlüpfelberg bei Sulzbürg und Appel bei Erasbach sehr zahlreich.
180. *Diplotaxis tenuifolia* DC. An einer Hecke bei Schoppershof (Riedner).
220. *Lepidium Draba* L. Am Bahnhof Stein. Bei Schwabach auf Schutt.
221. *L. campestre* R. Br. Im Keuper bei Fürth, am Bahnhof Stein und bei Henfenfeld. Auf Opalinuston am Rottenberg. Auf Äckern des weissen Jura bei Alfalter, Morsbrunner Plateau und Hinterhof bei Schnaittach.
269. *Reseda Luteola* L. Hohenstädter Geisskirche bei Eschenbach.
272. *Drosera intermedia* Hayne. An der Grenze des Gebiets bei Stegenthumbach in der Oberpfalz (Chr. Zahn)
326. *Sagina nodosa* Fenzl. scheint im Gebiete nur in der Form *pubescens* K. vorzukommen.
417. *Geranium sanguineum* L. Limbach bei Schwabach im Walde (Keuper).

*) VI. vergl. Seite 48 des Jahrg. 1894.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatschrift](#)

Jahr/Year: 1896

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Bauer Ernst

Artikel/Article: [Einige neue Laubmoosstandorte aus Böhmen 82-85](#)