

# Flora von Theerkeute im Kreise Czarnikau der Provinz Posen.

Von Adolf Strähler in Jauer, Schlesien.

(Fortsetzung von S. 167 der Nrn. 10. 11 d. Jahrgangs.)

## Amygdalaceen Juss.

*Amygdalus Persica* L. Angebaut.

*Prunus spinosa* L. Im Unterholz der Goraier Berge ziemlich verbreitet.

*Pr. insititia* L.

*Pr. domestica* L.

*Pr. cerasifera* Ehrh.

*Pr. avium* L. Laubholzbestände von Gorai, zerstreut.

*Pr. Cerasus* L. Die vorherrschend angebaute Art.

*Pr. Padus* L. Theerkeute, Goraier Berge, ziemlich verbreitet.

## Rosaceen Juss.

*Spiraea salicifolia* L. } In Gärten angepflanzt, bisweilen  
*Sp. opulifolia* L. } verwildert.

*Ulmaria pentapetala* Gilib. An Bachufern und Grasrainen bei Ciskowo, ziemlich häufig.

*U. Filipendula* A. Br. In den Goraier Bergen und bei Ciskowo, zerstreut.

*Geum urbanum* L. In Gebüsch bei Krucz, gemein.

*G. rivale* L. Auf Wiesen daselbst, zerstreut.

*G. urbano* × *rivale* G. Meyer. Auf Wiesen bei Wronke, selten.

*Rubus suberectus* Anderson. Kruczwald selten, in den Goraier Bergen zerstreut.

*R. fruticosus* L. Daselbst, Klempitzer Revier, zerstreut.

*R. Sprengelii* W. u. N. Sträucher am Wege nach den Blotten im Kruczwald, seltener.

*R. villicaulis* Koehler. Goraier Berge gegen die Dember Forstgrenze.

*R. dumetorum* W. u. N. = *nemorosus* Hayne. Revier Gorai, ziemlich verbreitet.

*R. caesius* L. Ebendasselbst und im Revier Kruczwald, verbreitet.

*R. Idaeus* L. An denselben Standorten, verbreitet.

*R. saxatilis* L. Revier Gorai, Ciszkowoer Anteil, Kruczwald, verbreitet.

*Fragaria vesca* L. Goraier Berge, gemein.

*Fr. moschata* Duchesne. Dasselbst, seltener.

*Fr. viridis* Duchesne. Dasselbst, zerstreut.

*Comarum palustre* L. An Gräben bei Theerkeute, meist nicht selten.

*Potentilla norvegica* L. Auf Beeten und im Grasgarten der Oberförsterei Theerkeute. Eine Form mit niederliegenden Stengeln, unteren eirunden Blättern wurde unter Gartenerdbeeren daselbst beobachtet.

*P. rupestris* L. Auf der Fischerinsel des Bialaer Sees, ziemlich zahlreich, aber einziger Standort.

*P. Anserina* L. Wege, Triften bei Krucz, Ciszkowo, gemein.

*P. canescens* Bess. = *inclinata* Autor. In üppigen Exemplaren auf Laubholzkulturen bei den „alten Teichen“ Revier Klempitz, selten.

*P. argentea* L. Bei Theerkeute, gemein.

*P. Wiemanniana* Guenth. = *P. Guentheri* Pohl. Lichte Stellen im Revier Theerkeute, zerstreut.

*P. reptans* L. Bialaer Seeufer, Theerkeute, ziemlich zahlreich.

*P. mixta* Nolte. An eben erwähnten Standorten, zerstreut.

*P. procumbens* Sibth. An Dienstäckern bei Theerkeute, zerstreut.

*P. silvestris* Neck. Ebendasselbst, zerstreut.

*P. procumbenti*  $\times$  *silvestris* Warnsdorf. Unter den Stammformen, selten.

*P. cinerea* Chaix. Auf Sandwegen und Gestellen in den Revieren Kruczwald, Hamrzysko, meist sehr zahlreich in grossen Rasen.

*P. opaca* L. Im Klempitzer Bruche und bei Gorai, häufig.

*P. cinerea*  $\times$  *opaca* = *incana*  $\times$  *opaca* Aschers. Im Klempitzer Bruche unter den Eltern, mit denen sie namentlich Blattform und Bekleidung teilt, ziemlich selten.

*P. alba* L. Auf Hauen des Nachbarreviers Samolecz zwischen Theerkeute und Wronke, ziemlich selten.

*P. cinerea*  $\times$  *argentea*. Auf den angebauten Bergen im Revier Rzecyn unter den Stammformen zerstreut in sehr ausgeprägter Form.

*Sanguisorba officinalis* L. Feuchte Wiesen bei Gorai, zerstreut.

*S. minor* Scop. Wiesen bei Kruczhauland, selten.

*Agrimonia Eupatoria* L. In den Goraier Bergen häufig, sonst selten.

*Rosa pimpinellifolia* L. In Gärten gezogen, so im herrschaftlichen Garten in Ciskowo.

*R. lucida* Ehrh. Desgleichen in Theerkeute.

*R. tomentosa* Sm.

forma *subglobosa* Baker. Kruczwald und Goraier Revier Ciskowoer Anteil, sehr zerstreut.

forma *cuspidata* Godet. Sträucher bei Ciskowo gegen die Czarnikauer Chaussee, zerstreut.

forma *cristata* Christ = *Andrzejowskii* Deségl. Sträucher an der Bruchwiese Revier Klempitz und an der alten Czarnikauer Strasse, zerstreut.

*R. rubiginosa* L. Klempitzer Bruch, Theerkeuter Blotte, sehr zerstreut.

*R. sepium* Thuill.

forma *typica*. Nur ein starker Strauch mit gleichförmiger Bestachelung, schmalen sehr langen und nackten Kelchzipfeln und kahler Inflorescenz im Revier Gorai gegen die Guhrener Grenze.

*R. canina* L.

forma *Lutetiana* Leman. Revier Gorai am Pianowker Wege, nicht selten.

forma *dumalis* Bechstein. Stark blau bereifte Form in den Goraier Bergen.

forma *biserrata* Baker. Ebendasselbst, selten.

*R. Reuteri* Godet.

forma *typica* Christ. Strauch auf den Pianowkoer Bergen nahe der Goraier Reviergrenze, selten.

forma *complicata* Christ. Strauch daselbst.

forma *subcanina* Christ. Strauch am Krucz-Ciskowoer Wege.

*R. dumetorum* Thuill.

forma *platyphylla* Christ. Sträucher in den Goraier Bergen ohnweit des Pflanzgartens und im Ciskowoer Anteil, zerstreut.

forma *Thuillieri* Christ. Sträucher in den Goraier Bergen am Wege vom Felde nach dem Hacklande, zerstreut.

(Fortsetzung folgt.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Straehler Adolf

Artikel/Article: [Flora von Theerkeute im Kreise Czarnikau der Provinz Posen. 183-185](#)