© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Die Flora von Meissen in Sachsen.

Von Apotheker Schlimpert in Cölln a. Elbe.

(Fortsetzung von S. 164 der No. 10. 11 d. Jahrg.)

Cynosurus cristatus L. An Rainen und Abhängen bei Polenz, Spittewitz, den Plossen und bei Zadel.

Bromus secalinus L. Auf Feldern unter Getreide häufig. B. racemosus L. Bei Niederau Weinböhla, Bohnitzsch, auf nassen Wiesen. B. mollis L. Gemein. B. arvensis L. Auf Sörnewitzer und Brockwitzer Fluren. B. asper Murr. Im Laubholz bei Scharfenberg, auf der römischen und deutschen Posel. B. erectus Hudson. Schlossberg in Scharfenberg, Weinbergsmauern von Crasso, selten. B. inermis Leys. Auf Weinbergsmauern, an der Eisenbahnbrücke bei Wahnitz (Schimpfky). B. sterilis L. Gemein. B. tectorum L. Gemein.

Brachypodium gracile Pal. B. Schieritzer Park und Seihlitzer Laubholz, an der Eisenbahnbrücke bei Wahnitz. (Schimpfky), am Bergschlösschen in Nossen. (Leonhardt.) B. pinnatum P. B. Anhöhe zwischen Daubnitz und Prositz. (Schimpfky), Rosswein bei der Schelze. (Leonhardt).

Triticum repens L. Gemein. T. caninum L. Gemein.

Elymus europaeus L. Bei Gauernitz und Constappel in Laubwaldungen. E. arenarius L. Auf Flugsand unterhalb der Niederwarthaer Brücke.

Hordeum murinum L. An Mauern gemein. H. nodosum L. H. Auf den feuchten Wiesen bei Niederau.

Lolium perenne L. Gemein auf Grasplätzen und Wegrändern. L. multiflorum Lmk. Verwildert, bei Nossen gebaut. (Leonhardt.) L. temulentum L. Unter Getreide nicht selten. L. remotum Schrk. Selten unter Flachs.

9. Fam. Cyperaceen.

Carex dioica L. Auf den nassen Wiesen an der Gohse und bei Zscheila. C. pulicaris L. Auf den Viehweiden bei Weinböhla. C. cyperoides L. An den Moritzburger und Dippeldorfer Teichen. C. disticha Huds. Bei Neusörnewitz, Zaschendorfer Graben, Prinzengrund. C. Schreberi Schk. Gemein auf der Posel und dem Spaargebirge, Nossen am Kirschberg. (Leonhardt.) C. brizoides L. In den schattigen Laubwaldungen von Siebeneichen, Tännichtgrund, Diebeskeller. C. vulpina L. An den Gräben der nassen Aue, bei Neusörnewitz, Oberauer Sumpfwiesen. C. nemorosa Rebnt.

Bei Moritzburg. C. muricata L. Gemein. C. teretiuscula Good. Im Zellwald. (Leonhardt.) C. paradoxa Willd. Im Zellwald. (Leonhardt.) C. paniculata L. An Gräben und Sümpfen gemein. C. stellulata Good. Auf den Sumpfwiesen bei der Mistschänke, Nossen bei der Schafbrücke. (Leonhardt.) C. leporina L. Auf sumpfigen Wiesen gemein. C. elongata L. Im Spitzgrunde am Bächelchen häufig. C. canescens L. Häufig. C. remota L. Bockwener Telle, Diebeskeller. C. acuta L. Zaschendorfer Graben, nasse Aue, an der Gohse. C. Goodenoughii Gay. Gemein. C. stricta Good. Gabelteich, nasse Aue, Zaschendorfer Graben. C. caespitosa L. Äusserst selten. C. Buxbaumii Wahlb. Weinböhla auf den Viehweiden am Grenzgraben und dem Pfeil'schen Teiche. C. limosa L. Neusörnewitzer Sümpfe, Dippelsdorfer Teiche. C. glauca Scop. Auf Wiesen und in Sümpfen gemein. C. pallescens L. Auf Waldwiesen gemein. C. panicea L. An der Gohse, nassen Aue. C. pilulifera L. Ziegenbusch, Schieritzer Park, oberhalb der Altenburg, hohen Eifer und Götterfelsen. C. tomentosa L. Bei Brockwitz. C. ericetorum Pollich. Rechts vor dem früheren Poselthore unterhalb des Nadelholzes, bei Oberau. C. montana L. Am Scheunenberg, Ziegenbusch, Schieritzer Park. C. praecox Jacq. Gemein. C. umbrosa Host. Weinböhlaer Grenzgraben. C. longifolia Host. Bei Zella im Muldenthale. (Leonhardt.) C. digitata L. Im Füllbusch bei Gauernitz, im Zellpark und bei Gersdorf. (Leonhardt.) C. humilis Leyss. Poselspitze und Abhang rechts. C. distans L. Nasse Aue. C. Hornschuchiana Hoppe. Nasse Aue. C. flava L. Auf nassen Wiesen häufig. C. Oederi Retz. An der Gohse. C. silvatica Huds. Bockwener Telle, Diebeskeller. C. Pseudo-Cyperus L. Zaschendorfer Graben, Moritzburger Schlossteich. C. ampullacea Good. Neusörnewitzer Sümpfe, Moritzburger Mittelteich, Zaschendorfer Graben. C. vesicaria L. Häufig in Sümpfen und an Gräben. C. paludosa Good. Häufig. C. riparia Curt. Häufig. C. filiformis L. Moritzburger Teiche. C. hirta L. Gemein.

Cyperus flavescens L. Steinbacher Torfwiesen, im Finkenfluge auf der Posel, bei Weinböhla. C. fuscus L. Zerstreut am Elbufer, am Röderufer bei Grossenhain, unweit Walda.

Rhynchospora alba Vahl. R. fusca R. et Sch. Beide auf den Steinbacher Torfwiesen.

Scirpus palustris L. An Teich- und Grabenrändern gemein. S. uniglumis L. In den Elblachen bei Zehren, nasse Aue. S. ovatus Roth. Bei Neusörnewitz, nasse Aue, Dippelsdorf und Moritzburg. S. pauciflorus Light. Nasse Aue, bei

Moritzburg. S. acicularis L. Elblachen bei Niedermuschütz. S. setaceus L. Im Bächelchen von Sebschütz nach dem Thale zur Schlemmerei mit J. bufonius zusammen. Moritzburg, Zellwald. (Leonhardt). S. lacustris L. Gemein im Schlamme kleiner Wässer. S. maritimus L. In den Elblachen oberhalb Kötitz und Niedermuschütz. S. silvaticus L. Gemein auf nassen Wiesen und Teichrändern. S. compressus Pers. Am Fürstengraben, im Prinzengrund, nasse Aue.

Eriophorum vaginatum L. Auf den Torfwiesen bei Steinbach. E. angustifolium Roth. Sumpfwiesen bei Naundörfel und Neusörnewitz. E. latifolium L. Steinbacher Torfwiesen, an der Gohse.

10. Fam. Juncaceen.

Juncus conglomeratus L. Gemein auf Sumpf- und Moorwiesen. J. effusus L. Sumpfwiesen hinter der Mistschenke. Dippelsdorf. J. glaucus Ehrh. Jahnathal, bei Wildberg, Schieritz. J. filiformis L. Auf torfigen, sumpfigen Wiesen bei Dippelsdorf, gemein bei Grossenhain. (Schimpfky). J. squarrosus L. Steinbacher Torfwiesen. J. compressus Jacq. An den Elbufern und bei Dippelsdorf. J. bufonius L. Gemein. J. supinus Mnch. Auf den Sumpfwiesen hinter der Mistschenke. J. articulatus L. Zwischen der Niederwarthaer Brücke und Kötzschenbroda, an der Gohse. J. silvaticus Reichardt. Selten auf Moorwiesen.

Luzula pilosa Willd. Posel, Gersdorfer Wald. L. albida D. C. Gemein in Wäldern u. Gebüschen. L. pallescens Bess. Zehren am Spitzhause, Anhöhe rechts b. Nossen. (Schimpfky). L. multiflora Lej. Auf Haiden und in Wäldern nicht selten, Nossen. (Leonh.)

11. Fam. Colchicaceen.

Colchicum autumnale L. Nasse Aue und Bohnitzscher Fluren massenhaft, gegenüber der Beyermühle. (Leonhardt).

12. Fam. Liliaceen.

Tulipa silvestris L. Im Weinberg am Roitzschberge, in Zscheila, in den Grasgärten am Fürstengraben.

Gagea lutea Schult. Niederwartha und Gletschthal, Elbwiesen. G. stenopetala Rb. Hohe Eifer, Nossen bei der Klostermühle. (Leonh.) G. minima Schult. Bei Sörnewitz, am Kalkberg. G. arvensis Schult. Zwischen Rehbock und Bockwener Telle. Auf sandigen Äckern nicht selten, Nossen, beim Lindigt. (Leonh.)

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Deutsche botanische Monatsschrift

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: 9

Autor(en)/Author(s): Schlimpert Alfred Moritz

Artikel/Article: Die Flora von Meissen in Sachsen. 186-188