

Zwei ältere Nachweise von Rallen- (*Ardeola ralloides*) und Seidenreiher (*Egretta garzetta*) in den Seemarschen Niedersachsens

Erwin Rudolf Scherner

Abstract: Notes on two scarce vagrant herons shot in Lower Saxony: c. 1903 a Squacco Heron (ad. breeding plumage) at Fischhausen (district of Friesland); on 26th October 1937 a Little Egret (♂, ad. non-breeding plumage) of Dorumer Neufeld (district of Cuxhaven).

Rallen- und Seidenreiher sind nahezu völlig auf die warmen Klimazonen beschränkt. Nur ausnahmsweise gelangen einzelne Tiere nach Niedersachsen. Dazu gehören zwei Exemplare, die im Staatlichen Museum für Naturkunde und Vorgeschichte in Oldenburg aufbewahrt werden.

Rallenreiher (Abb. 1): Ein Vermerk unter dem Sockel des Präparates weist aus, daß der Vogel Anfang des 20. Jahrhunderts bei Fischhausen (nordwestlich Hooksiel) erlegt wurde (heute Gemeinde Wangerland, Kreis Friesland). Schütze war der dortige Gutsbesitzer C. Reif. Zweifellos diesen Fall betreffen die folgenden, von F. REIF 1968 veröffentlichten Angaben in einem Bericht über Graureiher (*Ardea cinerea*): „Um 1903 schoß mein Vater einen gelben Reiher. Dieser war etwas kleiner als ein Fischreiher (Graureiher). Nach Aussagen einiger Seeoffiziere sind von ihnen solche Reiher am Nil beobachtet worden . . . Diesen ‚Gelben Reiher‘, ausgestopft, lange im Besitz meines Vaters, schenkte er an eine Schule in Jever.“ Für den Zeitraum bis 1975 sind aus Nordwestdeutschland mindestens 14-17 Nachweise von *Ardeola ralloides* bekannt, welche überwiegend den Dümmen und das Tiefland östlich der Weser betreffen (SCHERNER 1979). Mit dem Exemplar von Fischhausen ist erstmals ein Auftreten im Bereich der niedersächsischen Seemarschen belegt.

Seidenreiher (Abb. 2): Die Unterseite des Sockels trägt Stempel des Präparators Fritsche (Bremerhaven-Lehe) und einige handschriftliche Vermerke. Danach handelt es sich um ein ♂, das am 26. Oktober 1937 „im Dorumer Außendeich“, also im Deichvorland bei Dorumer Neufeld, erlegt wurde (Kreis Cuxhaven). Der Vogel gelangte zunächst in die Sammlung von Tiedemann (Dorum), der offenbar mehrere bei Dorum erbeutete Seltenheiten besaß, darunter einen später von RAUHE (1962-1964) erwähnten Löffler (*Platalea leucorodia*). In Wremen-Schottwarden (südwestlich Dorum) hatte Tiedemann bereits im Dezember 1936 (nicht 1963!) eine *Egretta garzetta* nachweisen können. Das beringte, dem Zoologischen Garten in London entwichene Tier war an einem Leitungsdraht verunglückt (RAUHE 1962-1964 und briefl.). Aufgrund eines Hinweises von Fritsche konnte BRUNS schon 1948 melden, daß sich der „Balg“ des 1937 „an der Weser nördlich Bremerhaven“ getöteten Seidenreiher im Staatlichen Museum Oldenburg befindet. Dennoch haben PANZER & RAUHE (1978) die Art in ihrer Monographie der Avifauna an Elb- und Wesermündung nicht berücksichtigt.





Abb. 1 (links): Adulter Rallenreiher (Brutkleid) aus dem Landkreis Friesland (Aufn.: M. Martens).

Abb. 2 (rechts): Adulter Seidenreiher (Ruhekleid) aus dem Landkreis Cuxhaven (Aufn.: M. Martens).

Schrifttum

- BRUNS, H. (1948): Ornithologisches aus dem Küstengebiet Niedersachsens. - Beitr. Naturk. Niedersachsens **1** (3): 23-25.
- PANZER, W., & H. RAUHE (1978): Die Vogelwelt an Elb- und Wesermündung. - Bremerhaven (Männer Morgenstern), 336 pp. (Sonderveröff. Männer Morgenstern 2).
- RAUHE, H. (1962-1964): Bemerkenswerte Ergänzungen zur „Vogelwelt zwischen Niederelbe und Wesermündung“. - Beitr. Naturk. Niedersachsens **15**: 41-50; **16**: 82-84; **17**: 38-42, 63-73, 90-99.
- REIF, F. (1968): Die Reiherkolonie in Fischhausen. Historien-Kalender 132, 1969: 41-44.
- SCHERNER, E. R. (1979): *Ardeola ralloides*. - In: F. GOETHE, H. HECKENROTH & H. SCHUMANN: Die Vögel Niedersachsens und des Landes Bremen. 1. Lfg. Hannover (Landesverwaltungsamt): 67 (Naturschutz Landschaftspflege Niedersachsen, Sonderr. B, 2.1, 1978).

Eingang des Manuskriptes: 16. Oktober 1981

Anschrift des Verfassers:

Dr. E. R. Scherner, Staatl. Museum für Naturkunde und Vorgeschichte, Damm 40-44, D-2900 Oldenburg.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Drosera](#)

Jahr/Year: 1981

Band/Volume: [1981](#)

Autor(en)/Author(s): Scherner Erwin Rudolf

Artikel/Article: [Zwei ältere Nachweise von Rallen- \(*Ardeola ralloides*\) und Seidenreihher \(*Egretta garzetta*\) in den Seemarschen Niedersachsens 55-56](#)