

# Entomofauna

ZEITSCHRIFT FÜR ENTOMOLOGIE

Band 15, Heft 6: 69-76

ISSN 0250-4413

Ansfelden, 1. Februar 1994

**A new species of *Platygaster* LATREILLE, 1809, from the  
Netherlands, Belgium, and Denmark.  
(Hymenoptera, Platygastriidae)**

**Peter Neerup BUHL**

### Abstract

A new species, *Platygaster striatithorax* sp. nov., from the Netherlands, Belgium, and Denmark is described. The paper is illustrated by 5 text-figures.

### Zusammenfassung

Eine neue Art, *Platygaster striatithorax* sp. nov., wird aus Holland, Belgien und Dänemark beschrieben. Die Arbeit ist mit 5 Abbildungen versehen.

### Introduction

During my examination of about 2.000 specimens belonging to the genus *Platygaster* sensu lato and collected in NW-Europe five specimens of the new species described below appeared.

*Platyaster striatithorax* sp. nov. (figs. 1-5)

♀: Head from above (fig. 1) twice as wide as long, slightly wider than thorax; occipital carina complete and strong; occiput with several strong longitudinal carinae; vertex strongly transversely striated between posterior ocelli, around anterior ocellus with reticulate sculpture; temples three-fourths the length of an eye; OOL:POL:LOL = 2:11:5. Head in lateral view (fig. 2) about 1.4 times as high as long. Head from front (fig. 3) about 1.3 times as wide as high with malar space half as long as an eye; frons strongly transversely striated; genae punctate, punctures spreading along inner orbits. Head almost bare except for a few hairs on genae and along mandibles. Antennae (fig. 4) with scape slightly sinuate, hardly shorter than height of head and about as long as the next five joints; pedicel one quarter the length of scape, almost three times as long as wide; first flagellar joint obviously shorter and thinner than pedicel, about twice as long as wide; second as long as first and a little thicker at apex; third shorter and thicker than second; fourth to seventh about equal, a little longer than wide. Length of pubescence about one-fifth the width of flagellar joints.

Thorax higher than wide, in dorsal view (fig. 1) rather blunt because of prominent pronotal shoulders; pronotum at sides (fig. 2) strongly punctured-striated; mesoscutum with complete notauli, strongly longitudinally striated, rather shiny except mid lobe anteriorly and almost bare; median plate of mesoscutum reaching base of scutellum; mesopleura shiny and with extensive striation; scutellum slightly convex, just above level of mesoscutum, margined at sides, rather densely punctured and hairy, hairs becoming longer towards apex; propodeum dorsally reticulated-shagreened and bare, smooth and shiny between the high and slightly diverging propodeal keels; metapleura and sides of propodeum covered with long pilosity.

Legs with no peculiarities. Fore wing (fig. 1) as long as meso- and metasoma combined, with yellowish tint and short marginal cilia; hind wing with two frenal hooks.

Metasoma somewhat shorter than head and mesosoma combined, a little wider than head; first tergite (fig. 1) with two longitudinal carinae, area between them smooth and lateral of carinae reticulated-shagreened with some long hairs; second tergite with deep basal foveae, striated to four-fifths of its length, sides and rest of tergites smooth; tergites 3-6 smooth except for some deeply implanted hairs, combined hardly as long as tergite 2. Sternite 1 and base of sternite 2 with long and dense hairs, rest of sternites with short hairs.

Colour blackish-metallic; scape medially, flagellar joints 2-8, all coxae, fore femora proximally, middle and hind femora entirely, and middle and hind tibiae distally dark brown; mandibles and rest of antennae and legs yellowish brown.

Length: 1.5 - 1.6 mm.

♂: Antennae (fig. 5) with second flagellar joint a little thicker than in ♀. Gaster more rounded at apex than in ♀. Rest of characters essentially as in ♀. Length: 1.5 mm.

Material examined: Holotype ♀, The Netherlands, Limburg, Epen, 23.V.1959, B. PETERSEN leg. Paratypes: 1 ♀, Belgium, Tervuren, 16.V.1959, B. PETERSEN leg.; 1 ♀, Denmark, NE-Zealand, Boserup Skov, 3.VI.1992; 1 ♂, same locality, 21.V.1993; 1 ♂, NE-Zealand, Jagerspris Nordskov, 15.V.1993; all P.N. BUHL leg. Both holotype and


paratypes are deposited in the collection of the Zoological Museum, University of Copenhagen.





The Danish specimens were swept in mixed woods.

In the paratypes tergite 2 is striated only a little more than two-thirds or three-fourths of its length.

*Platygaster striatithorax* is very characteristic. The species most similar to it are *P. aciculata* ASHMEAD, 1893, *P. cotei* KIEFFER, 1913, *P. eryngii* KIEFFER, 1916, and *P. ulmicola* KIEFFER, 1916. They differ from *P. striatithorax* most obvious in the following respects: *P. aciculata* (♂, cf. FOUTS 1924): Pedicel "longer and stouter than the first and second funicular joints together, the latter scarcely longer than thick, the following joints to the last transverse". Wings "clear hyaline, entirely devoid of pubescence". Second tergite only "with some striae at base". *P. cotei* (cf. KIEFFER 1926): This species is similar to *striatithorax* only in having extensive striation on tergite 2; its head lacks occipital carina, and its thorax is without striae. *P. eryngii* (cf. KIEFFER 1926): Head 3 times as wide as long; first flagellar joint in both ♂ and ♀ short, hardly longer than wide; second flagellar joint in ♀ much thickened, thicker than third; mesopleura smooth; second tergite without striae on a very narrow hind margin only. *P. ulmicola* (cf. KIEFFER 1926): Head at least 2.5 times as wide as long, frons smooth medially; mesopleura smooth; scutellum strongly convex; first tergite crenulated, second striated in less than basal third.

Figs. 1-5: *Platygaster striatithorax* sp. nov.: - 1) ♀, dorsal view; 2) ♀, lateral view; 3) ♀ head from front; 4) ♀ antenna; 5) ♂ antenna.





### Acknowledgements

I thank the Schjøtz-Christensen Memorial Fund, Aarhus, for financial support to this study.

### Literature

FOUTS, R.M. - 1924. Revision of the North American wasps of the subfamily Platygasterinae. - Proc. U.S. nat. Mus. 63 (15): 1-145.

KIEFFER, J.J. - 1926. Scelionidae. - Das Tierreich 48. Berlin and Leipzig. p.1-885.

Author's address:

Peter Neerup BUHL

Breslaugade 14, 1. -2

DK-2300 Copenhagen S.

Denmark

### Literaturbesprechung

TRYCKARE, T., CAGNER, E. (1993): Das große Buch des Angelns. - Jahr-Verlag, 419 S., über 2500 Illustrationen.

Aus unserer kleinen Rezensionsreihe "Was gibt es sonst noch außer Insekten" wollen wir heute unsere Leser mit der Besprechung eines Buches erfreuen, welches sich mit Süß- und Salzwasserfischen beschäftigt und die Insekten als Futtertiere in Form kunstvoll angefertigter "Fliegendummies" nebenbei erwähnt.

Es ist schon ein opulentes visuelles Vergnügen, einfach in diesem Buch zu blättern und die hervorragend gezeichneten Abbildungen der zahllosen Fische zu genießen. Dazwischen eingestreut wunderschöne Strichzeichnungen von Anglern an der Meeresküste, Stilleben mit Angelutensilien, Landschaftsskizzen, Unterwasserszenen und technischen Geräten, die in einer Kunstgalerie genauso gut aufgehoben wären wie in diesem Buch. Wohltuend kontrastierend zu dieser visuellen Pracht präsentiert sich ein dem Sach- und Fachbuch gerecht werdender Text, der an Nüchternheit, Sachkenntnis und Vollständigkeit kaum zu überbieten ist. Dieses Buch vermittelt alles Wissenswerte über die verschiedenen Angelmethoden im Fluß, See oder Meer und wendet sich damit in erster Linie an den Sportfischer. Detailliert wird über die Standplätze der verschiedenen Fischarten informiert, ihre Biologie und die Geräte zu ihrem Fang beschrieben. Sogar die Präparation von Fischen sowie Zeichnung mit japanischer Tusche wird dem Ichthyomanen nicht vorenthalten.

Man kann zu der Fischerei und insbesondere der Sportfischerei stehen, wie man will, das vorliegende Standardwerk setzt Maßstäbe und kann auch den Skeptiker für diese Art des Nahrungserwerbs begeistern.

M. CARL

KARG, W. (1993): Acari (Acarina), Milben. Parasitiformes (Anactinochaeta). Cohors Gamasina Leach. Raubmilben. In: Dahl, F., Die Tierwelt Deutschlands 59. Teil. - G. Fischer Verlag, 2. überarbeitete Aufl., 523 S., 437 Abb., 4 Tab.

Die Raubmilben der Cohors Gamasina fungieren in Ökosystemen als natürliche Regulatoren. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung eines integrierten Pflanzenschutzes und sie werden darüber hinaus als Indikatoren für Umwelteinflüsse genutzt. Die vorliegende Neubearbeitung umfaßt jetzt mehr als 1000 Raubmilbenarten. Aufgenommen wurden Arten eines Verbreitungsgebietes, das sich von der Ukraine bis nach Frankreich, von Schweden bis nach Ungarn erstreckt.

Der allgemeine Teil führt in die Morphologie, Biologie und Entwicklung ein. Den Schwerpunkt bildet der spezielle Teil mit seinen 26 Familien bzw. Unterfamilien und den Bestimmungsschlüsseln der Gattungen und über 1000 Arten. Alle diagnostisch wichtigen Merkmale werden abgebildet. Sämtliche verfügbaren Daten zur Lebensweise und zu den Umweltsprüchen der Art werden angegeben. M. CARL

NICOLAI, B. (1993): Atlas der Brutvögel Ostdeutschlands. - G. Fischer Verlag, 314 S., 249 Abb., davon 208 Punktrasterkarten.

Der vorliegende Atlas enthält die Ergebnisse der Brutvogelkartierung auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, die von mehr als 780 Mitarbeitern von 1978 bis 1982 durchgeführt wurde. Von über 200 Vogelarten werden genaue Raster-Verbreitungskarten gezeigt. Ein kurzer Text zu jeder Art informiert über Faunentyp, Status und Brutbestand einschließlich der aktuellen Bestandssituation vieler Arten bis 1990/91.

Der allgemeine Teil liefert neben der Beschreibung des Gebietes und der Methodik viele Informationen zur Struktur der Avifauna und zur Verwendung des Atlas. Auf der Grundlage der Ergebnisse erfolgt eine Bewertung der Brutvögel. Sie bietet unter anderem notwendige Basisinformationen für den praktischen Natur- und Artenschutz, eröffnet Möglichkeiten für die Einschätzung der Bedeutung von Lebensräumen, nicht zuletzt als wertvolle Hilfe für die Landschaftsplanung.

Noch weisen die östlichen Bundesländer den mit Abstand dichtesten Artenbestand aller westeuropäischer Industrieländer auf. Es ist zu hoffen, daß die "Kolonisierungsmaßnahmen" der westlichen Bundesländer im Osten nicht zu einer ähnlichen Habitatzerstörung wie im Westen führen. M. CARL

TISCHLER, W. (1993): Einführung in die Ökologie. 4. erweiterte Aufl. - G. Fischer Verlag, 528 S., 172 Abb.

Dieses völlig überarbeitete Lehrbuch macht mit den wichtigsten Grundlagen, Prinzipien, Fakten, Begriffen und Vorstellungen der Ökologie bekannt. Eine derartig geraffte und trotzdem verständliche Einführung in die Ökologie kann nicht alle Aspekte der vielfältigen Wechselbeziehungen der Individuen, Populationen und Ökosysteme mit ihrer belebten und unbelebten Umgebung erschöpfend behandeln. Sie beabsichtigt vielmehr, das Denken in Beziehungsgefügen zu fördern, und die Mannigfaltigkeit sowie Komplexität der Wechselwirkungen der Systemkomponenten aufzuzeigen. Anhand zahlreicher aktueller Beispiele aus der Praxis gelingt es dem Autor aufzuzeigen, daß Beobachtung und Analyse des Beobachteten wesentliche Faktoren für den Erkenntnisgewinn ökologischer Fragestellungen darstellen. Von einer zuverlässigen Analyse ökologischer Fragestellungen basierend

auf theoretisch erarbeiteten Modellen sind wir noch himmelweit entfernt, da diese zumeist nicht einmal näherungsweise der Realität entsprechen. Deshalb erläutert dieses Lehrbuch die theoretischen Grundlagen der Ökologie anhand zahlreicher praktischer Beispiele, die sich dank der Neubearbeitung an aktuellen Forschungsergebnissen orientieren. M. CARL

GLEDHILL, T. (et al) (1993): British Freshwater Crustacea Malacostraca: A Key with Ecological Notes. - Freshwater Biological Association, 173 S., zahlr. Strichzeichnungen.

Verglichen mit den Insekten sind die sogenannten "Höheren Krebse" in den mitteleuropäischen Süßwässern nur in bescheidener Artenzahl anzutreffen. Sie sind jedoch nahezu überall zu finden, sogar im ewigen Dunkel der Höhlengewässer. In Mitteleuropa gehören die Edelkrebse durch die Verschmutzung und Zerstörung ihrer Habitate zu den am stärksten gefährdeten Wasserbewohnern. Aus Großbritannien liegt nun ein Bestimmungsschlüssel für die Malacostraca vor, der auch einige der Arten enthält, die in unseren Gewässern zu finden sind. Weniger der Schlüssel als vielmehr der reiche Schatz an autökologischen Daten sowie das aktuelle Literaturverzeichnis machen das vorliegende Büchlein auch für den hiesigen Limnologen zu einer Fundgrube.

Im selben Verlag ist von J.M. ELLIOTT (et al) 1993 eine Bibliographie zur Sammelmethode der Benthos-Evertebraten erschienen. Die unter dem Titel "A new bibliography of samplers for freshwater benthic invertebrates" erhältliche Veröffentlichung ordnet die Zitate nach der Sammelmethode und den Namen der Autoren.

Außerdem liegt von D.T. CRISP (1992) mit "Measurement of stream water temperature and biological applications to salmonid fishes, grayling and dace" eine statistisch aufgearbeitete Methodensammlung zur Temperaturmessung in Fließgewässern vor. Besonderer Wert wurde auf die fischbiologische Relevanz von Temperaturmessungen gelegt. M. CARL

WESTRICH, P. (1990): Die Wildbienen Baden-Württembergs (2 Bände). - 2. Aufl., 972 S., 496 Farbfotos, 396 Verbreitungskarten - und

EBERT/RENNWALD (1991): Die Schmetterlinge Baden-Württembergs (Tagfalter I + II). - 1107 S., 870 Farbfotos, 331 Diagramme u. Zeichn., 143 Verbreitungskarten. - Ulmer Verlag, Stuttgart.

In beispielhafter Zusammenarbeit von Verlag, Autoren, LFU und Museum entstanden hervorragende Grundlagenwerke zu naturschutzfachlich überaus bedeutenden Insektengruppen. Umfang, Gliederung und Bildmaterial sind vorbildlich und lassen das Herz von jedem Ökologen höher schlagen. Dabei stehen Preis und Leistung in einmaliger Relation. Bleibt nur noch zu hoffen, daß schnellst möglich weitere Werke über wichtige Tiergruppen folgen oder andere Bundesländer zur Nachahmung animiert werden. R. ENGELSCHALL

---

Druck, Eigentümer, Herausgeber, Verleger und für den Inhalt verantwortlich: Maximilian Schwarz, Konsulent für Wissenschaft der O.Ö. Landesregierung, Eibenweg 6, A - 4052 Anselden.

Redaktion: Erich Diller, Münchenhausenstraße 21, D-81247 München 60.

Michael Hiermeier, Allacher Str. 273 d, D-80999 München.

Max Kühbandner, Marsstraße 8, D-85609 Aschheim.

Wolfgang Schacht, Scherrerstraße 8, D-82296 Schöngeising.

Erika Schamhop, Werner-Friedmann-Bogen 10, D-80993 München 40

Thomas Witt, Tengstraße 33, D-80796 München 40.

Postadresse: Entomofauna, Münchenhausenstraße 21, D-81247 München 60.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomofauna](#)

Jahr/Year: 1994

Band/Volume: [0015](#)

Autor(en)/Author(s): Buhl Peter Neerup

Artikel/Article: [A new species of \*Platygaster\* LATREILLE, 1809, from the Netherlands, Belgium, and Denmark. \(Hymenoptera, Platygasteridae\). 69-74](#)