

Coleopterologische Sammelreise nach Dalmatien, Bosnien und Herzegovina.

Vortrag, gehalten am 4. und 18. Oktober 1927 im Wiener
Coleopterologen-Verein.

Von Adolf Hoffmann, Wien.

(Fortsetzung)

Amara nitida Sturm. Visocica 2 Exemplare.

curta Dej. Velez, Visocica, Cvrstnica ziemlich häufig.

aenea Deg. überall gemein.

famelica Zimm. Trescavica 2 Exemplare.

eurynota Panz. Sarajevo, Gacko, Bilek häufig.

familiaris Duft. Nevesinje, Velez ziemlich häufig.

lucida Duft. Nevesinje, Cvrstnica je 1 Exemplar.

Quenseli Schh. Bjelasnica, Trescavica, Vran, Cvrstnica
ziemlich häufig.

bifrons Gyll. Illidze, Visocica, Velez häufig.

praetermissa Sahlb. Kojnica, Velez, Cvrstnica.

dalmatina Dej. Spalato, Bilek, Mostarsko Blato je ein
Exemplar.

montana Dej. Salona, Dugopolje je 1 Exemplar.

apricaria Payk. Salona, Bilek, Gacko, Mostarsko Blato
einzeln.

aulica Panz. Jablanica, Bilek, Gacko häufig.

Zabrus incrassatus Germ. Salona, Labin, Dugopolje, Kotlenice,
Gacko häufig.

Myas chalybaeus Dej. Velez, Bilek, Gacko, Hum ziemlich häufig.

Pterostichus Koyi Germ. Nevesinje, Bilek, Gacko häufig.

lepidus Leske. Bosna und Narenta häufig.

cupreus L. Bosna, Narenta, Mostarsko Blato gemein.

cupreus a. *affinis* Sturm mit der nom. f. ebenso häufig.

coerulescens Linn. Trebevic, Jablanica, Cvrstnica häufig.

cursorius Dej, Mostarsko Blato häufig.

puncticollis Dej. Mostarsko Blato 4 Exemplare.

vernalis Panz. überall mehr weniger häufig.

vernalis v. *cursor* Dej. Salona, Mostarsko Blato vereinzelt.

macer Marsh. Mostarsko Blato 4 Exemplare.

aterrimus Hbst. Mostarsko Blato 2 Exemplare.

elongatus Duft. Bosna-Quellen, Mostarsko Blato je ein
Exemplar.

oblongopunctatus Fab. Bjelasnica 2 Exemplare.
nigrita Fab. Mostarsko Blato sehr häufig.
anthracinus Illig am Ufer der Narenta bei Kojnica und Jablanica häufig.
gracilis Dej. Mostarsko Blato und Kojnica je 1 Expl.
minor Gyll. Salona, Mostarsko Blato ziemlich häufig.
interstinctus Sturm. Gacko, Mostarsko Blato vereinzelt.
strenuus Panz. Bosna, Nevesinje ziemlich häufig.
dilligens Sturm. Trescavica, Visocica je 1 Exemplar.
brevis Duft. Bjelasnica, Trescavica, Velez, Cvrstnica häufig.
unctulatus Duft. Bjelasnica, Trescavica, Visocica häufig.
melas s. *depressus*. Salona, Labin, Dugopolje häufig.
metallicus Fab. Bjelasnica, Velez, Cvrstnica, Vran häufig.
Brucki Schaum. Bjelasnica, Trescavica, Visocica je ein Exemplar.

Reiseri Ggbl. Bjelasnica, Trescavica, Visocica vereinzelt. *)
variolatus v. *carniolicus* Ggbl. Bjelasnica, Trescavica. *)

Abax ovalis Duft. Trebevic, Bjelasnica, Trescavica je 1 Exemplar.

Molops bosnicus Ggbl. Bjelasnica, Trescavica sehr häufig.
simplex Chaud. Trebevic 1 Exemplar, Vran mehrere.
alpestris Dej. Bjelasnica, Trescavica, Visocica häufig.
alpestris a. *rubripes* Ggbl. mit der nom. f. weniger häufig.

obtusangulus Ggbl. Gacko, Velez ziemlich häufig.
obtusangulus v. *hybridus* Apfb. Bilek, Cvrstnica ziemlich häufig.

obtusangulus bilekensis Apfb. Umgebung Bilek häufig.
obtusangulus a. *narentinus* Apfb. Cvrstnica, Vran häufig.
promissus Heyd. Mosor 2 Exemplare.

piceus Panz. Bjelasnica, Trescavica, Visocica häufig.
piceus v. *mostarensis* Apfb. Cvrstnica ziemlich häufig.
montenegrinus s. *ivalis* Apfb. Trebevic 1 Exemplar.

Omphreus Beckianus Ggbl. Bjelasnica, Trescavica 2 Exemplare.
Apfelbecki ? ? s. *plassensis* Apfb. Cvrstnica 3 Exempl.

Platyderus rufus Duft. Trebevic, Bjelasnica je 1 Exemplar.

Calathus circumseptus Germ. Salona, Mostarsko Blato je 1 Expl.
bosnicus Ggbl. Bjelasnica, Trescavica gemein.
fuscipes Goeze. Bjelasnica, Trebevic sehr häufig.

*) In den früheren Jahren hatte ich diese beiden Arten bei minder trockenen Verhältnissen, stets in Anzahl gefangen.

fuscipes s. *latus* Serv. Salona, Labin, Dugopolje, Kotlenice sehr häufig.

erratus Sahlb. Nevesinje, Gacko häufig.

metallicus Dej. Bjelasnica, Trescavica sehr häufig.

mollis Marsh. Salona, Mostarsko Blato häufig.

melanocephalus Linn. überall häufig.

melanocephalus v. *noricus* Dan. Bjelasnica, Trescavica häufig.

Laemostenus dalmatinus Dej. Salona, Bilek je 1 Exemplar.

elongatus v. *robustus* Schauf. Mosorgebirge 1 Exempl.

cavicola s. *Ganglbaueri* Apfb. Cvrstnica vereinzelt unter Steinen, Vran planina in kleinen Höhlen.

cavicola v. *nivalis* Apfb. Bjelasnica in einer Schneeschlucht 1 Exemplar.

cavicola s. *modestus* Schauf. Höhlen bei Labin häufig.

cavicola s. *Aeacus* Mill. Höhlen des Mosorgebirges vereinzelt.

Olisthopus glabricollis Germ. Dugopolje, Livno ziemlich häufig.

fuscatus Dej. Mostarsko Blato häufig.

Agonum viridicupreum a. *austriacum* Fab. Mostarsko Blato häufig.

viridicupreum a. *dalmatinum* Dej. mit der vorigen weniger häufig.

marginatum L. überall im Narentagebiet sehr häufig.

Mülleri Hbst. in Gesellschaft der vorigen ebenso häufig.

lugens Duft. Narenta vereinzelt, Mostarsko Blato häufig.

Holdhausi Apfb. Bosna und Mostarsko Blato je ein Exemplar.

hypocrita Apfb. Mostarsko Blato 2 Exemplare.

Platynus scrobiculatus Fab. Trebevic unter fauler Baumrinde zwei Exemplare.

assimilis Payk. in Gesellschaft der vorigen häufig.

dorsalis Pont. überall gemein.

Europhilus Thoreyi Dej. Mostarsko Blato häufig.

Lebia cyanocephala Linn. Mostarsko Blato, Nevesinje ziemlich häufig.

crux minor Linn. Jablanica gekätschert 2 Exemplare.

Demetrias imperialis Germ. Mostarsko Blato aus Schilf geklopft, 2 Exemplare.

atricapillus Linn. wie vorher, jedoch häufig.

- Dromius longiceps* Dej. Mostarsko Blato aus Schilf geklopft, zwei Exemplare.
linearis Oliv. Mostarsko Blato häufig.
quadrinaculatus Linn. Kojnica 2 Exempl. gekätschert.
sigma Rossi. Trebevic 4 Exemplare.
Lionychus quadrillum Duft. Kojnica, Jablanica vereinzelt.
- Cymindis humeralis* Geoffr. Trebevic, Gacko, Nevesinje häufig.
axillaris Fab. Bjelasnica, Velez, Bilek, Nevesinje häufig.
axillaris v. *lineola* Duft. Dugopolje, Salona, Hum bei Mostar, Ulog, Nevesinje, stellenweise häufig.
axillaris v. *Feigli* Hoffm. Nevesinje 1 Exemplar.
coadunata Dej. Bjelasnica, Trescavica je 2 Exemplare.
vaporariorum Linn. Bjelasnica, Cvrstnica, Vran wenige.
variolosa Fab. Bilek, Gacko je 1 Exemplar.
- Odacantha melanura* Linn. Mostarsko Blato aus Schilf geklopft, häufig.
- Zuphium olens* Fab. Mostarsko Blato aus Schilf geklopft, 2 Expl.
- Aptinus bombardia* Illig. Bjelasnica, Visocica, Cvrstnica, Velez häufig.
- Brachynus sclopeta* Fab. Hum bei Mostar 1 Exemplar.
explodens Duft. in Gesellschaft der vorigen ebenso häufig.
psophia Serv. Mostarsko Blato häufig.
crepitans L. Sarajevo, Gacko, Bilek, Nevesinje häufig.
Hoffmanni Liebke nov. sp. Umgebung Nevesinje ein Exemplar.
- Agabus undulatus* Schrk. Mostarsko Blato sehr häufig.
- Rhysodes sulcatus* Fab. Bilek, Gacko häufig.
- Actypea undata* s. *nitidior* Hille. Bjelasnica 2 Exemplare.
- Xylodrepa quadripunctata* Schrb. Salona, Gacko, Bilek vereinzelt.
- Silpha carinata* s. *italica* Küst. Dugopolje 1 Exemplar.
orientalis Brullé. Salona, Labin je 1 Exemplar.
- Ablattaria laevigata* Fab. Sarajevo, Kojnica häufig.
laevigata s. *meridionalis* GgIb. Salona, Hum bei Mostar wenige.
- Agyrtes castaneus* Fab. Mostarsko Blato häufig.
- Adelopsella bosnica* Rtt. Bjelasnica, Trescavica, Visocica, Cvrstnica, Vran. Vorkommen sowohl in Höhlen als auch in Exkrementen und Erde.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Hoffmann Adolf

Artikel/Article: [Coleopterologische Sammelreise nach Dalmatien, Bosnien und Herzegovina. Vortrag gehalten am 4. und 18. Oktober 1927 im Wiener Coleopterologen-Verein. 73-76](#)