

megacephalus Nrdm. Bjelasnica 2 Exemplare.
ophthalmicus Scop. Salona, Labin, Bilek, Gacko häufig.
similis Fab. überall sehr häufig.
pedator Grav. Hum, Mostarsko Blato je 2 Exemplare.

Emus hirtus Linn. Hum, Mostarsko Blato vereinzelt.

Ontholestes murinus Linn. Mostarsko Blato häufig.

Creophilus maxillosus Linn. Gacko an Aas sehr häufig.

Astrapaeus ulmi Rossi. Mostarsko Blato ziemlich häufig.

Quedius fulgidus Fab. Mostarsko Blato 2 Exemplare.

mesomelinus Marsh. Trebevic, Bjelasnica, Visocica
ziemlich häufig.

mesomelinus s. *Kraussi* Penecke. Höhlen bei Labin
häufig.

xanthopus Er. Trebevic, Gacko einige.

fuliginosus Grav. Mostarsko Blato ziemlich häufig.

picipennis v. *molochinus*. Mostarsko Blato ziemlich
häufig.

ochropterus Er. Cvrstnica, Vran je 2 Exemplare.

ochropterus a. *Kiesenwetteri* Gn. Gacko 2 Exempl.

boops Grav. Bjelasnica 2 Exemplare.

Mycetoporus splendens Marsh. Gacko, Mostarsko Blato ziemlich
häufig.

Conosomus testaceus Fab. Hum, Mostarsko Blato 3 Exemplare.

immaculatus Steph. Mostarsko Blato häufig.

Tachyporus nitidulus Fab. Cvrstnica, Mostarsko Blato 2 Exempl.

pusillus Grav. Mostarsko Blato, Gacko wenige.

(Fortsetzung folgt.)

Melinea lilis imitata f. erica m. n.

Von R. B a r g m a n n, Leipzig.

Neben fast typischen *imitata* fliegt am Rio Dagua forma *erica*, welche noch unter der Submediana des Vflgls. einen gelblich-braunen Basalstreifen führt, der etwa bis zur Mitte des Hinterandes führt. Neben einer Reihe weißer Submarginalpünktchen auf dem Vflgl., die im Apex am deutlichsten sind, ist noch ein gelber Fleck im Analwinkel vorhanden. Das Hflgl.-Band ist schmal und reicht nur bis zur Mitte des Flügels.

♂♀ Type in meinem Besitz.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Bargmann R.

Artikel/Article: [Melinea lilis imitata f. erica m.n. 141](#)