

F. KÖHLER, Bornheim

Erster Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“

Zusammenfassung Zu dem 1998 erschienenen Verzeichnis der Käfer Deutschlands werden 1189 Meldungen nachgetragen. Die Gesamtzahl der aus Deutschland mit gesicherten Nachweisen vorliegenden Käferarten erhöht sich auf 6492.

Summary First Supplement to the Checklist of the beetles of Germany. - 1189 new notifications to the checklist, published in 1998, were added. A total of 6492 species of beetles have now been reliably recorded from Germany.

1. Einleitung und Dank

Im Jahr 1998 erschien erstmals seit HORIONS (1951) Käferverzeichnis Mitteleuropas wieder ein aktueller Katalog der Käfer Deutschlands. Das „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998) und die zugehörigen Datenbanken mit Quelleneinträgen umfaßten 76.639 Meldungen mit zeitlichem Bezug aus 18 deutschen Regionen. In ausführlichen Darstellungen wird die Datenerhebung und -verarbeitung sowie der Bearbeitungsstand in den einzelnen deutschen Regionen von 20 Autoren beschrieben. Insgesamt konnten 6.479 Käferarten mit gesicherten Nachweisen aus Deutschland aufgeführt werden, weitere 379 Arten wurden als eingeschleppt, als fraglich oder als Falschmeldungen gekennzeichnet.

In der Einleitung des Verzeichnisses wurde unter anderem der Hoffnung Ausdruck verliehen, daß die vorgelegten Listen ein Anstoß sein sollten, eigene Funde bekanntzugeben und weitere Lücken zu schließen. Diesem Wunsch sind viele Kollegen/innen nachgekommen, so daß schon jetzt ein erster umfangreicher Nachtrag erscheinen kann, in dem für so manche Art nicht nur Lücken geschlossen werden, sondern auch ein deutlicheres Verbreitungsbild oder eine Ausbreitungstendenz erkennbar wird. Es ist mir ein herzliches Anliegen mich bei den nachfolgenden Mitarbeitern/innen für ihre Unterstützung zu bedanken:

Volker ASSING, Hannover
 Ulrich BENSE, Mössingen
 Dr. Fritz BRECHTEL, Rülzheim
 Boris BÜCHE, Berlin
 Dietmar EISINGER, Saarbrücken
 Jens ESSER, Berlin
 Günter FLECHTNER, Frankfurt/M.
 Günter HOFMANN, Stockstadt
 Heinz RÖWEKAMP, Ennigerloh
 Monika HESS, München
 Manfred JUNG, Athenstedt
 Wilhelm HÖHNER, Erlensee

Gerhard KATSCHAK, Kleve
 Dr. Ralf KLINGER, Frankfurt/M.
 Wilhelm LUCHT, Langen
 Christian MAUS, Freiburg
 Winrich MERTENS, Freiburg
 Georg MÖLLER, Berlin
 Christoph NEUMANN, Freiburg
 Andreas PÜTZ, Eisenhüttenstadt
 Johannes REIBNITZ, Tamm
 Dr. Klaus RENNER, Bielefeld
 Ulrich SCHAFFRATH, Kassel
 Joachim SCHEUERN, Sinzig
 Andreas SCHMIDT, Wetzlar
 Ludger SCHMIDT, Hannover
 Dr. Peter SPRICK, Hannover
 Wolfgang ZIEGLER, Rondeshagen

2. Methodische Hinweise

Nach Erscheinen des „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998) wurden alle Fehlermeldungen, Literaturhinweise und Mitteilungen zu einzelnen Arten gesammelt und in Datenbanken überführt.

Der aktuelle Arbeitsstand wird im Abschnitt 3 zusammengefaßt, in Tabelle 1 finden sich darüber hinaus die bekannten und im weiteren verwendeten Abkürzungen für die regionale Gliederung des Bearbeitungsgebietes und die verwendeten Zeithorizonte beziehungsweise sonstigen Status der Artmeldungen.

Bekannte Fehler im Verzeichnis, zum Beispiel falsche EDV-Codes oder Namensschreibweisen, werden in Abschnitt 4 dargestellt. Entsprechende Korrekturen wurden in den Datenbanken vorgenommen. Dies gilt auch für hier nicht genannte unrichtige Autorennamen und -jahreszahlen oder Klammern. Aktuelle taxonomische Änderungen, soweit sie seit Erscheinen des vierten Supplementes zu dem Werk „Die Käfer Mitteleuropas“ (LUCHT & KLAUSNITZER 1998) vorgenommen wurden,

werden aus den im Verzeichnis beschriebenen Gründen auch in diesem Nachtrag nicht aufgeführt. Weitere Artaufspaltungen haben nicht stattgefunden, so daß der faunistische Status bei keiner der betreffenden Arten verändert wurde. Ob und wie, zum Teil kontrovers diskutierte, taxonomische Änderungen in zukünftige Nachträge einfließen sollen, muß noch erörtert werden.

In Abschnitt 5 werden alle neuen Meldungen zu einzelnen Käferarten aufgeführt. Systematik und Nomenklatur folgen dabei dem Verzeichnis. Nach dem Käfernamen werden die Belegdaten in folgendem Schema - soweit bekannt - mitgeteilt: **Region neuer Status** (alter Status): Fundstadt-Ortsteil, Fundort, Finder, Datum, Anzahl und Fundumstände [Quelle]. Liegt mehr als ein Fundort aus einer Region vor, so werden die Fundorte durch Gedankenstriche getrennt. Liegen Nachweise aus mehr als einer Region vor, werden die Regionen alphabetisch aneinander gereiht. Die Reihung (a, b, c) der Quellen orientiert sich am Verzeichnis und entspricht den Datenbankeinträgen. Falls bei unpublizierten Funden keine anderen Daten genannt werden, sind Finder und Bestimmer identisch, und überprüfbare Präparate sind in der Belegsammlung des Finders hinterlegt.

Diese ausführliche Form der Darstellung wurde gewählt, da es sich einerseits vielfach um seltene und gefährdete Käferarten handelt, zu denen nur wenige Veröffentlichungen vorliegen, und um andererseits auch die Arbeit der Beobachter entsprechend zu würdigen. Eine präzise Fundortnennung erscheint mir darüber hinaus auch aus einem anderen Grund bedeutsam: In vielen Publikationen werden immer noch ausschließlich Städte und Dörfer als Fundorte genannt, aber nicht der eigentliche Fundortname (..berg, ..tal, ..ufer, ..wald usw.). Warum leben eigentlich so viele gefährdete und seltene Käferarten in unserer Korrespondenz und Literatur in menschlichen Siedlungen?!

Alle Korrekturen, Käfermeldungen und Quellen wurden in die vorhandenen Datenbanken eingearbeitet, so daß mit Erscheinen dieses Nachtrages auch hier ein Update vorliegt.

3. Arbeitsstand

Für diesen Nachtrag liegen insgesamt 1.195 einzelne Meldungen mit zum Teil mehreren Fundorten je Meldung aus den 18 deutschen Regionen vor. Im wesentlichen handelt es sich hierbei um neue aktuelle Neu- und Wiederfunde aus den Regionen. Auf ganz Deutschland bezogen ergeben sich auf Artniveau aber auch einzelne bedeutsame Änderungen in den Einstufungen, die nachfolgend zusammengestellt werden:

Neufunde für Deutschland

- Tychobythinus glabratus* (RYE, 1870)
- Xylographus bostrychooides* (DUF., 1843)
- Orthocis linearis* (SAHLB., 1901)
- Gastrallus knizeki* ZÁHRADNIK, 1996
- Parmena balteus* (L., 1767)
- Dorytomus puberulus* (BOH., 1843)

Wiederfunde für Deutschland nach über 50 Jahren

- Colon fuscicornе* KR., 1852
- Neuraphes coronatus* SAHLB., 1881
- Ptiliolum sahlbergi* FLACH, 1888
- Omalium nigriceps* KIESW., 1850
- Eudectus giraudi* REDT., 1858
- Mycetoporus brucki* (PAND., 1869)
- Anthaxia millefolii* (F., 1801)
- Purpuricenus kaehleri* (L., 1758)
- Longitarsus australis* (MULS.REY, 1874)
- Trachyphloeus rectus* THOMS., 1865
- Cionus olivieri* ROSENSCH., 1838

Neu für Deutschland, aber verschollen

- Trypocopris pyrenaeus* (CHARP., 1825)
- Otiorhynchus arcticus* (O.F., 1780)

Neue eingebürgerte Adventivarten

- Bambara fusca* DYBAS, 1966
- Clambus simsoni* BLACKBURN, 1902

Neue importierte Arten

- Cercyon renneri* HEBAUER, 1997
- Carpophilus obsoletus* ER., 1843
- Xylotrechus stebbingi* GAHAN, 1906
- Trichoferus griseus* (F., 1792)
- Otiorhynchus cribricollis* GYLL., 1834
- Otiorhynchus meridionalis* GYLL., 1834

Bisher fraglich oder falsch, jetzt bestätigt

- Elaphropus diabracrys* (KOL., 1845)
- Atheta volitans* BENICK, 1970
- Meotica winkleri* BENICK, 1954
- Malthinus bilineatus* KIESW., 1852
- Astrapaeus ulmi* (ROSSI, 1790) (Ba.)

Bisher nur importiert, jetzt eingebürgert

- Athous campyloides* NEWM., 1833
- Carpophilus quadrifasciatus* ER., 1843
- Latheticus oryzae* WTRH., 1880

Für Deutschland jetzt zu streichen

- Thinobius atomus* AUCT.NEC Fauv., 1869
- Nitidula flavomaculata* ROSSI, 1790
- Leiosoma kirschi* GREDL., 1866

Für Deutschland jetzt fraglich

- Orthocis pseudolinearis* (LOHSE, 1965)
- Pityogenes bistridentatus* (EICHH., 1879)

Tab. 1: Verteilung der Käferarten auf die 18 deutschen Regionen, Bundesländer und Arbeitsgebiete coleopterologischer Vereinigungen. Zeit-horizonte: + = seit 1950, - = vor 1950, • = vor 1900, Ges. = Summe gesicherter Nachweise. Sonstige Einträge: ? = fraglich, = Falschmel-dungen, v = verschleppt, i = importiert (s. Kap. 2.IV).

Region / Bundesland	+	•	Ges.	?	/	v	i	Summe	
Bayern (By)	4907	424	130	5461	52	36	1	22	5572
Württemberg (Wt)	4105	121	31	4257	40	35	3	5	4340
Baden (Ba)	4488	157	19	4664	26	23	1	15	4729
Hessen (Hs)	4200	82	311	4593	50	53	0	21	4717
Pfalz (Pf)	3663	284	107	4054	45	46	5	11	4161
Rheinland (Rh)	3981	233	154	4368	32	139	13	13	4565
Saarland (Sd)	2793	65	0	2858	8	32	1	4	2903
Nordrhein (No)	3873	304	159	4336	58	171	31	41	4637
Westfalen (Wf)	3673	114	468	4255	28	64	3	14	4364
Hannover (Hn)	3376	285	164	3825	39	18	1	12	3895
Weser-Ems-Gebiet (WE)	3120	274	146	3540	75	23	1	20	3659
Niederelbegebiet (Ne)	3719	55	17	3791	13	79	2	23	3908
Schleswig-Holstein (SH)	3715	150	63	3928	56	318	3	88	4393
Mecklenburg-Vorpomm. (MV)	3009	309	219	3537	71	14	6	7	3635
Brandenburg (Br)	3609	467	45	4121	81	34	3	28	4267
Sachsen-Anhalt (St)	3576	746	26	4348	33	13	1	16	4411
Thüringen (Th)	3737	843	44	4624	38	22	0	7	4691
Sachsen (Sn)	3820	398	175	4393	96	13	2	11	4515
Summe Datensätze	67364	5311	2278	74953	841	1133	77	358	77362
Baden-Württemberg	4869	139	22	5030	39	38	4	18	5129
Rheinland-Pfalz	4430	208	125	4763	49	135	12	22	4981
Rheinprovinz	4433	217	123	4773	52	221	35	50	5131
Nordrhein-Westfalen	4213	238	239	4690	46	145	26	44	4951
Niedersachsen	4352	146	115	4613	57	62	1	37	4770
Schleswig-Holst./Niederelbegeb.	4051	83	42	4176	55	327	3	98	4659
Arten Deutschland	6219	211	62	6492	77	125	0	123	6817

Neu im Verzeichnis, aber Falschmeldungen

Coryphium greedleri KR., 1870

Boreaphilus velox HEER, 1838

Gabrius suffragani JOY, 1913

Otoletus pruiniosus (KIESW., 1861)

Agapanthia cynarae (GERM., 1817)

Neu im Verzeichnis, aber fraglich

Phyllodrepa scabriuscula (KR., 1858)

Thinobius gilvus FAUVEL, 1899

Atheta viennensis BENICK, 1974

Atheta amblystegii BRUNDIN, 1952

Adosomus roridus (PALL., 1781)

Unter Berücksichtigung der Aktualisierung bereits bestehender Meldungen wächst die Zahl der Einträge von 76.639 auf 77.362, die Zahl der gesicherten Artnachweise aus Deutschland von 6.479 auf 6.492, von denen 211 Arten seit 1950 (zuvor 219) und 62 (61) Arten seit 1900 verschollen sind. Tabelle 1 gibt den aktuellen Artenbestand der Region, Bundesländer und Arbeitsgebiete coleopterologischer Vereinigungen wieder, Abbildung 1 die Veränderungen seit Erscheinen des Verzeichnisses 1998.

4. Korrekturen und neue EDV-Codes

Fehler in der Namensschreibweise oder im EDV-Code, Ersatz alter Namen mit Seitenzahl im Verzeichnis, EDV-Code, Artname:

047	01.-029.-077-	<i>Bembidion schuppelii</i>
051	01.-0633.001-	<i>Oxypselaphus obscurus</i>
055	04.-016.-003-	<i>Nebrioporus depressus</i> (Potam.)
057	061.000.-000-	Familie MICROSPORIDAE
061	10.-024.-006-	<i>Platysoma angustatum</i> (ferrug.)
061	10.-0241.001-	<i>Eblisia minor</i> (nicht 311.)
062	121.004.-001-	<i>Pteroloma forsstromii</i>
071	23.-0481.018-	<i>Anotylus hamatus</i>
081	23.-113.-0021	<i>Sepedophilus constans</i> (stoeckli)
090	23.-204.-008-	<i>Calodera stiliformis</i>
098	321.000.-000-	Familie TROGOSSITIDAE
107	47.-011.-006-	<i>Byrrhus luniger</i> (syn. <i>lineatus</i>)
137	88.-023.-0411	<i>Chrysolina quadrigemina</i> (Code)
138	88.-0291.001-	<i>Neophaedon pyritosus</i> (Code)
138	88.-0292.001-	<i>Sternoplatus segnis</i> (EDV-Code)
170		<i>Ophonus</i> (statt <i>Metophonus</i>)
177		<i>Anatalus streichen</i>

Neue Arten und EDV-Codes für Mitteleuropa:

- 059 09-003-0181. *Cercyon renneri*
 066 21-0091.001-. *Bambara fusca*
 072 23-051-026-. *Thinobius gilvus*
 074 23-055-1082. *Stenus annulipes*
 103 381.002-0011. *Clambus simsoni*
 107 50-006-011-. *Carpophilus obsoletus*
 120 68-010-004-. *Gastrallus knizeki*




Abb. 1: Anzahl der gesicherten Käfernachweise 1999 in den 18 deutschen Regionen (Veränderung zu 1998).

5. Nachträge

Familie CARABIDAE

Calosoma maderae (F., 1775): **Hn+** [WÖLKERLING 1998].

Carabus purpurascens F., 1787: **Wt+ (?)** [HORION 1959].

Carabus nitens L., 1758: **Wt+ (-)** [HORION 1959].

Carabus linnrei PANZ., 1810: **Wt+**: Weinsberg, LECHNER, 1.XI.1953, 1 Ex. [coll. HAHLOHM, L. SCHMIDT i. l. 1999].

Blethisa multipunctata (L., 1758): **Ba+** [KLESS 1998].

Dyschirius angustatus (AHR., 1830): **Hn+**: U. Gronau, Betheln, U. VOIGT, 1997, mehrfach [t. SPRICK] in Bodenfalten [coll. U. VOIGT, L. SCHMIDT i. l. 1999]. **Wf+ (-)**: Osnabrück, BÜCHE, 8.VI.1991, 1 Ex. an einem Baggersee an einer lehmigmischten Feinsandböschung Werther-Isingdorf, Teutoburger Wald, RENNER, 9.V.1998, 1 Ex. im Autokescher [BÜCHE i. l. 1999, RENNER i. l. 1998].

Perileptus areolatus (CREUTZ., 1799): **WE+** [MAUS 1986].

Epaphiushijularis (GYLL., 1810): **Hn+**: St. Andreasberg, HEINRICH & J. SCHMIDT, 2.VIII.1998, 1 Ex. (SPRICK det.) [coll. SPRICK, L. SCHMIDT i. l. 1999].

Elaphropus diabracchys (KOL., 1845): **Ba+(-)**: Buggingen, Kalihalde, MAUS, III.85, 1 Ex. (det. & coll. SOWIG) [MAUS i. l. 1999].

Elaphropus sexstriatus (DUFT., 1812): **Pf+(-)**: Die Meldung bei PERSOHN & BÜNGENER (1989) beruht auf einer Fehlbestimmung [SCHÜLE & PERSOHN 1997].

Bembidion littorale (OL., 1790): **Wt- (-)** [HORION 1959].

Bembidion ruficolle (PANZ., 1797): **Ne+**: Lübbow, ZIEGLER, 17.VIII.1998 [ZIEGLER i. l. 1999].

Bembidion starkii SCHAUM, 1860: **Wt- (-)** [HORION 1959].

Bembidion cruciatum DEJEAN, 1831: **Ba+(-)**: Grissheim und Weinstitten, Rheinaue, LAU & SZALLIES (t. TRAUTNER) [NEUMANN i. l. 1999].

Bembidion tenellum ER., 1837: **Hn+(-)**: Fehldetermination (SPRICK korr.) [L. SCHMIDT i. l. 1999].

Diachromus germanus (L., 1758): **SH+**: Groß Zecher, Schaalsee, WINKLER, VI.1997 [ZIEGLER i. l. 1999].

Harpalus solitarius DEJ., 1829: **Rh+(-)**: Taben-Hamm, Saaraue, EINWALLER, 30.V.1997, 1 Ex. (t. KOHLER) [KOHLER Taben].

Harpalus marginellus DEJ., 1829: **Wt- (-)** [HORION 1959].

Pseudoophonus rufipes (DEGEER, 1774): **MV+**: Gothmann, ZIEGLER, 6.VI.1994 [ZIEGLER i. l. 1999].

Pseudoophonus griseus (PANZ., 1797): **MV+**: Gothmann, ZIEGLER, 6.VI.1994 [ZIEGLER i. l. 1999].

Pseudoophonus calceatus (DUFT., 1812): **MV+**: Gothmann, ZIEGLER, 16.VIII.1994 [ZIEGLER i. l. 1999]. **Wt-** [HORION 1959].

Dicheirotrichus rufithorax (SAHLB., 1827): **Wt+** [HARDE & KÖSTLIN 1965].

Acupalpus brunneipes (STURM, 1825): **Sd+**: Nennig, Moselaue, DIDION, 15.V.1997, 1 Ex. (coll. EISINGER) in einer Bodenfalle [EISINGER i. l. 1999]. **Wt-** [HORION 1959].

Acupalpus interstitialis RTT., 1884: **Ba+(-)**: Grissheim, Rheintrockenäue, SZALLIES, 16.V.1997, 1 Ex. (t. TRAUTNER) [NEUMANN i. l. 1999].

Poecilus kugelanni (PANZ., 1797): **Ba+(-)**: Grissheim, Rheintrockenäue, 1998, mehrfach [NEUMANN i. l. 1999].

Pterostichus aterrimus (HBST., 1784): **Wt-** [HORION 1959].

Calathus mollis (MARSH., 1802): **HS?(-)** für Hessen fraglich, da Beleg in coll. E. MÜLLER ungeprüft [HOFMANN i. l. 1998].

Sphodrus leucophthalmus (L., 1758): **Wt-** [KÖSTLIN 1957].

Sericoda quadripunctata (DEGEER, 1774): **WE+**: Spiekeroog, MAUS, 20.VII.1987, 1 Ex. [MAUS in Vorber.].

*Amara futil FASS., 1947: **Sd+(-)**: Beaumarais, MAAS, 29.V.1993, 2 Ex. (coll. EISINGER) in einer Bodenfalle [EISINGER i. l. 1999].*

Amara anthobia VILLA, 1833: **Sd+** [LILLIG 1998].

Amara crenata DEJ., 1828: **Wt+(-)** [SCHMID 1965].

Amara convexiuscula (MARSH., 1802): **Sd+**: Nennig, Baggerweiher, DIDION, 15.V.1997, 1 Ex. (t. EISINGER) unter Stein auf einer Ruderalstelle [coll. DIDION, EISINGER i. l. 1999].

Chlaenius tristis (SCHALL., 1783): **Ba+** [HORION 1954b].

Oodes gracilis VILLA, 1833: **Pf+** [FLECHTNER 1984].

Badister meridionalis PUEL, 1925: **Hn+(-)**: Fehldetermination (SCHÜLE korr.) [L. SCHMIDT i. l. 1999].

Lebia scapularis (FOURCR., 1785): **Ba-**: Efringen, HARTMANN, 8.VI.1909, 1 Ex. (t. MAUS) [HARTMANN 1924, coll. Mus. Dresden].

Syntomus pallipes (DEJ., 1825): **Ba!**: Bad Säckingen, MAASS, 1894, 1 Ex., sicher Falschmeldung [HORION 1941].

Familie HYGROBIIDAE

Hygrobia hermanni (F., 1775): **HS+(-)**: keine neuen Funde aus Hessen seit 1955 [HORION 1941, FLECHTNER i. l. 1999].

Familie HALIPLIDAE

Haliplus immaculatus GERH., 1877: **Sd+**: Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i. l. 1999].

Haliplus furcatus SEIDL., 1887: **HS+** [HILLESHEIM-KIMMEL et al. 1978].

Haliplus variegatus STURM, 1834: **HS+(-)**: Riestadt, Rheinsel-Kühkopf, VOGT, 18.V.1958, 2 Ex. (coll. Mus. Frankfurt, t. HOFMANN) [HOFMANN i. l. 1998].

Familie DYTISCIDAE

- Bidessus minutissimus* (GERM., 1824): **Wt+** [HENZE 1996].
Hydroporus gyllenhalii SCHDT., 1841: **Hs+:** diverse Nachweise, coll. BÖHME, HÖHNER, HOFMANN, SCHINDLER [HOFMANN i. l. 1998].
Hydroporus morio AUBÉ, 1836: **Th+:** [CUPPEN et al. 1998].
Hydroporus longicornis SHP., 1871: **Hs+:** Rhön, Rotes Moor, FRISCH & HÖHNER, 3.III.19 und 2.IV.1994, 5 Ex. [HÖHNER i. l. 1998].
Laccophilus ponticus SHARP, 1882: **Hn+(.):** Eschede, Quarmbach, WILLERS, 28.IX.1996, 1 Ex. (t. BELLSTEDT) im Uferbereich [coll. WILLERS, L. SCHMIDT i. l. 1999].
Agabus neglectus ER., 1837: **Ba+:** Fischweiher, Albtal, BÜCHE, 24.VIII.1991, 1 Ex. [BÜCHE i. l. 1999].
Agabus nitidus (F., 1801): **Hs+(.):** Roßdorf, Roßberg, HÖHNER, 17.IV.1982, 1 Ex. [HÖHNER i. l. 1998].
Agabus congener (THUNB., 1794): **Ba+** [KLESS 1998, HARTMANN 1926].
Agabus undulatus (SCHRK., 1776): **Sd+:** Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i. l. 1999].
Nartus grapii (GYL., 1808): **Hs+(-):** Hanau, HÖHNER, 15.X.1983 und 21.IX.1984, 5 Ex. [HÖHNER i. l. 1998].
Rhantus suturellus (HARR., 1828): **Ba+:** Hartheim, Rheintrockenau, Finder unbekannt [NEUMANN i. l. 1999].
Dytiscus circumcinctus AHR., 1811: **Hs+(.):** Seligenstadt, Froschhausen, SCHROTH, 6.VIII.1978, 1 Ex. (coll. HÖHNER) [HÖHNER i. l. 1998].
Cybister lateralimarginalis (DEGEER, 1774): **Ne+:** Kaltenhof, HENG-MITH, 9.V.1998 [ZIEGLER i. l. 1999].

Familie GYRINIDAE

- Gyrinus caspius* MENETR., 1832: **WE+(-):** Spiekeroog, MAUS, 22.VII.1987, 1 Ex. (t. PANKOW) [MAUS in Vorber.].

Familie HYDRAENIDAE

- Hydraena rufipes* CURT., 1830: **Wt+** [HORION 1960b].
Hydraena Belgica d'ORCH., 1930: **Hs+(-):** Odenwald, VOGT, 8.VIII.1959 und 22.VIII.1959, 3 Ex. (HOCH det., LOHSE det., coll. HÖHNER) [HÖHNER i. l. 1998].
Ochthebius exsculptus GERM., 1824: **Ba+(-):** Istein, Rheinaue, NEUMANN, VIII.98, zahlreich (t. PANKOW) an den Felsen der Isteiner Schwellen, knapp unter der Wassergrenze [NEUMANN i. l. 1999].
Limnebius papposus MULS., 1844: **Hs(-):** Wiesbaden-Schierstein, Finder?, 30.IV.1923, 1 Ex. (coll. HÖHNER) [HÖHNER i. l. 1998].
Limnebius aluta BEDEL, 1881: **No+(-):** Kleve, SCHAFR, 18.II.1998, 1 Ex. (coll. RÖWEKAMP, t. RENNER) [RÖWEKAMP & RENNER i. l. 1998].
Limnebius atomus (DUFT., 1805): **Hs+(.):** Groß-Gerau, HÖHNER, 25.IX.1982 und 30.IV.1983, 5 Ex. [HÖHNER i. l. 1998].

Familie HYDROCHIDAE

- Hydrochus elongatus* (SCHALL., 1783): **Ba-** [HORION 1954b]. **Sd+:** Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i. l. 1999].
Hydrochus brevis (HBST., 1793): **Ba+:** Karlsruhe-Hafen, Rheinaltwasser Schlehet, BÜCHE, 18.IV.1988 [BÜCHE i. l. 1999].
Hydrochus angustatus GERM., 1824: **Pf+:** Schaidt, NWR Mörderhäufel, KÖHLER, 28.VI.1996, 6 Ex. im Autokescher [KÖHLER Bienvald].

Familie HYDROPHILIDAE

- Helophorus aequalis* THOMS., 1868: **Hs+:** Kinzigaue, ERPELDING, diverse Funde (t. HOFMANN) [ERPELDING 1998].
Helophorus arvernicus MULS., 1846: **Hs+:** Fuldauer, MARTEN [MARTEN 1983].
Helophorus dorsalis (MARSH., 1802): **Ne+:** Forst Landwehr, Gruppe, ZIEGLER, 21.VI.1998 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].
Helophorus parvinnutus ANGUS, 1986: **Th+:** [CUPPEN et al. 1998].
Sphaeridium marginatum F., 1787: **WE+:** Spiekeroog, MAUS, mehrere Nachweise [MAUS in Vorber.].
Cercyon littoralis (GYL., 1808): **MV+:** Salzhaff, JUNG, 1988, zahlreich unter Tang [JUNG i. l. 1999].

- Cercyon marinus* THOMS., 1853: **Sd+:** Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i. l. 1999].
Cercyon bifenestratus KÜST., 1851: **Sd+:** Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i. l. 1999].
Cercyon laminatus SHP., 1873: **MV+:** Duvennest, ZIEGLER, 8.VIII.1996 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].
Cercyon granarius ER., 1837: **Wf+(:)**: Medebach-Berge, Orketal, RÖWEKAMP, 1.VI.19??, 1 Ex. (t. RENNER) [RÖWEKAMP & RENNER i. l. 1998].

- Cercyon renneri* HEBAUER, 1997: **Wf** [HEBAUER 1997].
Cryptopleurum subtile SHP., 1884: **Br+(-)** [PÜTZ 1984b].
Limnoxenus niger (ZSCHACH, 1788): **Sd+:** Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i. l. 1999].
Laccobius obscuratus (ROTT., 1874): **Pf+:** Fischbach, Staatsforst, KÖHLER, 21.VI.1998, 1 Ex. im Autokescher [coll. KÖHLER].
Laccobius atratus (ROTT., 1874): **Hn+:** Harz, Schalke, M. KOCH, 28.IX.1997, 4 Ex. (HOFMANN det.) in einem Quellmoor [HOFMANN i. l. 1998].
Helochares punctatus SHP., 1869: **Ba+:** Hotzenwald, Horbacher Moor, MERTENS, 27.IX.1997, 2 Ex. aus einem Moortümpel [MERTENS i. l. 1999].
Enochrus halophilus (BEDEL, 1878): **Th+:** [CUPPEN et al. 1998].
Chaetarthria similis WOLL., 1864: **Hs+:** Heusenstamm, SCHINDLER, 20.IV.1962, 1 Männchen (HOFMANN det. gen.) an einem Sandgrubenufer [HOFMANN i. l. 1998]. **Th+:** [CUPPEN et al. 1998].
Berosus bispina REICH, SAULCY, 1856: **Pf+:** Vinningen, MOSBACHER, 19.X.1995, 1 Ex. in einer Mardelle [coll. MOSBACHER, EISINGER i. l. 1999].

Familie HISTERIDAE

- Plegaderus saucius* ER., 1834: **Ba+:** Freiburg-Ebringen, Schönberg, NEUMANN, 17.IV.1992, 1 Ex. unter Fichtenrinde [NEUMANN i. l. 1999].

- Abraeus parvulus* AUBÉ, 1842: **Wf+:** Enniger, RÖWEKAMP, 1.XII.1996, 1 Ex. (t. RENNER) [RÖWEKAMP & RENNER i. l. 1998].
Acritus komai LEWIS, 1879: **Hn+:** Rodewald, HALHBOHM, 1.VIII.1993, 1 Ex. im Autokescher [coll. HALHBOHM, L. SCHMIDT i. l. 1999]. **SH+:** Rondeshagen, ZIEGLER, 12.IX.1981 [ZIEGLER i. l. 1999].
Gnathoncus nanetenensis (MARS., 1862): **Hs+:** Hanau, Kleine Bulau, HÖHNER, 10.VIII.1970, 3 Ex. an Taubenmistköder, weitere Funde [HÖHNER i. l. 1998].

- Saprinus laetus* ER., 1839: **Ne+:** Hamburg, Hohe Schaar, HERRMANN, 12.VI.1997 [ZIEGLER i. l. 1999].

- Hypocaccus rugiceps* (DUFT., 1805): **No+(-):** [MÜLLER & REISMANN 1998].

- Dendrophilus pygmaeus* (L., 1758): **MV+(-):** Pritzier, ZIEGLER, 4.I.1999 [ZIEGLER i. l. 1999].

- Hololepta plana* (SÜLZER, 1776): **Rh+:** Andernach, Namedyer Wert, NEUMANN, 1993-1995, mehrfach unter Pappeleinrinde [NEUMANN i. l. 1999].

- Onthophilus punctatus* (MÜLLER, 1776): **Sd+:** Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i. l. 1999].

- Margarinotus purpurascens* (HBST., 1792): **Hs+:** Erlensee, HÖHNER, 15.VI.1969, 4 Ex., weitere Funde [HÖHNER i. l. 1998]. **MV+(-):** Gothmann, ZIEGLER, 18.VIII.1994 [ZIEGLER i. l. 1999].

- Margarinotus ventralis* (MARS., 1854): **MV+(-):** Gothmann, ZIEGLER, 18.VIII.1994 [ZIEGLER i. l. 1999].

- Hister quadrivittatus* L., 1758: **St+(-):** Freyburg/Unstrut, LAU LSA, 1996, zahlreich (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i. l. 1999].

- Hister helluo* TRUQUI, 1852: **Rh+(-):** Taben-Rodt, Saaraue, MATERN, 10.VII.1997, 20 Ex. [KÖHLER Taben].

- Hetaerius ferrugineus* (OL., 1789): **Hn+(-):** Wesseln, NSG Steinberg, HONDELmann, 25.IV.1998, 1 Ex. [coll. L. SCHMIDT].

Familie SPHAERITIDAE

- Sphaerites glabratus* (F., 1792): **Rh+:** Welschneudorf, NWR Stelzenbach, KÖHLER, 9.V.1998, 1 Ex. im Autokescher [KÖHLER Stelzenbach]. **St+:** Altenbrak/Harz, LAU LSA, 1997, 5 Ex. (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i. l. 1999].

Familie SILPHIDAE

Necrophorus sepulctor CHARP., 1825: **Wt+** [HORION 1960b].
Necrophorus vestigator HERSCHEL, 1807: **Ba+** [WOLF 1963].
Silpha obscura L., 1758: **St+(-)**: Eisleben, Salziger See, LAU LSA, 1997, zahlreich (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i. l. 1999].
Silpha tyrolensis LAICH., 1781: **Ba+** [ROPPEL 1990].

Familie AGYRTIDAE

Agyrtes bicolor CAST., 1840: **St+(-)**: Freyburg/Unstrut, Tote Täler, PIETSCH, 1995, 1 Ex. in Bodenfallen [JUNG i. l. 1999].

Familie LEPTINIDAE

Leptinus testaceus MÜLL., 1817: **St+(-)**: Altenbrak/Harz, LAU LSA, 1997/98, 7 Ex. (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i. l. 1999].

Familie CHOLEVIDAE

Choleva septentrionalis JEANN., 1923: **Wf+** [IPSEN & TOLASCH 1997].
Choleva nivalis (Kr., 1856): **Ba+** [BAUM 1989, ROPPEL 1990, MOLENDA 1996].
Choleva angustata (F., 1781): **St+(-)**: Timmenrode/Quedlinburg, LAU LSA, 1995/97, 2 Ex. (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i. l. 1999].
Choleva sturni BRIS., 1863: **St+(-)**: Altenbrak/Harz, LAU LSA, 1997, 1 Ex. (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i. l. 1999].
Choleva jeanneli BRITT., 1922: **Sd+**: Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i. l. 1999]. **St+(-)**: Wittenberg, PFEIFFER, 1991, 1 Ex. [JUNG i. l. 1999].

Familie COLONIDAE

Colon clavigerum HBST., 1797: **St+**: Timmenrode/Quedlinburg, LAU LSA, 1995/96, zahlreich (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i. l. 1999].
Colon fuscicorne KR., 1852: **St+(-)**: Timmenrode/Quedlinburg, LAU LSA, 1995, 1 Ex. (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i. l. 1999].
Colon armipes KR., 1854: **St+(-)**: Timmenrode/Quedlinburg, LAU LSA, 1995/96, zahlreich (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i. l. 1999].
Colon angulare ER., 1837: **Hs+(-)** [FLECHTNER et al. 1999].
Colon zebei KR., 1854: **Ba+**: Grissheim, Rheintrockenau, SZALLIES, 16.V.1997, 1 Ex. im Autokescher [NEUMANN i. l. 1999]. **Hs+(-)** [FLECHTNER et al. 1999].
Colon barnevillei KR., 1858: **Ba+** [SCHILLER 1979b].
Colon brunneum (LATR., 1807): **Ba+**: Grissheim, Rheintrockenau, SZALLIES, 28.VII.96, 10.VI.97 und 9.VII.97, im Autokescher [NEUMANN i. l. 1999]. **Hs+(-)** [FLECHTNER et al. 1999].
Colon calcaratum ER., 1837: **Ba+**: Grenzach-Wyhlen, SCHILLER, 23.VII.1978, 1 Ex. gestreift Grissheim, Rheintrockenau, SZALLIES, 28.VII.1996 und 10.VI.1997, je 1 Ex. [SCHILLER 1979b, NEUMANN i. l. 1999].
Colon serripes (SAHLB., 1822): **St+**: Eisleben, Salziger See, LAU LSA, 1997, zahlreich (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i. l. 1999].

Familie LEIODIDAE

Triarthron maerkelii MÄRK., 1840: **MV+(-)**: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 28.V.1994 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].
Hydnobius multistriatus (GYLL., 1813): **Ba+** [HORION 1954b]. **St+(-)**: Athenstedt, JUNG, 1971, 1 Ex. [JUNG i. l. 1999].
Leiodes rugosa STEPH., 1829: **SH+(-)**: Treuholz, Barnitz, ZIEGLER, 28.X.1998 [ZIEGLER i. l. 1999].
Leiodes hybrida (ER., 1845): **Ba+(-)** [HORION 1954b].
Leiodes oblonga (ER., 1845): **Hs+(-)** [FLECHTNER et al. 1999].
St+(-): Athenstedt, JUNG, 1998, 4 Ex. in Bodenfallen [JUNG i. l. 1999].
Leiodes flavescens (SCHM., 1841): **Wt+** [HORION 1960b].
Leiodes picea (PANZ., 1797): **Wt-** [HORION 1960b].
Leiodes rufipennis (PAYK., 1798): **Ba+**: Schwetzingen, Dünengebiet Hirschacker/Dossenwald, BÜCHE, 10.VI.1992, 1 Ex. auf einem Sandtrockenrasen gesekert [BÜCHE i. l. 1999].

Leiodes brunnea (STURM, 1807): **St+(-)**: Timmenrode/Quedlinburg, LAU LSA, 1995, 1 Ex. (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i. l. 1999]. **WE+**: Spiekeroog, MAUS, 10.VIII.1987, 1 Ex. (DAFFNER det.) [MAUS in Vorber.].

Leiodes nigrita (SCHM., 1841): **Wt+** [BRITZ & BERNHARD 1994].

Leiodes gyllenhali STEPH., 1829: **Ba+** [HORION 1960b].

Leiodes strigipenne DAFFNER, 1983: **Pf+(-)**: Fischbach, Staatsforst, 21.VI.1998, 1 Ex. im Autokescher [coll. KÖHLER].

Colenus immunda (STURM, 1807): **Hs+(-)**: Frankfurt, Berger Hang, HÖHNER, 1.IV.1978, 1 Ex. und weitere Funde [HÖHNER i. l. 1998].

Liocyruta minuta (AHR., 1812): **Ba+**: Berghausen, Ziegeleigrube, BÜCHE, 21.VII.1984, 1 Ex. auf einem Halbtrockenrasen gesekert [BÜCHE i. l. 1999]. **St+(-)**: Hohenmölsen, PIETSCH, 1997, 1 Ex. in Bodenfallen [JUNG i. l. 1999].

Liocyruta vittata (CURT., 1840): **St+(-)**: Athenstedt, JUNG, 1998, 1 Ex. [JUNG i. l. 1999]. **Wt+** [HORION 1960b].

Liodopria serricornis (GYLL., 1813): **Sn+** [BENSE 1998]. **Wf+**: Werther-Isingdorf, Teutoburger Wald, RENNER, 20.VI.1998, 1 Ex. im Autokescher [RENNER mdl. Mitt.].

Agathidium convexum SH., 1866: **St+**: Hottendorf, LAU LSA, 1996, 1 Ex. in Bodenfallen [JUNG i. l. 1999].

Agathidium bescidicum RTT., 1884: **Wt+** [MEYER 1966].

Agathidium rotundatum (GYLL., 1827): **St+(-)**: Athenstedt, JUNG, 1998, zahlreich [JUNG i. l. 1999].

Agathidium confusum BRIS., 1863: **Hs+** [FLECHTNER et al. 1995].

Familie SCYDMAENIDAE

Euthia plicata (GYLL., 1813): **Ba+** [SZALLIES 1998].

Euthia linearis MULS., 1861: **Wt-** [HORION 1960b].

Euthia scydmaenoides STEPH., 1830: **Ba+**: Grissheim, Rheintrockenau, SZALLIES, 6.V.1995, 1 Ex. - Grissheim, Rheinufer, NEUMANN, VIII.98, 1 Ex. [NEUMANN i. l. 1999]. **By+(-)**: Falkenstein, Rettenbach, RENNER 5.VI.1998, 1 Ex. im Autokescher [RENNER i. l. 1999].

Neuraphes carinatus (MULS., 1861): **Ba+**: Karlsruhe, Hardtwald, Hagsfelder Eichen, BÜCHE, 7.III.1988, 1 Ex. aus der Bodenstreu gesiebt [BÜCHE i. l. 1999].

Neuraphes coronatus SAHLB., 1881: **Ba+(-)** [BAUM 1989].

Scymnophages sparsalli (DENNY, 1825): **Pf+**: Ludwigswinkel, Saarbachthal, KÖHLER, 14.V.1998, 1 Ex. im Autokescher [coll. KÖHLER]. **St+(-)**: Timmenrode/Quedlinburg, LAU LSA, 1995, 1 Ex. (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i. l. 1999].

Scymnophages minutus (CHAUD., 1845): **SH+**: Fitzen, ZIEGLER, 7.IX.1998 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Stenichnus pusillus (MÜLL.KUNZE, 1822): **Ba+(-)**: Grissheim, Rheintrockenau, SZALLIES, 18.X.1994, 1 Ex. im Mulm einer hohlen Pappel [NEUMANN i. l. 1999].

Stenichnus godarti (LATR., 1806): **Ba+**: Karlsruhe, Stutensee, NOWOTNY, VI.1949, 1 Ex. Karlsruhe, Beierheimer Wäldchen, NOWOTNY, III.1951, 2 Ex. Berghausen, BÜCHE, 3.IV.1989, 1 Ex. Karlsruhe-Grötzingen, Bruchwald, BÜCHE, 20.IV.1986, 1 Ex. hohler Pappel [NOWOTNY 1951, BÜCHE i. l. 1999].

Microscydmus nanus (SCHAUM, 1844): **Pf+(-)**: Schaidt, NWR Mörderhäufel, KÖHLER, 27.V.1997, 1 Ex. aus bemoosten Rinden am Fuß einer toten Alteiche [KÖHLER Bienwald].

Microscydmus minimus (CHAUD., 1845): **Sd+**: Saarbrücken, Saarkohlenwald, MÖLLER, VIII.1998, mehrfach am Fuß von Buchenruien [MÖLLER i. l. 1999]

Euconnus claviger (MÜLL.KUNZE, 1822): **Ba-** [HARTMANN 1926].

Euconnus pragensis (MACH., 1923): **Ba+**: Karlsruhe, Stutensee, NOWOTNY, VI.1948, 1 Ex. bei *Lasius brunneus* - Karlsruhe, Hardtwald Wildpark, BÜCHE, 21.I.1989, 2 Ex. am Stammfuß einer alten Buche bei *Lasius brunneus* [NOWOTNY 1951, BÜCHE i. l. 1999].

Euconnus unicus FRANZ, 1957: **Ne+**: Holtorfslöh, MEYBOHM, 15.VIII.1993 [ZIEGLER i. l. 1999]. **SH(+)**: Eintrag wurde mit Ne vertauscht [ZIEGLER i. l. 1999].

Euconnus denticornis (MÜLL. KUNZE, 1822): **St+(-)**: Weischütz/Unstrut, LAU LSA, 1996, 2 Ex. (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i. l. 1999].

Euconnus rutilipennis (MÜLL.KUNZE, 1822): **Ba.** [HARTMANN 1926].
Euconnus hirticollis (ILL., 1798): **St+(-):** mehrere Fundorte, LAU LSA, 1997, zahlreich (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i. l. 1999].

Familie PTILIIDAE

Nossidium pilosellum (MARSH., 1802): **Ba+:** Bad Boll, Wutachgebiet, KLESS, VI. und VII.1957, zahlreich aus faulen Baumschwämmen - Horberloch, BÜCHE, 18.X.1991 - weitere Fundorte: Freiburg-Ebringen, Grisheim, Weinstetten Geisingen, Unterhölzer Wald, KLESS, V-VI.1992 [KLESS 1998, 1959, BÜCHE i. l. 1999]. **Sn+:** Leipzig, Lösnig-Döllitz, Leinegraben, SPRICK, VI.95, 4 Ex. Bodenfallenfang im Mulfm einer alten, hohlen Kopfappel [coll. SPRICK, L. SCHMIDT i. l. 1999].

Ptenidium gressneri ER., 1845: **Ba+:** Belchen, 1000m, SCHILLER, VII., 4 Ex. aus hohler Weidbuche - Karlsruhe, Elfmorgenbruch, BÜCHE & NEUMANN, zahlreich 4.XI.1990 bei *Lasius fuliginosus* Karlsruhe, Hardtwald-Wildpark, BÜCHE, 16.XII.1990, mehrere Ex. in weißfaulm Eichenholz bei *Lasius brunneus* [BAUM 1989, BÜCHE i. l. 1999].

Ptenidium laevigatum ER., 1845: **Ba+:** Karlsruhe, Oberwald, BÜCHE, 15.I.1990, aus Laub gesiebt, zuvor schon mehrfach in der Umgebung von Karlsruhe [BÜCHE i. l. 1999].

Ptenidium turgidum THOMS., 1855: **SH+:** Seedorf, Schaalsee, ZIEGLER, 25.VI.1998 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Ptenidium fuscicornis ER., 1845: **St+(-):** Schollene, LAU LSA, 1996, 3 Ex. (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i. l. 1999].

Ptenidium punctatum (GYLL., 1827): **Ne+:** Seeveniederung, BURGARTH, 25.VI.1994 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Oligella foveolata (ALLIB., 1844): **Ba+:** Mühlheim-Niederweiler, NEUMANN, III.91, zahlreich [NEUMANN i. l. 1999].

Ptilium affine ER., 1845: **MV+(-):** Röggeliner Holz, ZIEGLER, 27.VI.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Ptilium myrmecophilum (ALLIB., 1844): **Ba+:** Ennersbacher Moor, SZALLIES, 18.VIII.1996, 2 Ex. Freiburg-Ebringen, Schönberg, NEUMANN, 6.IV.1997, zahlreich - Grisheim, Rheintrockenau, NEUMANN, 22.III.1997, zahlreich [MERTENS i. l. 1999].

Ptilium modestum WANK., 1869: **Ba+:** Grisheim, Rheintrockenau, NEUMANN, 25.X.1998, zahlreich (t. KÖHLER) in einer hohen Buche bei *Lasius fuliginosus* - Mühlheim-Niederweiler, NEUMANN, III.91, zahlreich [NEUMANN i. l. 1999].

Euryptilium saxonicum (GILLM., 1845): **HS+:** Neuhof, NWR Schönbusche, FLECHTER, 1990-92 [DOROW et al. im Druck].

Ptiliolum schwarzi (FLACH, 1887): **By+(-):** Rohrbrunn, Rohrberg, KÖHLER, 30.VIII.1998, 2 Ex. aus faulen Pilzen gesiebt [coll. KÖHLER].

Ptiliolum fuscum (ER., 1845): **Wt+ [MEYER 1966].**

Ptiliolum sahlbergi FLACH, 1888: **Ba+ [SZALLIES 1998].**

Bambara fusca DYBAS, 1966: **Ne+:** Holtorfslöh, MEYBOHM, 21.VIII.1997 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999]. **SH+:** Forst Beimoer, MEYBOHM, 3.VIII.1998 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Ptinella aptera (GUER., 1839): **Ba+:** Karlsruhe, Oberwald, BÜCHE, 11.II.1990, zahlreich bei *Lasius brunneus* in einer alten Eiche - weitere Fundorte: Karlsruhe, Hardtwald Mühlheim-Niederweiler Freiburg-Ebringen - Grisheim, Rheintrockenau [BÜCHE i. l. 1999, NEUMANN i. l. 1999].

Ptinella tenella (ER., 1845): **Rh+:** Welschneudorf, NWZ Stelzenbach, KÖHLER, 11.VII.1998, 1 Ex. in einer Fensterfalle [KÖHLER Stelzenbach].

Ptinella errabunda JOHNS., 1975: **SH+:** Forst Beimoer, MEYBOHM, 9.VIII.1998 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Nephanes titan (NEWM., 1834): **Ba+ [HORION 1954b].**

Baeocraira variolosa (MULS.REV, 1867): **Ba+(-):** Freiburg-Schladt, Moosalnd, NEUMANN, 2.III.1997, 1 Ex. [NEUMANN i. l. 1999]. **Hn+:** Rodewald, Lichtenheide, HAHLOHNM, 18.IX.1997, 1 Ex. [coll. HAHLOHNM, L. SCHMIDT i. l. 1999].

Baeocraira japonica (MATH., 1884): **HS+:** Schlüchtern, Kinzigau, FLECHTER, 13.IX.1997, 5 Ex. in altem Heu [FLECHTER i. l. 1999]. **Ne+:** Amt Neuhaus, Strachau, ZIEGLER, 12.VIII.1998 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Acrotrichis silvatica ROSSK., 1935: **Ba+(-):** Karlsruhe-Neureut, Rheinauwald, BÜCHE, 8.XI.1993 [BÜCHE i. l. 1999].
Acrotrichis sjoebergi SUNDT, 1958: **Ba+** [BESUCHET & SUNDT 1971].

Familie STAPHYLINIDAE

Siagonium humerale GERM., 1817: **HS+:** Frankfurt, Enkheimer Wald, 6.IX.1997, 1 Ex. unter saftfrischer Rinde einer starken entwurzelten Hainbuche [FLECHTER i. l. 1999].

Megarthrus nitidulus KR., 1858: **Pf+:** Fischbach, Staatsforst, 21.VI.1998, 35 Ex. im Autokescher [coll. KÖHLER]. **Sd+:** Saarbrücken, Saarkohlenwald, MÖLLER, VIII.1998, im Autokescher [MÖLLER i. l. 1999].

Proteinus atomarius ER., 1840: **Sd+:** Saarbrücken, Saarkohlenwald, MÖLLER, VIII.1998, 2 Ex. an faulenden Holzpilzen [MÖLLER i. l. 1999].

Micropeplus tesserula CURT., 1828: **MV+:** Röggeliner Holz, ZIEGLER, 27.VI.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Eusphalerum montivagum (HEER, 1838): **Pf+:** Ludwigswinkel, Saarbachtal, KÖHLER, 14.V.1998, 1 Ex. im Autokescher [coll. KÖHLER].

Eusphalerum sorbi (GYLL., 1810): **MV+:** Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 28.V.1994 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999]. **Pf+(-):** Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, 15.V.1998, 3 Ex. in Flugfallen [KÖHLER Mummelskopf].

Acrolocha amabilis (HEER, 1838): **Hn+(-):** Elliehausen, Börltal, WILLERS, 27.IX.1992, 1 Ex. (ZERCHE det.) in einem Buchenholzwald an Pilzen [coll. WILLERS, L. SCHMIDT i. l. 1999].

Phyllodrepa scabriuscula (KR., 1858): **Ba?:** Ibach, Hiruiwald, SZALLIES, 10.X.1995, 1 Ex. (nicht revidiert) unter verpilzter Fichtenrinde [SZALLIES 1998].

Phyllodrepa ioptera (STEPH., 1834): **MV+:** Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 28.V.1994 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Hypopygia rufila (ER., 1840): **Ne+:** Amt Neuhaus, Strachau, ZIEGLER, 16.IX.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Omalium septentrionis THOMS., 1856: **Wt+ [HORION 1961b].**

Omalium exiguum GYLL., 1810: **Pf+(-):** Ludwigswinkel, Saarbachtal, KÖHLER, 14.V.1998, 1 Ex. im Autokescher [coll. KÖHLER].

Omalium nigriceps KIESW., 1850: **Ba+ [HORION 1954b].**

Phloeonomus minimus (ER., 1839): **Ba- [HORION 1954b].**

Xylodromus depressus (GRAV., 1802): **Ba+:** Karlsruhe, Oberwald, BÜCHE, 5.IX.1992, 1 Ex. aus Wurzelzischen alter Laubbäume gesiebt [BÜCHE i. l. 1999].

Xylodromus testaceus (ER., 1840): **Wt+ [MEYER 1966].**

Phyllodrepa crenata (GRAV., 1802): **Ba+ [SCHILLER 1989].**

Olophrum alpinum (HEER, 1838): **Ba+ [HORION 1961b]. Wt+ [SZALLIES 1998].**

Lesteva luctuosa FAUV., 1869: **Ba+ [HORION 1961b].**

Lesteva pubescens MANNH., 1830: **Pf+(-):** Ludwigswinkel, Mummlenseeabfluß, KÖHLER, 17.V.1998, 8 Ex. [coll. KÖHLER].

Eudectus giraudi REDT., 1858: **By+(-):** Mitterteich, NWR Gitschger, KÖHLER, 25.VI.1998, mehrfach am Fuße alter Bergahorne [KÖHLER Oberpfalz]. **Hn- [HORION 1963]. Hs+ [HINTERSEHER 1979]. Wt-:** Falschmeldung [HORION 1961].

Coryphium greedleri KR., 1870: **By-:** Falschmeldung [HORION 1963].

Boreaphilus velox HEER, 1838: **By-:** Falschmeldung [HORION 1963].

Ochtheiphilus flexuosus (FAIRM.LAB., 1854): **Pf+:** Ludwigswinkel, Saarbachtal, KÖHLER, 20.VI.1998, 1 Ex. im Autokescher [coll. KÖHLER].

Carpelimus fuliginosus (GRAV., 1802): **Ba+:** Bodenseegebiet bei Überlingen, HORION, VI.1944, mehrfach aus Kompost - Karlsruhe, Hardtwald-Fasanengarten, BÜCHE, 7.IV.1987, 1 Ex. gekeeschert [HORION 1954b, BÜCHE i. l. 1999].

Carpelimus subtilicornis (ROUB., 1946): **Pf+:** Fischbach, Staatsforst, KÖHLER, 21.VI.1998, 1 Ex. im Autokescher [coll. KÖHLER].

Carpelimus ganglbaueri (BERNH., 1901): **Th+ [CUPPEN et al. 1998].**

Carpelimus despectus (BAUDI, 1869): **St+:** Beendorf, Salzstelle, BÜCHE, 1.VII.1996, 1 Ex. aus einer vegetationsarmen Lehmböschung gestochen [BÜCHE i. l. 1999].

Thinodromus distinctus (FAIRM.LAB., 1854): **Wt-:** Stuttgart, v.d. TRAPPEN, XII.1919, 1 Ex. aus Neckargenist, ob autochthon? [HORION 1961b].

- Oxytelus sculptus* GRAV., 1806: **Pf+(-)**: Ludwigswinkel, Saarbachtal, KÖHLER, 20.VI.1998, 2 Ex. im Autokescher [KÖHLER i. l. 1998].
- Oxytelus migrator* FAUV., 1904: **Hs+**: Hanau-Steinheim, DEHNERT, 16.X.1986, 1 Ex. (coll. HÖHNER) [HÖHNER i. l. 1998].
- Anotylus pumilus* (ER., 1839): **Wt+** [MEYER 1966].
- Anotylus hamatus* (FAIRM.LAB., 1856): **Ba+** [HORION 1954b].
- Platystethus degener* MULS.REY, 1879: **Ba+**: Grissheim, Rheinufer, BÜCHE, 9.V.1997, 2 Ex. unter vertrockneten Algenwatten [BÜCHE i. l. 1999].
- Platystethus nodifrons* MANNH., 1831: **Hn(-)**: Fehldetermination (ASSING kor.) alter Status bleibt erhalten [STIPPICH & KROOSS 1998].
- Bledius longulus* ER., 1839: **St+(-)**: Walbeck, Kalksteinbruch, BÜCHE, 24.VII.1996, 1 Ex. [BÜCHE i. l. 1999].
- Bledius femoralis* (GYLL., 1827): **Wt-** [HORION 1961b].
- Bledius baudii* FAUV., 1870: **MV+**: Duvennest, ZIEGLER, 8.VIII.1996 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].
- Thinobius praetor* SMET., 1959: **Ba+** [SCHILLER 1979b, SCHÜLKE 1998a]. **St-** [SCHÜLKE 1998a].
- Thinobius atomus* AUCT.NEC Fauv., 1869: **Br(-)**: ohne genitaliter überprüfte Belege zu verwerfen [SCHÜLKE 1998a]. **Sn(-)**: ohne genitaliter überprüfte Belege zu verwerfen [SCHÜLKE 1998a].
- Thinobius gilvus* FAUVEL, 1899: **St?**: Bad Kösen, 2 Ex. im Mus. Berlin (MNHUB), Vorkommen aber fraglich [SCHÜLKE 1998a].
- Oxyporus maxillosus* F., 1792: **Pf+(-)**: Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, 15.V.1998, 3 Ex. an Blätterpilzen auf Totholz [KÖHLER Mummelskopf].
- Stenus gracilipes* KR., 1857: **Ba-** [HARTMANN 1926].
- Stenus palpus* ZETT., 1838: **Wt-** [HORION 1961b].
- Stenus incanus* ER., 1839: **Ba+(-)** [HORION 1963].
- Stenus opticus* GRAV., 1806: **Ba-(-)** [HORION 1963].
- Stenus niveus* FAUV., 1865: **Hs+**: Herbstine, HÖHNER, 30.V.1998, 1 Ex. an Sauergräsern [HÖHNER i. l. 1998].
- Stenus glacialis* HEER, 1839: **Wt+** [HORION 1961b].
- Stenus montivagus* HEER, 1839: **Sd+**: Saarhölzbach, Nähe Steinbruch, LILLIG, 25.VI.1998, 1 Ex. (t. EISINGER) [coll. LILLIG, EISINGER i. l. 1999].
- Dianous coerulescens* (GYLL., 1810): **Pf+**: Ludwigswinkel, Mummelsseabfluß, KÖHLER, 17.V.1998, 5 Ex. [coll. KÖHLER].
- Edaphus beszedesi* RTT., 1913: **Hs+**: Hanau, DEHNERT, 17.X.1970, 4 Ex. (coll. HÖHNER) [HÖHNER i. l. 1998].
- Euaesthetus bipunctatus* (LJUNGH, 1804): **St+(-)**: Kühmernitz, LAU LSA, 1997, 1 Ex. (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i. l. 1999].
- Paederus caligatus* ER., 1840: **Ba-** [HORION 1965].
- Astenus longelytratus* PALM., 1936: **Ba+**: Rheintrockenaue, viele Fundorte, mehrere Finder [NEUMANN i. l. 1999].
- Rugilus angustatus* (FOURCR., 1785): **MV+(-)**: Duvennest, ZIEGLER, 29.VI.1992 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].
- Medon castaneus* (GRAV., 1802): **Ba+**: Wasenweiler nw. Freiburg, MAUS, 2.I.1997, 4 Ex. aus *Talpa*-Nest [unpubl.]. **Wt+** [HORION 1961b].
- Medon piceus* (KR., 1858): **MV+**: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 27.VII.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999]. **Rh+** [KÖHLER 1996g].
- Medon fusculus* (MANNH., 1830): **Sd+**: Saarbrücken, Trarbacher Platz, EISINGER, 12.V.1998 und 29.VIII.1998, 2 Ex. (KÖHLER det.) am Kompost angeflogen [coll. EISINGER].
- Medon rufiventris* (NORDM., 1836): **St+(-)** [SCHÜLKE 1998b].
- Medon apicalis* (KR., 1857): **MV+**: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 27.VII.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].
- Sunius propinquus* (BRIS., 1867): **Ba-** [HORION 1965].
- Pseudomedon obscurellus* (ER., 1840): **MV+**: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 28.V.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].
- Scopaeus sulcicollis* (STEPH., 1833): **MV+**: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 28.V.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].
- Scopaeus pusillus* KIESW., 1843: **Ba+**: Grissheim, Rheintrockenaue, NEUMANN, 2.III.1997, zahlreich gerne in der Nähe von *Formica*-Nestern und BÜCHE, 15.V.1997, 1 Ex. auf einem Kiestrockenrasen [NEUMANN i. l. 1999, BÜCHE i. l. 1999].
- Scopaeus ryei* WOLL., 1872: **St+** [SCHÜLKE 1998c].
- Scopaeus gracilis* (SPERK., 1835): **Pf+(-)**: Ludwigswinkel, Saarbachtal, KÖHLER, 14.V.1998, 1 Ex. im Autokescher [coll. KÖHLER].
- Lathrobium bicolor* ER., 1840: **Ba+(-)**: Grissheim, Rheintrockenaue, SZALLIES, 2.VII.1997, 1 Ex. an einem Kiesgrubenfuß [NEUMANN i. l. 1999].
- Lathrobium angustum* BOISD. LAC., 1835: **Ba+** [SCHILLER 1989].
- Lathrobium sphagnorum* MUONA, 1977: **Ba-** [HARTMANN 1926].
- Lathrobium dilutum* ER., 1839: **Hs+(-)**: Langgöns, STORCK, 18.VII.1989, 1 Ex. in einer Köderdose (coll. HÖHNER) [HÖHNER i. l. 1998].
- Achenium depresso* (GRAV., 1802): **Ba-** [HARTMANN 1911].
- Cryptobium collare* RTT., 1884: **Ba+**: Grissheim, Rheintrockenaue, SZALLIES, 16.VII.1995, 1 Ex. (t. KASPER) [NEUMANN i. l. 1999]. **St+** [SCHÜLKE 1998c].
- Metoponcus brevicornis* (ER., 1839): **Wt+**: Wangen, Argental bei Blumegg, BENSE, 25.VI.1997, 1 Ex., an einem Nadelholzstamm [BENSE i. l. 1999].
- Xantholinus glabratus* (GRAV., 1802): **Ba+** [HORION 1961b].
- Xantholinus semirufus* (RTT.) STEEL, 1950: **Ba+**: Lörrach, BREDDIN, VIII.1935, 1 Ex. - Stühlingen, Wutachgebiet, HORION, V.1955, 1 Ex. Sandhausen, Dünengebiet, BÜCHE, zahlreich in Bodenfallen Grissheim, Rheintrockenaue, NEUMANN, 7.VI.1991, zahlreich (t. BÜCHE) [HORION 1965, BÜCHE 1994, NEUMANN i. l. 1999].
- Atrecus longiceps* (FAUV., 1872): **Ba+(-)** [SCHILLER 1989].
- Othius lapidicola* MAERK.KIESW., 1848: **Wt+** [HORION 1961b].
- Ericsonius subopacus* (HOCHH., 1851): **Hs-** [UHLIG & STERRENBURG 1990].
- Hesperus rufipennis* (GRAV., 1802): **Sd+**: Saarbrücken, Waldschutzgebiet Steinbachtal, MÖLLER, Funddaten unbekannt [coll. MÖLLER, EISINGER i. l. 1999].
- Philonthus ebeninus* (GRAV., 1802): **Hn(-)**: Fehldetermination (ASSING kor.), alter Status bleibt erhalten [STIPPICH & KROOSS 1998].
- Philonthus nigritrinitatis* THOMS., 1867: **Rh+**: Weinschneudorf, NWZ Stelzenbach, KÖHLER, 4.VI.1998, 3 Ex. an ausgelegtem Taubenmist [KÖHLER Stelzenbach].
- Philonthus rufimanus* ER., 1840: **Wt-** [HORION 1961b].
- Philonthus micantoides* BEN. LOHSE, 1956: **Hn(-)**: Fehldetermination (ASSING kor.) [STIPPICH & KROOSS 1998]. **Rh+**: Spay, Rheinbogen, KÖHLER, 6.VI.1998, 1 Ex. im Autokescher [coll. KÖHLER].
- Rabigus pullus* (NORDM., 1837): **Ba+(-)**: Istein, Rheinaue, SCHILLER [NEUMANN i. l. 1999]. **Hs+(-)**: Viernheimer Heide, HÖHNER, 23.IX.1995, 6.X.1995 und 24.IX.1998, 4 Ex. auf Binnendünen [HÖHNER i. l. 1998].
- Gabronthus thermarum* (AUBE, 1850): **Hs+(-)**: Hanau, Große Bulau, DEHNERT, 6.IX.1969, 1 Ex. (coll. HÖHNER) [HÖHNER i. l. 1998]. **Sd+**: Saarbrücken, Trarbacher Platz, EISINGER, 6.IX.1998, 1 Ex. (KÖHLER det.) aus Grasschnitt gesiebt [coll. EISINGER]. **Wt-** [HORION 1961b].
- Gabrius exiguus* (NORDM., 1837): **Ba+** [HORION 1965].
- Gabrius tiroensis* (LUZE, 1969): **Rh+**: Ahrbrück, Dennbachtal, KÖHLER, 12.V.1998, 2 Ex. im Autokescher [coll. KÖHLER].
- Gabrius astutoides* (STRAND, 1946): **Pf+(-)**: Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, 14.V.1998, 1 Ex. im Autokescher [KÖHLER Mummelskopf]. **Sd+(-)**: die einzige Meldung wurde zurückgezogen [EISINGER i. l. 1999].
- Gabrius lividipes* (BAUDI, 1848): **Ba+**: Grissheim, Rheintrockenaue, SZALLIES, 16.V.1997, 1 Ex. im Autokescher [NEUMANN i. l. 1999].
- Gabrius suffragani* JOY, 1913: **Hn-**: Fehldetermination (ASSING kor.) [STIPPICH & KROOSS 1998].
- Creophilus maxillosus* (L., 1758): **Sd+**: Saarbrücken, Talstrasse, EISINGER, 5.V.1992, 1 Ex. Totfund [coll. EISINGER].
- Platydacus chalcocephalus* (F., 1801): **Th+(-)**: Bad Frankenhausen, SW-Kyffhäuser, FRISCH, 1994 [SCHAFFRATH i. l. 1999].
- Ocyphus tenebriosus* (GRAV., 1846): **Pf+(-)**: Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, 19.VIII.1998, 5 Ex. unter liegendem Buchentotholz [KÖHLER Mummelskopf].
- Ocyphus globulifer* (FOURCR., 1785): **Ba-** [HARTMANN 1911].
- Heterothops quadripunctulus* (GRAV., 1806): **Ba-** [HORION 1965].
- Heterothops minutus* WOLL., 1860: **MV+**: Pritzier, ZIEGLER, 4.I.1999 [ZIEGLER i. l. 1999].
- Astrapaeus ulni* (ROSSI, 1790): **Ba-** [HORION 1965].

- Velleius dilatatus* (F., 1787): **Th+(-)**: Plaue, SCHAFFRATH, 1996 [SCHAFFRATH i. l. 1999]. **Wt+** [HORION 1961b, OSTEN 1992].
- Quedius truncicola* FAIRM. & Lab., 1856: **Pf+(-)**: Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, 11.X.1998, 1 Ex. in einer Fensterfalle [KÖHLER Mummelskopf].
- Quedius brevicornis* THOMS., 1860: **Hn+(-)**: Hannover-Eilenriede, Stadtspark, ASSING, 8.V.1998, 1 Ex. in einer hohlen Eiche [coll. ASSING, L. SCHMIDT i. l. 1999].
- Quedius ochropterus* ER., 1840: **Ba+** [SZALLIES 1998].
- Quedius limbatus* (HEER, 1834): **Ba?**: Feldberggebiet, HORION & KARDASCH - Heidelberg, HÜTHER, IX.1935 - Überlingen, Bodensee, HORION, seit 1943 mehrfach - Zastlertal, Präg. MOLEND (Bestimmung fraglich) [HORION 1951b, 1965, MOLEND 1996].
- Quedius humeralis* STEPH., 1832: **Sd+**: Saarbrücken, Trarbacher Platz, EISINGER, 27.VIII.1998, 1 Ex. (KÖHLER det.) aus Grasschnitt gesiebt [coll. EISINGER].
- Quedius alpestris* (HEER, 1839): **Ba+(-)** [HORION 1965].
- Quedius auricomus* KIESW., 1850: **Hn+(-)**: Umg. Goslar, JUNG, 1994, 1 Ex. [JUNG i. l. 1999].
- Quedius semiaeneus* (STEPH., 1833): **Wt+(-)** [HORION 1961b].
- Quedius semiobscurus* (MARSH., 1802): **Ba+** [HORION 1965].
- Aclyphorus wageneri* KIESW., 1850: **Ne+**: Brambostel, ZIEGLER u.a., 21.I.1998 [ZIEGLER i. l. 1999].
- Aclyphorus glaberrimus* (Hbst., 1784): **Wt-** [HORION 1961b].
- Atanygnathus terminalis* (ER., 1839): **No+**: Wesel, Diersfordter Wald, KATSCHAU, 26.VIII.1998, 1 Ex. aus Sphagnum in einem Waldmoor [KATSCHAU mdl. Mitt. 1998].
- Trichophya pilicornis* (GYLL., 1810): **MV+**: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 27.VII.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].
- Mycetoporus baudueri* MULS.REY, 1875: **Rh+**: Taben-Rodt/Saar, Urwald von Taben, KÖHLER, 20.IX.1997, 2 Ex. auf einer Blockhalde aus Moospolstern [KÖHLER Taben].
- Mycetoporus bruckii* (PAND., 1869): **Ba+** [SCHILLER 1989].
- Bryoporus cernuus* (GRAV., 1806): **Ne+(-)**: Forst Landwehr, Grippel, ZIEGLER, 9.V.1998 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].
- Bryophacis crassicornis* (MAEKL., 1847): **Ba+** [SCHILLER 1989].
- Bryophacus rufus* (ER., 1839): **Ba+(-)**: Hotzenwald, SZALLIES [MERTENS i. l. 1999].
- Lordithon pulchellus* (MANNH., 1830): **MV+**: Gothmann, ZIEGLER, 1.VI.1994 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].
- Carphasis striatus* (OL., 1794): **Pf+**: Schaidt, NWR Stuttpferch, KÖHLER, 31.VIII.1997, 4 Ex. aus einem frischen Riesenporling an einer Buche [KÖHLER Bienwald].
- Bolitobius inclinans* (GRAV., 1806): **Pf+**: Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, 11.X.1998, 1 Ex. aus Blätterpilzen gesiebt [KÖHLER Mummelskopf].
- Sepedophilus pedicularius* (GRAV., 1802): **Ba+(-)**: Kleinkems, Rheintrockenau, BÜCHE & ESSER, 3.XI.1997, zahlreich [NEUMANN i. l. 1999].
- Tachyporus quadriscopulatus* PAND., 1869: **Wt+** [HORION 1967].
- Lamprinodes saginatus* (GRAV., 1806): **Ba-** [HORION 1967].
- Lamprinodes haematopterus* (KR., 1857): **Ba-** [HORION 1967].
- Lamprinus erythropterus* (PANZ., 1796): **Ba+**: Grissheim, Rheintrockenau, SZALLIES, 16.IX.1995 und 14.VII.1996, 3 Ex. [NEUMANN i. l. 1999].
- Tachinus proximus* KR., 1855: **MV+**: Röggeliner Holz, ZIEGLER, 25.VI.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].
- Myllaena dubia* (GRAV., 1806): **Sd+**: Saarbrücken, Nauwies, EISINGER, 25.I.1997, 1 Ex. aus Laub [coll. EISINGER].
- Pronomaea korgei* LOHSE, 1974: **Ba-** [KÖHLER 1997d].
- Holobus flavicornis* (BOISD.LAC., 1835): **MV+**: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 27.VII.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].
- Holobus apicatus* (ER., 1837): **Hs+**: Traisa, Trautheim, HANSEN, 14.V.1963, 1 Ex. im Autokescher (coll. HÖHNER) [HÖHNER i. l. 1998]. **St+**: Seebenauer Holz, ZIEGLER, 7.VII.1993 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].
- Cypha ovalum* (HEER, 1839): **Ba-** [HORION 1967].
- Cypha seminula* (ER., 1839): **Ba?**: vier Fundorte in Südbaden um 1910, Belege im Museum Dresden sollten geprüft werden [HARTMANN 1911, NEUMANN i. l. 1999].
- Cypha punctum* (MOTSCH., 1857): **Pf+**: Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, MATERN, 2.VII.1998, 2 Ex. (KÖHLER det.) im Autokescher [KÖHLER Mummelskopf].
- Gyrophaena rousi* DVORAK, 1966: **Ba+** [SZALLIES 1998].
- Gyrophaena munsteri* STRAND, 1935: **Ba?**: Zastlertal und Feldberg, HORION, wahrscheinlich 1950/52, später (HORION 1967) nicht mehr gemeldet [HORION 1954b, 1967]. **Pf+**: Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, 15.V.1998, 45 Exemplare an *Pleurotes* sp. [KÖHLER Mummelskopf].
- Gyrophaena transversalis* STRAND, 1939: **Hn+(-)** [ASSING 1998b].
- Gyrophaena joyi* WENDELER, 1924: **Pf+**: Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, MATERN, 2.VII.1998, 2 Ex. (KÖHLER det.) im Autokescher [KÖHLER Mummelskopf].
- Gyrophaena angustata* (STEPH., 1832): **Pf+**: Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, 15.V.1998, 24 Exemplare an *Pleurotes* sp. [KÖHLER Mummelskopf].
- Agaricochara latissima* (STEPH., 1832): **Hs+(-)**: Gettenbach, Gelnhausen, HÖHNER, 21.XII.1993 an *Criolus versicolor*, weitere Funde [HÖHNER i. l. 1998].
- Cyphella curvula* (ER., 1837): **MV+**: Röggeliner Holz, ZIEGLER, 25.VI.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999]. **Wt+** [MALZACHER 1990].
- Placusa depressa* MAEKL., 1845: **Ba+(-)** [HORION 1954b].
- Placusa incompleta* SJÖB., 1934: **No(?)**: geprüfte Belege gehören zu *Placusa tachyporooides* [KÖHLER 1998e]. **Rh(?)**: geprüfte Belege gehören zu *Placusa tachyporooides* [KÖHLER 1998e]. **Sd(+)**: sicher Fehlbestimmung [KÖHLER 1998e].
- Silusa rubiginosa* ER., 1837: **Pf+(-)**: Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, 15.V.1998, 1 Ex. in einer Flugfalle [KÖHLER Mummelskopf].
- Megaloscapa punctipennis* (KR., 1856): **Ba+**: Munzingen, Tübingen, MAUS, 3.IV.1988, 1 Ex. [MAUS i. l. 1999]. **Wt+** [MEYER 1966].
- Leptusa norvegica* STRAND., 1941: **Wt+** [MEYER 1966].
- Euryusa castanoptera* KR., 1856: **Ba+**: Grenzach-Wyhlen, SCHILLER, 26.IV.1977, 1 Ex. unter Rinde einer morschen Buche - Grissheim, Rheintrockenau, SZALLIES, 10.VI.1997, 1 Ex. (t. KASPER) [SCHILLER 1979, NEUMANN i. l. 1999]. **Ne+**: Radbruch, MEYBOHM, 22.IV.1998 [ZIEGLER i. l. 1999].
- Euryusa sinuata* ER., 1837: **Ba-** [HARTMANN 1911].
- Euryusa pipitzi* (EPHP., 1887): **Pf+**: Schaidt, Bienwald, NWR Stuttpferch und Mörderhäufel, KÖHLER, 29.VI.1996, je 1 Ex. (ASSING det.) [KÖHLER Bienwald].
- Bolitochara multiseta* SHP., 1875: **Wt+** [HORION 1967].
- Myrmececephalus concinna* (ER., 1839): **Rh+**: Spay, Rheinbogen, KÖHLER, 6.VI.1998, 1 Ex. im Autokescher [coll. KÖHLER].
- Borboropora kraatzii* FUSS, 1862: **Ba+** [SZALLIES 1998].
- Gnypeta ripicola* (KIESW., 1844): **MV+**: Pritzier, ZIEGLER, 4.I.1999 [ZIEGLER i. l. 1999].
- Hydrosticta septentrionum* (BENICK, 1969): **Pf+**: Fischbach, Staatsforst, 21.VI.1998, 1 Ex. im Autokescher [coll. KÖHLER].
- Disopora ultima* (BENICK LOHSE, 1959): **MV+**: Bandekow, ZIEGLER, 5.II.1995 [ZIEGLER i. l. 1999].
- Aloconota planifrons* (WTRH., 1864): **Ba+**: Grissheim, Rheintrockenau, SZALLIES, 7.IV.1996 und 10.VI.1997, 2 Ex. (t. KASPER) [NEUMANN i. l. 1999].
- Notothecta confusa* (MÄRK., 1844): **Ba+**: Weinstetten, Rheinaue, BÜCHE, 2.XI.1997, 1 Ex. an einem Nest von *Lasius fuliginosus* [BÜCHE i. l. 1999].
- Neohilara subterranea* (MULS. REY, 1853): **Hs+**: Rheinsel Kühhkopf, VOGT, 29.I.1955 und Schlütern, BORNHOLT, 9.VII.1987, je 1 Ex. (coll. HÖHNER) [HÖHNER i. l. 1998].
- Dochmonota clancula* (ER., 1837): **Pf+**: Schaidt, NWR Stuttpferch, KÖHLER, 31.VIII.1997, 28 Ex. aus Reisig, Streu und Detritus in einem trocken gefallenen Wassergraben [KÖHLER Bienwald].
- Taxicera remeri* BENICK, 1982: **Ba-**: Grissheim, Rheintrockenau, SZALLIES, 9.VII.1997, 1 Ex. (t. KASPER) im Autokescher [NEUMANN i. l. 1999].
- Dinaraea arcana* (ER., 1839): **Ba-**: Fahrnau bei Schopfheim/Wiesental, HARTMANN, 5.V.1910 [HARTMANN 1911].

Liogluta pagana (ER., 1839): **Sd+**: Saarbrücken, Trarbacher Platz, EISINGER, 25.X.1998, 1 Ex. (KÖHLER det.) aus Kirschbaumlaub gesiebt [coll. EISINGER].

Aetheta hygrobia (THOMS., 1856): **Pf+**: Schaidt, NWR Stuttpferch, KÖHLER, 31.VIII.1997, 7 Ex. aus Detritus in einem trockengefallenen Graben [KÖHLER Bienwald].

Aetheta tmolosensis BERNH., 1940: **MV+**: Röggeliner Holz, ZIEGLER, 25.VI.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Aetheta volans (SCRIBA, 1859): **Pf+**: Schaidt, NWR Mörderhäufel, KÖHLER, 31.VIII.1997, 6 Ex. aus Detritus in einem Entwässerungsgraben [KÖHLER Bienwald].

Aetheta debilis (ER., 1837): **MV+**: Gothmann, ZIEGLER, 1.VI.1994 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Aetheta scotica (ELL., 1909): **Ba+**: Grissheim, Rheintrockenau, SZALLIES, 10.VI.1997, 2 Ex. im Autokescher [NEUMANN i. l. 1999].

Aetheta soedermani BERNH., 1931: **By+**: Kallmünz, Raffa-Waldgebiet, RENNER, 30.V.1998, 1 Ex. im Autokescher [RENNER i. l. 1999].

Aetheta volitans BENICK, 1970: **Ba+ (?)** [SCHILLER 1989].

Aetheta atricolor (SHP., 1869): **Ba+** [SCHILLER 1989].

Aetheta testaceipes (HEER, 1841): **Ba+**: Weinstetten, Rheintrockenau, SZALLIES, 2.VII.1997, 1 Ex. an einem Lamellenpilz - Grissheim, Rheintrockenau, SZALLIES, 25.V.1995, 1 Ex. im Autokescher [NEUMANN i. l. 1999]. **Hs+:** Schlüchtern, Hohenzell, BORNHOLDT, 17.VI.1987, 3.VII.1987 und 11.VII.1988, 4 Ex. (coll. HÖHNER) [HÖHNER i. l. 1998]. **Wt+** [MEYER 1966].

Aetheta pervagata BENICK, 1974: **Ba+:** Jöhlingen, GREILER, VI.90, 2 Ex. (det. coll. BÜCHE) [BÜCHE i. l. 1999].

Aetheta viennensis BENICK, 1974: **Ba?:** Grissheim, Rheinaue, SZALLIES, 10.VI.1997, 1 Ex. im Autokescher (ungeprüft) [SZALLIES 1998].

Aetheta hansseni STRAND, 1943: **Ba+** [SCHILLER 1989].

Aetheta subglabra (SHP., 1869): **Hs+ (-):** Rudingshain, NWR Nidähange, FLECHTNER, 1990-92 [FLECHTNER et al. 1993].

Aetheta fussi BERNH., 1908: **Ba?:** Grissheim, Rheinaue, SZALLIES, 9.VII.1997, 1 Ex. im Autokescher (ungeprüft) [SZALLIES 1998].

Aetheta orbata (ER., 1837): **Hn+:** NSG Lüneburger Heide, Tütsberg, MELBER, 1997, mehrfach (ASSING det.) in Bodenfallen [coll. ASSING, L. SCHMIDT i. l. 1999].

Aetheta orphana (ER., 1837): **Sd+:** Saarbrücken, Saarkohlenwald, MÖLLER, VIII.1998, 1 Ex. im Autokescher [MÖLLER i. l. 1999].

Aetheta amblystegii BRUNDIN, 1952: **Ba?:** Bestimmung unsicher [GADITSCH 1978].

Aetheta subsinuata (ER., 1839): **Ba-** [HARTMANN 1911].

Aetheta zosterae (THOMS., 1856): **Hs+ (-):** Heussenstamm, FLECHTNER, 16.VIII.1998, mehrfach im Ufersand einer aufgelassenen Sandgrube [FLECHTNER i. l. 1999].

Aetheta sordidula (ER., 1837): **Pf+ (-):** Schaidt, NWR Stuttpferch, KÖHLER, 27.V.1997, 30 Ex. aus ausgelegtem Taubenmist [KÖHLER Bienwald].

Aetheta laevicauda SAHLB., 1876: **Hs+:** Rudingshain, NWR Nidähange, FLECHTNER, 1990-92 [FLECHTNER et al. 1995].

Aetheta xanthopus (THOMS., 1856): **Ba+:** Grissheim, Rheintrockenau, SZALLIES, 6.IV.1996 und 9.VII.1997, je 1 [NEUMANN i. l. 1999].

Aetheta fimorum (BRIS., 1860): **Wt+** [HEMANN 1979].

Aetheta intermedia (THOMS., 1852): **Hs+:** Rudingshain, NWR Nidähange, FLECHTNER, 1990-92 [FLECHTNER et al. 1993].

Aetheta leonhardi BERNH., 1911: **Ba+** [HORION 1951b, SCHILLER 1989, MOLENDA 1996].

Acrotona pseudotenera (CAM., 1933): **Wf+:** Werther-Isingdorf, Teutoburger Wald, RENNER, 23.IV.1998, 1 Ex. im Autokescher [RENNER i. l. 1999].

Acrotona parvula (MANNH., 1831): **Hs+ (-):** Neuhof, NWR Schönbusche, FLECHTNER, 1990-92 [DORFORF et al. im Druck].

Aleuonota rufostacea (KR., 1856): **Ba+:** Grissheim, Rheintrockenau, LAU, 9.IV.1995, 1 Ex. (t. KASPER) Kandern, Wolfschlucht, HARTMANN, 1.V.1920 [NEUMANN i. l. 1999, HARTMANN 1926].

Zyras laticollis (MÄRK., 1844): **Hs+ (-):** Dietesheim, 28.VIII.1984, Enkheimer Ried 11.XII.1984 und Hanau, 17.V.1984, jew. SCHROTH leg. (COLL. HÖHNER) [HÖHNER i. l. 1998].

Hyobates nigricollis (PAYK., 1800): **Th+ (-):** Ichstedt, SW-Kyffhäuser, FRISCH, 1994 [SCHAFFRATH i. l. 1999].

Calodera nigrita MANNH., 1830: **MV+:** Röggeliner Holz, ZIEGLER, 25.VI.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Calodera uliginosa ER., 1837: **Ba-** [HORION 1967].

Ityocara rubens (ER., 1837): **MV+:** Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 26.VI.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Amarochaera forticornis (BOISD. LAC., 1835): **Ba+** [SCHILLER 1979b].

Meotica winkleri BENICK, 1954: **SH+ (?)**: St.Peter-Ording, ZIEGLER, 17.V.1980, Bestimmung ist nach LOHSE sicher [ZIEGLER i. l. 1999].

Zoosetha procidea (ER., 1837): **MV** [ASSING 1998a].

Zoosetha conspicua (ER., 1839): **SH+** [ASSING 1998a].

Hygropora cunctans (ER., 1837): **MV+ (-):** Gütze, ZIEGLER, 12.III.1999 [ZIEGLER i. l. 1999].

Oxypoda lugubris KR., 1856: **Ba+** [HORION 1954, SCHILLER 1989].

Oxypoda skalitzkyi BERNH., 1902: **Hs+:** [FLECHTNER et al. 1993, HORION 1967].

Oxypoda vicina KR., 1856: **Hs+ (-):** Frankfurt-Schwanheim, 12.X.1985, 1 Ex. und Viernheimer Heide, HÖHNER, 23.IX.1995, 2 Ex. auf Binnendüne [HÖHNER i. l. 1998].

Oxypoda mutata SHARP, 1871: **Ba+ (-):** Grissheim, Rheintrockenau, SZALLIES, 10.VI.1997, 1 Ex. (t. KASPER) [NEUMANN i. l. 1999].

Oxypoda flavicornis KR., 1856: **Pf+:** Ludwigswinkel, NWR Mummlskopf, KÖHLER, 11.X.1998, 4 Ex. aus Pilzen und Bodenstreu gesiebt [KÖHLER Mummlskopf].

Thiasophila inquilina (MÄRK., 1842): **Ba-:** Überlingen, HORION, VIII.1944, 1 Ex. schwärzend [HORION 1954b]. **Hs+ (-):** Frankfurt, Seckbacher Ried, 14.VI.1985 und Lämmerspiel, 9.VII.1983, jew. SCHROTH, 1 Ex. (coll. HÖHNER) [HÖHNER i. l. 1998].

Haploglossa genitilis (MÄRK., 1844): **SH+ (-):** Fitzen, ZIEGLER, 22.IV.1996 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Haploglossa nidicola (FAIRM., 1852): **Rh+ (-):** [KÖHLER 1998g].

Haploglossa marginalis (GRAV., 1806): **Pf+ (-):** Ludwigswinkel, NWR Mummlskopf, KÖHLER, 22.VII.1998, 5 Ex. in einer Flugfalle mit Taubenmistköder [KÖHLER Mummlskopf].

Aleochara lata GRAV., 1802: **By+ (-):** [PESCHKE & FULDNER 1977].

Aleochara laticornis KR., 1856: **Ba? (-):** Kaiserstuhlgebiet, WOLF leg. (HORION 1967) ist Fehldet. (t. MAUS), Heidelberg, HÜTHER, 1930 (l.c.) ? [MAUS i. l. 1998].

Aleochara spissicornis ER., 1839: **Wf+:** Ossendorf, Heinberg, RENNER, I.X.1981, 1 Ex. in Bodenfallen [RENNER mdl. Mitt. 1998].

Aleochara stichala LIKOVSKY, 1965: **Sd+:** Saarbrücken, WaldSG Steinbachtal, MÖLLER, Fundumstände unbekannt [coll. MÖLLER, EISINGER i. l. 1999].

Aleochara laevigata GYLL., 1810: **Hs+ (-):** Hanau, Kleine Bulau, HÖHNER, 22.IV.1987, 2 Ex. Hasenkadaver [HÖHNER i. l. 1998].

Aleochara haemoptera KR., 1856: **Ba+:** Istein, Neuenburg, Grissheim, mehrere Finder, VIII.98, zahlreich (t. MAUS) [NEUMANN i. l. 1999].

Aleochara cunicolorum KR., 1858: **MV+ (-):** Drönnewitzer Holz, ZIEGLER, 24.IV.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Aleochara major FAIRM., 1857: **St+:** Athenstedt, LAU LSA, 1997, zahlreich (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i. l. 1999].

Aleochara binotata KR., 1856: **Sd-:** Saarbrücken, Lass, V. 1941, 1 Ex. (coll. Mus. Berlin) [MAUS 1996].

Aleochara verna SAY, 1836: **Br-** [MAUS 1998a]. **Th+** [MAUS 1998a].

Familie PSELAPHIDAE

Bibloporus ultimus GUILLB., 1892: **Pf+ (-):** Ludwigswinkel, NWR Mummlskopf, KÖHLER, IV.-VII.98, mehrfach aus Laubholzmulm gesiebt [KÖHLER Mummlskopf].

Bibloporus minutus RAFFR., 1914: **By+:** Falkenstein, Frankenberg, RENNER, 6.VI.1998, 1 Ex. im Autokescher [RENNER i. l. 1999].

Bibloporus mayeti GUILLE., 1888: **S+**: Thallwitz, Oberlauch, BENSE, 23.VII.1997, 1 Ex., am Leimring [BENSE i. l. 1999].
Bibloplectus pusillus (DENNY, 1825): **Pf+(-)**: Schaidt, NWR Mörderhäufel, KÖHLER, 28.IX.1997, 4 Ex. aus einem vertrockneten Schweißelporling an Eiche [KÖHLER Bienwald].

Euplectus decipiens RAFFR., 1910: **Ba+**: Ruhestein, Bannwald Wilder See, BENSE, 24.VII.1995, 1 Ex [BENSE i. l. 1999].

Euplectus sparsus BES., 1964: **Rh+**: Welschnedorf, NWZ Stelzenbach, KÖHLER, 20.VII.19 im Autokescher und 8.VIII.1998, 5 Ex. in Fensterfallen [KÖHLER Stelzenbach].

Euplectus infirmus RAFFR., 1910: **Ba+**: Grissheim, Rheintrockenäue, SZALLIES, 14.VII.1996, 3 Ex. am Fuss einer morschen Eiche, später auch mehrfach im Autokescher [NEUMANN i. l. 1999].

Euplectus bonvouloiri RTT., 1881: **Ba+**: Grissheim, Rheintrockenäue, SZALLIES, 9.VII.1997, 1 Ex. im Autokescher [NEUMANN i. l. 1999]. **Br+** [PÜTZ 1989a].

Euplectus duponti AUBÉ, 1833: **Rh+(-)** [KÖHLER 1998].

Leptoplectus spinolae (AUBÉ, 1844): **Ba+**: Freiburg-Opfingen, Mooswald, NEUMANN, 9.V.1997, 1 Ex. bei *Lasius brunneus* in rotmorscher Eiche [NEUMANN i. l. 1999]. **Hs+** [FLECHTNER et al. 1993]. **Wf+**: Altenbeken, NWR Ochsenberg, KÖHLER, 30.VI.1998, 1 Ex. in einer Fensterfalle [KÖHLER Ochsenberg].

Plectophloeus nubigena (RTT., 1876): **Wf+**: Altenbeken, NWR Ochsenberg, KÖHLER, 30.VI.1998, 1 Ex. unter Buchenrinde [KÖHLER Ochsenberg].

Plectophloeus nitidus (FAIRM., 1857): **Ba+**: Grissheim, Rheintrockenäue, SZALLIES, 27.VI.1995, 1 Ex. unter Eschenrinde [NEUMANN i. l. 1999].

Saulcyella schmidii (MÄRK., 1844): **Br+(-)**: Schleipzig, Unterspreewald, BENSE, 1998, mehrfach in Gesieben, am Leimring [BENSE i. l. 1999].

Trimitum brevicorne (REICHB., 1816): **MV+(-)**: Testorfer Holz, Zarettin, ZIEGLER, 28.V.1994 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999]. **Ne+(-)**: Amt Neuhaus, Forst Karrenzien, ZIEGLER, 1.V.1998 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Trichonyx sulcicollis (REICHB., 1816): **Pf+(-)**: Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, 20.VI.1998, 2 Ex. im Autokescher [KÖHLER Mummelskopf]. **Wt+** [HARDE & KÖSTLIN 1965].

Batrisodes buqueti (AUBE, 1833): **Wt+**: Stuttgart, Villa Berg, 12.III.1979 - Stuttgart, Schloßpark, 16.II.1982, 1.III.1982, 13.V.1985 - Stuttgart, Solitude, 14.V.1982, omnia REIBNITZ leg., BE-SUCHET det. [REIBNITZ i. l. 1999].

Batrisodes unisexialis BES., 1988: **Wt+**: Stuttgart-Sillenbuch, REIBNITZ, 10.III.1984, BE-SUCHET det. [REIBNITZ i. l. 1999].

Tychobythinus glabratus (RYE, 1870): **Ba+**: Grissheim, Rheinufer, SCHILLER, 29.VI.1982, 1 Ex. [NEUMANN i. l. 1999].

Bryaxis nodicornis (AUBE, 1833): **Ba-** [HARTMANN 1926]. **Hs+(-)**: Gelnhausen, Gettenbach, DEHNERT, 1.V.1975 und 20.IX.1975, 4 Ex. (coll. HÖHNER) [HÖHNER i. l. 1998]. **St+**: Benzingeroade/Harz, LAU LSA, 1997, 1 Ex. (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i. l. 1999].

Bryaxis nigripennis (AUBE, 1844): **Ba-** [HARTMANN 1926].

Bryaxis bulbifer (REICHB., 1816): **St+**: Jederitz, LAU LSA, 1997/98, 8 Ex. (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i. l. 1999].

Tychus niger (PAYK., 1800): **MV+(-)**: Duvennest, ZIEGLER, 8.VIII.1996 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Tychus monilicornis RTT., 1880: **Ne+**: Forst Gehrde, ZIEGLER, 30.VII.1980, 1 Weibchen (normandi?), im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Brachygluta lefeuvrei (AUBE, 1833): **Ba-** [HARTMANN 1926].

Brachygluta xanthoptera (REICHB., 1816): **Ba+(-)** [KLESS 1998].

Claviger testaceus PREYSSL., 1790: **Hs+(-)**: Roßdorf, Roßberg, 1.X.1988, 2 Ex. und Steinau, HÖHNER, 4.VI.1972, 1 Ex. [HÖHNER i. l. 1998].

Familie OMALISIDAE

Omalisus fontisbellaquei FOURCER., 1785: **St+(-)**: Weischütz/Unstrut, LAU LSA, 1996, 1 Ex. (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i. l. 1999].

Familie CANTHARIDAE

Metacantharis discoidea (AHR., 1812): **Hs+**: Hanau, L. NEUMANN (coll. HÖHNER) und Hünfeld, HÖHNER, 6.VI.1998, 1 Ex. [HÖHNER i. l. 1998].

Metacantharis clypeata (ILL., 1798): **Hs+**: Hanau, L. NEUMANN (coll. HÖHNER) [HÖHNER i. l. 1998].

Absidia rufostacea (LETZN., 1845): **Pf+**: Schaidt, NWR Mörderhäufel, KÖHLER, 28.VII.1997, 1 Ex. an einem Leimring an einer toten Hainbuche [KÖHLER Bienwald].

Rhagonycha gallica PIC, 1923: **MV+**: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 28.V.1994 [ZIEGLER i. l. 1999].

Silis nitidula (F., 1792): **Ba-** [HORION 1953].

Malthinus facialis THOMS., 1864: **No+(-)** [KÖHLER 1996a].

Malthinus bilineatus KIESW., 1852: **Ba+** [SCHILLER 1979b].

Malthodes caudatus WEISE, 1892: **Wf+**: Altenbeken, NWR Ochsenberg, KÖHLER, 30.V.1998, 1 Ex. an einer toten Fichte an einem Leimring [KÖHLER Ochsenberg].

Malthodes misellus KIESW., 1852: **Ne+**: Wichtenbeck, ZIEGLER u.a., 21.V.1998 [ZIEGLER i. l. 1999].

Malthodes alpicola KIESW., 1852: **Br+**: Schleipzig, Unterspreewald, BENSE, Mitte V.1998, 1 Ex., Zucht aus Eichenästen [BENSE i. l. 1999].

Malthodes pumilus (BREB., 1835): **Hs+** [FLECHTNER et al. 1993].

Malthodes crassicornis (MÄCKL., 1846): **Br+**: Schleipzig, Unter-spreewald, BENSE, 9.V.1998, 1 Ex., an Leimring [BENSE i. l. 1999].

Familie MALACHIIDAE

Charopus concolor (F., 1801): **MV+**: Rüterberg, Elbe, ZIEGLER, 4.VII.1995 [ZIEGLER i. l. 1999].

Clanoptilus strangulatus (AB., 1885): **MV+**: Rüterberg, Elbe, ZIEGLER, 20.VI.1994 [ZIEGLER i. l. 1999].

Axinotarsus marginalis (CAST., 1840): **Br+(-)**: Schleipzig, Unter-spreewald, BENSE, 1998, mehrfach [BENSE i. l. 1999].

Familie MELYRIDAE

Aplocnemus tarsalis (SAHLB., 1822): **Wt-** [HORION 1953].

Dasytes fusculus (ILL., 1801): **Ne+(-)**: Amt Neuhaus, Forst Karrenzien, ZIEGLER, 25.V.1997 [ZIEGLER i. l. 1999].

Familie CLERIDAE

Denops albofasciatus (CHARP., 1825): **Ba+**: Grissheim, Rheintrockenäue, LAU, 1994, 1 Ex. aus Eichenästen mit Befall von *Coroebus florentinus* und *Agrilus graminis* gezogen [NEUMANN i. l. 1999].

Allonyx quadrimaculatus (SCHALL., 1783): **Wt+** [BRITZ 1990].

Familie DERODONTIDAE

Derodontus macularis (FUSS, 1850): **Ba+** [ROPPEL 1990].

Laricobius erichsonii ROSH., 1846: **MV+**: Gothmann, ZIEGLER, 18.VIII.1994 [ZIEGLER i. l. 1999].

Familie PELTIDAE

Thymalus limbatus (F., 1787)

Pf+(-): Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, 20.VI.1998, 1 Ex. an liegender Kiefer [KÖHLER Mummelskopf]. **Wf(+)** [LUCHT 1981b].

Familie ELATERIDAE

Ampedus forticornis SCHWARZ, 1900: **Ba+** [WURST 1993].

Ampedus bouvieri SCHIMMEL, 1984: **Wt?**: Ohringen-Unterheimbach, Bernbachtal, WURST, 2.VI.1986 Tübingen, Spitzberg, WURST, 10.V.1989, Artstatus unsicher [WURST 1993].

Ampedus cardinalis (SCHDTE., 1865): **Th+**: Bad Frankenhausen, Koschenberg, SCHAFFRATH, 13.VI.19 und 2.VII.1994 [SCHAFFRATH i. l. 1999].

Ampedus hirtjori (RYE, 1905): **Wt+** [WURST 1989].

Ampedus triangulum (DORN, 1925): **Br+** [ESSER 1998b].

Drasterius bimaculatus (ROSSI, 1790): **Wt-** [HORION 1953].

Selatosomus cruciatus (L., 1758): **Wt+(-)**: Ulm, PEIFER, V.1960 und andere Daten, mehrfach in einem Auwald [MAUS i. l. 1999].

Limoniscus violaceus (MÜLL., 1821): **St+**: Colbitz, Lindenwald, C. BAYER, 10.VI.1998, 1 Ex. [BÜCHE i. l. 1999].

Athous campyloides NEWM., 1833: **Ne+(i)**: Wiederfund 1996 in Hamburg, HENGIMITH [ZIEGLER i. l. 1999].

Dicronychus equisetoides LOHSE, 1976: **Hs+** [NOLTE 1995].

Familie EUCNEMIDAE

Hylis foveicollis (THOMS., 1874): **MV+**: Röggeliner Holz, ZIEGLER, 27.VI.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999]. **St+**: Seebenauer Holz, ZIEGLER, 3.III.1993 [ZIEGLER i. l. 1999].

Familie BUPRESTIDAE

Acmaeodera degener (SCOP., 1763): **Hs+(+)**: der Angabe im Katalog liegt nur eine pfälzische Quelle zugrunde, die Art ist für Hessen zu streichen [KLINGER i. l. 1999].

Chalcophora mariana (L., 1758): **Wt-**: [BRECHTEL & KOSTENBADER i.Dr.].

Poecilonota variolosa (PAYK., 1799): **Ba-** [HORION 1955].

Scintillatrix dives GUILL., 1889: **Th+**: Erlau, Silbachtal, WEIGEL, 5.VI.1996, Puppe [WEIGEL 1997]. **Wt+:** zahlreiche Fundorte [BRECHTEL & KOSTENBADER i.Dr.].

Scintillatrix rutilans (F., 1777): **Ba+:** Wittental, GAUSS, 20.VII.1956, 2 Ex. aus Lindenholz Freiburg, Günterstal, mehrere Finder, ab 1992 zahlreich [GAUSS 1963, NEUMANN i. l. 1999].

Anthaxia millefolii (F., 1801): **Rh+(-)** [NEIHUIS & BRENNER 1998].

Anthaxia nigrojubata ROUB., 1913: **Hs+(+)**: der Angabe im Katalog liegt nur eine pfälzische Quelle zugrunde, die Art ist für Hessen zu streichen [KLINGER i. l. 1999].

Anthaxia sepulchralis (F., 1801): **Ba+:** Mannheim-Gartenstadt, VII.74 [NEUMANN i. l. 1999].

Anthaxia godeti CAST.GORY, 1839: **MV+:** Klein Schmölen, Dörmitz, ZIEGLER, 8.VI.1994 [ZIEGLER i. l. 1999].

Coraebus elatus (F., 1787): **Hs+(+)**: der aktuellen Meldung im Katalog lag eine pfälzische Quelle zugrunde, der Art muß ein neuer Status zugeordnet werden [coll. KLINGER]. **Wt+:** zahlreiche Fundorte 1993-1995 in der Rheinebene [BRECHTEL & KOSTENBADER i.Dr.].

Agrius guernei LACORD., 1835: **Hs+(+)**: der Angabe im Katalog liegt nur eine pfälzische Quelle zugrunde, die Art ist für Hessen zu streichen [KLINGER i. l. 1999].

Agrius cyanescens (RATZ., 1837): **MV+(-)**: Stintenburg, Schaalsee, ZIEGLER, 13.VII.1995 [ZIEGLER i. l. 1999].

Agrius betuleti (RATZ., 1837): **Sd+:** Saarbrücken, Stadtwald, EISINGER, 27.VI.1979, 1 Ex. (NIEHUIS det.) [coll. EISINGER].

Agrius ribesi SCHAEF., 1946: **Br+** [ESSER 1998b]. **Pf+:** [NIEHUIS 1997]. **Rh+:** [NIEHUIS 1997].

Agrius cuprescens MENETR., 1832: **Hs+(+)**: der Angabe im Katalog liegt nur eine pfälzische Quelle zugrunde, die Art ist für Hessen zu streichen [KLINGER i. l. 1999].

Aphanisticus elongatus VILLA, 1835: **Hs+(?)**: Hanau, Neuberg, HÖHNER, 12.VI.1998 an einem Tümpelufer [HÖHNER i. l. 1998].

Aphanisticus pusillus (OL., 1790): **Hs+(+)**: Rabenau-Geilshausen, A. SCHMIDT, Frühjahr 1998, 3 Ex. in einer Bodenfalle (Hs+ zuvor Falscheintrag) [SCHMIDT mdl. 1998].

Habroloma nana (PAYK., 1799): **Hs+(+)**: Lorch, Weinbergslagen, HÖHNER, 7.V.1988, 2 Ex. [HÖHNER i. l. 1998].

Familie CLAMBIDAЕ

Calympterus alpestris REDT., 1849: **Ba+:** BAUM 1989]. **Hs+** [FLECHTNER et al. 1995].

Calympterus dubius (MARSH., 1802): **Hn+:** Göttingen, Wald bei Hagenberg, WILLERS, 9.X.1988, 1 Ex. [coll. WILLERS, L. SCHMIDT i. l. 1999].

Clambus simsoni BLACKBURN, 1902: **Ne+:** Einemhof, MEYBOHM, 31.VII.1984 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999]. **Wf+:** [RENNER 1998].

Clambus gibbulus (LEC., 1850): **Ba+:** Grissheim, Rheintrockenäue, SZALLIES, 9.VII.1997, 1 Ex. im Autokescher [NEUMANN i. l. 1999].

Clambus pallidulus RTT., 1911: **No+:** Köln-Worringen, Worringen Bruch, KÖHLER, 25.IV.1987, 1 Ex. aus Weidenlaub gesiebt - weitere Fundorte [KOCH 1990]. **Rh+:** Kirn-Hochstätten, Naheue, 17.V.1986, 1 Ex. aus altem Hochwasserenigen gesiebt, weitere Fundorte [KOCH 1990]. **Sd+:** Saarbrücken, Trarbacher Platz, EISINGER, 29.VIII.1998, 1 Ex. unter Reisighaufen gesiebt [coll. EISINGER]. *Clambus minutus* (STURM, 1807): **Ne+:** Forst Landwehr, Grippel, ZIEGLER, 21.VI.1998 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Familie SCIRTIDAE

Elodes pseudominuta KLAUSN., 1971: **Hn+:** Braunlage, Wurmberg, L. SCHMIDT, 7.VIII.1998, 1 Ex. (t. KLAUSNITZER) [coll. L. SCHMIDT]. *Cyphon ruficeps* TOURN., 1868: **Hs+:** [FLECHTNER et al. 1995].

Familie DRYOPIDAE

Dryops viennensis (CAST., 1840): **Ba+(-)**: Istein, Rheinaue, NEUMANN, VIII.98, zahlreich an den Isteiner Schwellen [NEUMANN i. l. 1999].

Familie ELMIDAE

Elmis larrei BEDEL, 1878: **Hn+:** KÖLLNER & HAASE 1997.

Oulimnius troglodytes (GYLL., 1827): **Br+(-)** [HORION 1955].

Linnius muelleri (ER., 1847): **By(+)**: BRANDL 1978, HEBAUER vid., Beleg heute nicht überprüfbar und fraglich (vgl. HEBAUER 1994) [HESS i. l. 1998].

Familie HETEROCERIDAE

Heterocerus fusculus KIESW., 1843: **Hn+:** Nienburg, HAHLOHBM, 1.VIII.1990, 1 Ex. im Ufersand [coll. HAHLOHBM, L. SCHMIDT i. l. 1999].

Familie LIMNICHIDAE

Pelochares versicolor (WALT., 1838): **Hs+:** Heussenstamm, FLECHTNER, 16.VIII.1998, mehrfach im Ufersand einer aufgelassenen Sandgrube [FLECHTNER i. l. 1999].

Limnichus pygmaeus (STURM, 1807): **MV+(-)**: Gützel, ZIEGLER, 12.III.1999 [ZIEGLER i. l. 1999].

Familie DERMESTIDAE

Dermestes undulatus BRAHM., 1790: **SH+(-)**: Hamburg-Moorfleth, ZIEGLER, 2.VI.1998 [ZIEGLER i. l. 1999].

Attagenus smirnovi ZHANTIEV, 1973: **Nei:** Hamburg, Zoolog.Institut, HERRMANN, 29.VIII.1997 [ZIEGLER i. l. 1999].

Attagenus unicolor (BRAHM, 1791): **Wf+(-)**: Ennigerloh, RÖWEKAMP, 30.VII.1996, 1 Ex. (t. RENNER) [RÖWEKAMP & RENNER i. l. 1998].

Trogoderma versicolor (CREUTZ., 1799): **Ba+:** [WOLF 1963].

Globicornis fasciata (FAIRM., 1859): **Wt+:** [WURST 1990].

Familie BYRRHIDAE

Simplocaria maculosa ER., 1847: **Br+(-)**: nur alte Belege im Mus. Berlin [PÜTZ i. l. 1999].

Curimopsis nigrita (PALM, 1934): **Pf+:** Schaidt, Bienwald, ZWECKER, 17.V.1996, 1 Ex. (t. KÖHLER) [coll. Mus. Karlsruhe]. **St+:** Kümmernitz, LAU LSA, 1996/97, zahlreich (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i. l. 1999].

Curimopsis paleata (ER., 1846): **Ba+:** Karlsruhe-Hafen, Rheinaltwasser Schlehet, BÜCHE, 8.VI.1985 und weitere Fundorte [BÜCHE i. l. 1999]. **St+(-)** [PÜTZ & SPRICK 1996].

Curimopsis austriaca (FRANZ, 1967): **Ba+:** SCHILLER 1979b).

Familie BOTHRIDERIDAE

Anomatus duodecimstriatus: **Hs+:** Wetzlar, Naturschutzzentrum-Außengelände, A. SCHMIDT, 1996/97, mehrfach [A. SCHMIDT mdl. 1998]. **Rh+(-)**: Bad Neuenahr, Weinberg Nonnenberg/Görres Linden, SCHEUERN, 20/26.VII.1998, 2 Ex. aus Strohmulch gesiebt [SCHEUERN i. l. 1998].

Familie CERYLONIDAE

Cerylon fagi BRIS., 1867: Sn+ [BENSE 1998].

Cerylon impressum ER., 1845: MV+(-): Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 28.V.1995 [ZIEGLER i. l. 1999].

Cerylon impressum ER., 1845: Sn+: Weißwasser, LANGE, 6.IV.1991 [REIBNITZ i. l. 1999].

Cerylon deplanatum GYL., 1827: Hn+(-): Göttingen, Hagenberg, WILLERS, 9.X.1988, 1 Ex. [coll. WILLERS, L. SCHMIDT i. l. 1999].

Familie NITIDULIDAE

Carpophilus marginellus MOTSCH., 1858: MV+: Duvennest, ZIEGLER, 29.VI.1992 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Carpophilus quadrisignatus ER., 1843: Ba+: Grissheim, Rheintrockenau, NEUMANN, 7.V.1994, zahlreich an einer Wildfütterung, später immer wieder im Gebiet gefunden [NEUMANN i. l. 1999]. Hs+: Erlensee, HÖHNER, 29.VIII.1994, 1 Ex. an faulenden Äpfeln [HÖHNER i. l. 1998].

Carpophilus truncatus MURRAY, 1864: Ba+: Grissheim, Rheintrockenau, NEUMANN, 1.I.1993, zahlreich an Wildfütterung, später immer wieder im Gebiet gefunden [NEUMANN i. l. 1999]. Wf+: Ahlen, RÖWEKAMP, 12.VI.1996, 1 Ex. (t. RENNER) [RÖWEKAMP & RENNER i. l. 1998].

Carpophilus obsoletus ER., 1843: Nei: Hamburg, Freihafen, HERRMANN, 18.VII.1997 [ZIEGLER i. l. 1999].

Pria dulcamarae (SCOP., 1763): MV+(-): Röggeliner Holz, ZIEGLER, 25.VI.1995 [ZIEGLER i. l. 1999].

Meligethes caudatus GUILLEBEAU, 1897: Pf+: Neulauterburg, Biewald, BÜCHE 21.VI.1992, einige Ex. auf einer trockenen Rasenfläche in Blüten von Campanula rapunculoides [BÜCHE i. l. 1999].

Meligethes corvinus ER., 1845: Th+(-): Burgwenden, Finne, ESSER, 3.V.1997, 1 Ex. von blühender Schlehe geklopft [BÜCHE i. l. 1999].

Meligethes fulvipes BRIS., 1863: Sd+: Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i. l. 1999].

Meligethes longulus SCHILSKY, 1894: Ba+ [KLESS 1998].

Meligethes czwalinae RTT., 1871: Ba+(-) [KLESS 1998, HORION 1951].

Meligethes lepidii MILL., 1852: Ba+ [GLADITSCH 1978].

Meligethes sulcatus BRIS., 1863: MV+: Duvennest, ZIEGLER, 18.XII.1990 [ZIEGLER i. l. 1999].

Meligethes ochropus STURM, 1845: MV+: Rüterberg, Elbe, ZIEGLER, 31.VIII.1994 [ZIEGLER i. l. 1999].

Meligethes lugubris STURM, 1845: Sd+: Saarbrücken, Trarbacher Platz, EISINGER, 4.VI.1998, 2 Ex. von Thymian [coll. EISINGER].

Meligethes gagatinus ER., 1845: Sd+: Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i. l. 1999].

Meligethes eugenii ER., 1845: Pf+(-): Schaidt, NWR Mörderhäufel, KÖHLER, 28.VI.1997, 4 Ex. aus der Vegetation gekeschert [KÖHLER Biewald].

Meligethes carinulatus FÖRSTER, 1849: MV+(-): Gothmann, ZIEGLER, 6.VI.1994 [ZIEGLER i. l. 1999].

Meligethes brachialis ER., 1845: St+(-): Zielitz, BÜCHE & ESSER, 6.VIII.1998, mehrere Exemplare an *Coronilla varia* [BÜCHE i. l. 1999].

Epuraea angustula STURM, 1844: Ba+(-) [BENSE & GEIS 1998].

Epuraea boreella (ZETT., 1828): Ne+(-): Nindorf, Forst Garlstorf, ZIEGLER, 1.IV.1990 [ZIEGLER i. l. 1999].

Epuraea binotata RTT., 1872: Ba+ [BENSE & GEIS 1998].

Epuraea muehli RTT., 1908: MV+: Drönnewitzer Holz, ZIEGLER, 20.VII.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999]. Pf+: Schaidt, NWR Stuttpferch, KÖHLER, 28.VI.1996, 4 Ex. im Autokescher [KÖHLER Biewald].

Epuraea silacea (HBST., 1784): St+(-): Rogätz, Hangwald, BÜCHE, 8.VII.1998, mehrere z.T. frisch geschlüpfte Ex. in den Poren eines Fruchtkörpers von *Polyporus squamosus* an einer alten Ulme [BÜCHE i. l. 1999].

Epuraea rufomarginata (STEPH., 1830): Ba+: Geisingen, Unterhölzer Wald, LAUSBERGER, V-VI.1992 [KLESS 1998]. MV+(-): Pritzier, ZIEGLER, 4.I.1999 [ZIEGLER i. l. 1999].

Nitidula bipunctata (L., 1758): Ba+: Freiburg, WOLF, 1 Ex. ohne Datum Hugstetten bei Freiburg, WOLF, IX.1933, 1 Ex. [MAUS i. l. 1999].

Nitidula flavomaculata ROSSI, 1790: Ba+(-): Belege von WOLF (HORION 1960) gehören zu *Litargus connexus* (MAUS det.) [MAUS i. l. 1999].

Pocadioides wajdelota (WANK., 1869): Wt+ [HORION 1960].

Thalycra fervida (OL., 1790): Ba+: Freiburg, MAUS, 17.VI.1993, 1 Ex. an ausfließendem Baumsaft Grissheim, Rheintrockenäue, LANGE, 27.VI.1995, 1 Ex. an einem Eichensaftfluß - Ibach, Hotzenwald-Moore, SZALLIES, 12.VIII.1997, 1 Ex. [MAUS, NEUMANN & REIBNITZ i. l. 1999].

Familie KATERETIDAE

Kateretes pedicularius (L., 1758): MV+(-): Gülze, ZIEGLER, 12.III.1999 [ZIEGLER i. l. 1999].

Kateretes pusillus (THUNB., 1794): MV+(-): Gülze, ZIEGLER, 12.III.1999 [ZIEGLER i. l. 1999].

Familie MONOTOMIDAE

Monotoma conicollis AUBÉ, 1837: MV+: Pritzier, ZIEGLER, 4.I.1999 [ZIEGLER i. l. 1999].

Monotoma angusticollis (GYLL., 1827): MV+: Pritzier, ZIEGLER, 4.I.1999 [ZIEGLER i. l. 1999].

Monotoma longicollis (GYLL., 1827): MV+: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 28.V.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Rhizophagus parallelocollis GYL., 1827: MV+(-): Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 3.V.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Rhizophagus oblongicollis BLATZ.HORNER, 1892: Hn+: Walkenried, NWR Staufenberg, IV.+VI.89, 41 Ex. [LOHSE det.] [WINTER 1991]. MV+: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 28.V.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Cyanostolus aeneus (RICHT., 1820): Ba+: Grissheim, Rheintrockenau, SZALLIES, 16.V.1997, 1 Ex. im Autokescher [NEUMANN i. l. 1999]. MV+: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 28.V.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Familie CUCUJIDAE

Cucujus cinnaberinus (SCOP., 1763): Ba. [HORION 1960].

Pediatus dermestoides (F., 1792): SH+: Lauerholz, SUIKAT & ZIEGLER, 12.V.1998 [ZIEGLER i. l. 1999].

Familie SILVANIDAE

Silvanoprus fagi (GUER., 1844): St+: Seebenauer Holz, ZIEGLER, 7.VI.1993 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999]. Wf+: Arnsberg-Völklingen, Schloß Höllingenhofen, Kleine Schee, ELMER, 20.VII.1998, 1 Ex. am Licht [ELMER mdl. Mitt.].

Familie EROTYLIDAE

Triplax lepida (FALD., 1835): Hs+(-): Groß-Gerau, HÖHNER, 14.V.1977, 4 Ex. an *Polyporus squamosus* und toten Ästen - Bürgstadt bei Bensheim, REIBNITZ, 4.VI.1978, unter Buchenrinde - Seligenstädt Stadtwald, REIBNITZ, 30.V.1998, 2 Ex. an *Polyporus* [HÖHNER i. l. 1998, REIBNITZ 1986b, i. l. 1999]. St+: Walbeck, Steinbruch, BÜCHE, 30.VI.1996, 1 totes Ex. von einem Busch geklopft - Athenstedt, JÜNG, 1996, 4 Ex. an einem Pilz [BÜCHE i. l. 1999, JÜNG i. l. 1999]. Wt+: Döttingen bei Kupferzell, 10.V.1998, 1 Ex. an einer Polyporus-Art an einer gestürzten Buche [REIBNITZ i. l. 1999].

Triplax rufipes (F., 1775): No+: Kleve, Reichswald, KATSCHAK, 20.VIII.1998, 1 Ex. an Pleurotes auf einer liegenden Buche [KATSCHAK mdl. Mitt. 1998].

Dacne rufifrons (F., 1775): Ba+ [ROPPEL 1990, KLESS 1998].

Familie CRYPTOPHAGIDAE

Paramecosoma melanocephalum (HBST., 1793): St+: Wangen, Unstrutufer, ESSER, 30.V.1998, 1 Ex. Allrode/Harz, LAU LSA, 1997, 1 Ex. (JUNG det.) in Bodenfallen [BÜCHE i. l. 1999, JUNG i. l. 1999].

Pterygium crenatum (F., 1798): **Wf+ (?)**: Altenbeken, NWR Ochsenberg, KÖHLER, 30.VII.1998, 1 Ex. an einer toten Fichte an einem Leimring [KÖHLER Ochsenberg].

Cryptophagus pupuli PAYK., 1800: **Th+ (-)**: Espenfeld, Götzberg, SCHAFFRATH, 16.VII.19-20.VIII.1996 (ESSER det.) [SCHAFFRATH i. l. 1999].

Cryptophagus pubescens STURM, 1845: **MV+ (-)**: Drönnewitzer Holz, ZIEGLER, 20.VII.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Cryptophagus saginatus STURM, 1845: **MV+ (-)**: Duvennest, ZIEGLER, 18.XII.1990 [ZIEGLER i. l. 1999].

Cryptophagus labilis ER., 1846: **Pf+ (-)**: Schaidt, NWR Mörderhäufel, KÖHLER, 28.VII.1997, 3 Ex. aus einem *Lasius brumeus*-Nest in einer Eiche [KÖHLER Bienwald].

Cryptophagus corticinus THOMS., 1863: **By+ (?)**: Selb, Neuhaus, RENNER, 25.V.1998, 1 Ex. [RENNER i. l. 1999].

Cryptophagus thomsoni RTT., 1875: **MV+ (-)**: Pritzier, ZIEGLER, 4.I.1999 [ZIEGLER i. l. 1999].

Cryptophagus scutellatus NEWM., 1834: **MV+ (-)**: Duvennest, ZIEGLER, 18.XII.1990 [ZIEGLER i. l. 1999].

Cryptophagus deubeli GANGLB., 1897: **Hn+ (-)**: Süntel, Rannenberg, KERSTENS, 24.VI.1956, 1 Ex. (FRANZEN det.) [coll. HERRMANN, L. SCHMIDT i. l. 1999]. **St+ (-)**: Altenbrak/Harz, LAU LSA, 1997, zahlreich (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i. l. 1999].

Micrambe abietis (PAYK., 1798): **MV+ (-)**: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 3.V.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999]. **Pf+ (-)**: Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, 17.IV.1998, 1 Ex. aus altem Schlagkreis gesiebt [KÖHLER Mummelskopf].

Emphyllus glaber (GYLL., 1808): **MV+ (-)**: Pritzier, ZIEGLER, 4.I.1999 [ZIEGLER i. l. 1999].

Antherophagus canescens GROUV., 1916: **Ba+ (-)**: Grissheim, Rheintrockenau, NEUMANN, 1.VII.1994, 1 Ex. (t. ESSER) [NEUMANN i. l. 1999].

Antherophagus pallens (L., 1758): **MV+ (-)**: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 4.VI.1995 [ZIEGLER i. l. 1999].

Caenoscelis ferruginea (SAHLB., 1820): **St+ (-)**: Altenbrak/Harz, LAU LSA, 1997, zahlreich (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i. l. 1999].

Atomaria impressa ER., 1846: **Ba+ (-)**: der zugrundeliegende Beleg gehört zu *Atomaria plicata* (ESSER det.) [BÜCHE i. l. 1999]. **MV+ (-)**: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 3.V.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Atomaria morio Kol., 1846: **MV+ (-)**: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 2.IV.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Atomaria ornata HEER, 1841: **Ba+ (-)**: der zugrunde liegende Beleg gehört zu *Atomaria fuscata* (ESSER det.) [BÜCHE i. l. 1999]. **Hs+ (-)** [FLECHTNER et al. 1993].

Atomaria zetterstedti (ZETT., 1838): **MV+ (-)**: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 3.V.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Atomaria analis ER., 1846: **Ba+ (?)**: Horberloch, BÜCHE, 23.I.1990 - Sandhausen, NSG Pflege Schönbar, BÜCHE, IV.91 in einer Barberfalle [BÜCHE i. l. 1999]. **MV+ (-)**: Duvennest, ZIEGLER, 18.XII.1990 [ZIEGLER i. l. 1999].

Atomaria rubricollis BRIS., 1863: **St+ (-)**: Timmenrode/Quedlinburg, LAU LSA, 1996, 1 Ex. (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i. l. 1999].

Atomaria turgida ER., 1846: **MV+ (-)**: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 3.V.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999]. **St+ (-)**: Eickendorf, BÜCHE, 5.VIII.1996 in einem Nadelforst aus der Vegetation gekeschert [BÜCHE i. l. 1999].

Atomaria umbrina (GYLL., 1827): **Pf+ (-)**: Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, 15.V.1998, 3 Ex. an einem liegenden Buchenast gesiebt [KÖHLER Mummelskopf].

Atomaria diluta ER., 1846: **Hs+ (?)** [FLECHTNER et al. 1993, HORION 1960]. **Pf+ (-)**: Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, 22.VII.1998, 1 Ex. an einem Leimring an einer toten Eiche [KÖHLER Mummelskopf].

Atomaria barani BRIS., 1863: **MV+ (-)**: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 28.V.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Atomaria nigriventris STEPH., 1830: **MV+ (-)**: Palingen, ZIEGLER, 18.XII.1990 [ZIEGLER i. l. 1999].

Atomaria puncticollis THOMS., 1868: **MV+ (-)**: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 28.V.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Atomaria alpina HEER, 1841: **Rh+ (-)**: Taben-Rodt/Saar, Urwald von Taben, KÖHLER, 15.VII.97, 1 Ex. an einer Schwefelporlings-Eiche [KÖHLER Taben].

Atomaria elongatula ER., 1846: **Th+ (-)**: Hainich bei Behringen, MÖLLER, VI.97, einige Ex. aus Eichenmulm mit Schwefelporlingsmycel [MÖLLER i. l. 1998].

Atomaria pulchra ER., 1846: **MV+ (-)**: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 27.VII.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Atomaria atrata RTT., 1875: **Hs+ (?)** [FLECHTNER et al. 1995].

Atomaria procerula ER., 1846: **MV+ (-)**: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 3.V.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Atomaria lohsei JOHNS.STRAND, 1968: **Ba+ (-)**: Kleinkems, Rheinaue - Grissheim, Rheintrockenau [NEUMANN i. l. 1999].

Atomaria wollastonii SHP., 1867: **MV+ (-)**: Gothmann, ZIEGLER, I.VI.1994 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Atomaria badia ER., 1846: **Th+ (-)**: Hainich bei Behringen, MÖLLER, VI.97, 4 Ex. (t. KÖHLER) aus Eichenmulm mit Schwefelporlingsmycel [MÖLLER i. l. 1998].

Familie LANGURIIDAE

Cryptophilus integer (HEER, 1838): **Ba+ (-)**: Grissheim, Rheintrockenau, SZALLIES, 28.VII.1996, zahlreich regelmässig im Autokescher [NEUMANN i. l. 1999]. **Ba+ (-)**: Neuenburg-Grüßheim, LANGE, 31.III.1997 in Heuhäufen Stutensee-Friedrichstal, LANGE, 6.VI.1998 am Licht [REIBNITZ i. l. 1999]. **Sd+ (-)**: Saarbrücken, Trarbacher Platz, EISINGER, 29.III.1998, 30 Ex. (KÖHLER det.) aus Kompost gesiebt [coll. EISINGER].

Familie PHALACRIDAE

Phalacrus simetarius (F., 1775): **MV+ (-)**: Klein Schmölen, Dömitz, ZIEGLER, 8.VI.1994 [ZIEGLER i. l. 1999].

Phalacrus caricus STURM, 1807: **MV+ (-)**: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 28.V.1994 [ZIEGLER i. l. 1999].

Olibrus gerhardtii FLACH, 1888: **Hs+ (-)**: Schlüchtern, Landrücken, SPRICK, 16.VI.1993, mehrfach auf den Blüten von *Senecio ovatus* auf einer Waldlichtung [coll. SPRICK, L. SCHMIDT i. l. 1999].

Olibrus pygmaeus (STURM, 1807): **St+ (-)**: Rogätz, Sandkrug, BÜCHE, 15.VI.1998, 1 Ex., im Ohrekreis häufig am Kleinen Filzkraut (*Filago minima*) [BÜCHE i. l. 1999].

Olibrus flavidicornis (STURM, 1807): **Hn+ (-)**: Göttingen, Lenglern, WILLERS, 5.VII.1997, 1 Ex. von Ruderalvegetation auf einem Bahngelände [coll. WILLERS, L. SCHMIDT i. l. 1999].

Olibrus norvegicus MUNST., 1901: **Hs+ (-)**: Vierheimer Heide, HÖHNER, 31.V.1996, 19.VII.1996, 30.V.1997 und 25.VII.1998, 5 Ex. [HÖHNER i. l. 1998].

Stilbus oblongus (ER., 1845): **Hn+ (-)**: Ahlden/Aller, HAHLOHBM, 1.X.1998, 1 Ex. aus Hochwassergenist im Schilfbereich gesiebt [coll. HAHLOHBM, L. SCHMIDT i. l. 1999].

Familie LAEMOPHLOEIDAE

Notolaemus castaneus (ER., 1845): **By+ (-)**: Bühlberg, Hohenecker Forst, 4.VI.1994, an toten Eichenästen - Zeubelried, 9.VII.1994 - Michelinfeld, 6.VI.1996, an toten Haselästen - Leutershausen, 29.VI.1997, Eiche Rügland-Rosenberg, 27.VI.1998, an toten Eichenästen, omnia REIBNITZ leg. [REIBNITZ i. l. 1999].

Notolaemus castaneus (ER., 1845): **Pf+ (-)**: Heidesheim-Ulerborn, REIBNITZ, 25.VII.1998, an totem Eichenast [REIBNITZ i. l. 1999].

Cryptolestes duplicatus (WALTL, 1839): **Hn+ (-)**: nördl. Soltau, Ehrhorn, WILLERS, 14.VI.1996, 1 Ex. unter Eichenrinde [coll. WILLERS, L. SCHMIDT i. l. 1999].

Familie LATRIDIIDAE

Latridius consimilis (MANNH., 1844): **MV+ (-)**: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 2.IV.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Enicmus histrio JOYNTMLIN, 1910: **MV+ (-)**: Pritzier, ZIEGLER, 4.I.1999 [ZIEGLER i. l. 1999].

Dienerella filum (AUBE, 1850): **Pf+ (-)**: Schaidt, Bienwald, ZWECKER, 24.IX.1997, 1 Ex. (t. KÖHLER) [coll. Mus. Karlsruhe].

Stephostethus rugicollis (OL., 1790): MV+(:): Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 28.V.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Corticaria punctulata MARSH., 1802: Sd+: Saarbrücken, Trarbacher Platz, EISINGER, 29.III.1998, 19 Ex. von Fichte, aus Reisig [coll. EISINGER].

Corticaria pineti LOHSE, 1960: Hs+: Neuhof, NWR Schönbuche, FLECHTNER, 1990-92 [DOROW et al. im Druck].

Corticaria obscura BRIS., 1863: Sd+: Saarbrücken, Saarkohlenwald, MÖLLER, VIII.1998, 1 Ex. an einem Buchenstamm bei *Lasius brunneus* [MÖLLER i. l. 1999].

Corticaria inconspicua WOLL., 1860: Sd+: Saarbrücken, Saarkohlenwald, MÖLLER, VIII.1998, 5 Ex. im Mulf einer weißfaulen Buchenruine mit *Lasius brunneus* [MÖLLER i. l. 1999].

Corticaria crenulata (GYLL., 1827): WE+(:): Spiekeroog, MAUS, 1986/87, mehrfach [DAFFNER det.] [MAUS in Vorber.].

Corticaria serrata (PAYK., 1798): MV+(:): Stintenburg, Schaalsee, ZIEGLER, 13.VII.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Corticaria abietorum MOTSCH., 1867: Ba+ [BAUER 1989, MOLENDA 1996]: Hn+(:): Medingen, Staatsforst, WINTER, V.-X.1996, mehrfach [KÖHLER det.] in Baumklettern an Fichte und Douglasie [KÖHLER i. l. 1998].

Corticaria linearis (PAYK., 1798): MV+(:): Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 28.V.1994 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Corticaria polypori SAHLB., 1900: Ba+: Weinstetten, Rheintrockenau, ESSER, 3.XI.1997 [NEUMANN i. l. 1999].

Corticaria lateritia MANNH., 1844: Pf+: Schaidt, NWR Stuttpferch, MATERN, 28.IX.1997, 1 Ex. (KÖHLER det.) [KÖHLER Bienwald].

Corticaria bella REDT., 1849: Pf+: Schaidt, NWR Stuttpferch, KÖHLER, 27.VII.1996, 1 Ex. im Autokescher [KÖHLER Bienwald].

Corticaria similata (GYLL., 1827): MV+(:): Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 2.IV.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Corticaria lambiana (SH., 1910): Hs+ [FLECHTNER et al. 1995].

Corticaria truncatella (MANNH., 1844): Sd+: Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i. l. 1999].

Melanophthalma curticollis (MANNH., 1844): MV+: Gothmann, ZIEGLER, 1.VI.1994 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Melanophthalma maura MOTSCH., 1866: MV+: Klein Schmölen, Dömitz, ZIEGLER, 20.VI.1994 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Migneauxia orientalis RTT., 1877: MV+: Duvennest, ZIEGLER, 29.VI.1992 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999]. Rh+: Ahrbrück, KÖHLER, 12.V.1998, 1 Ex. im Autokescher [coll. KÖHLER].

Familie MYCETOPHAGIDAE

Mycetophagus ater (RTT., 1879): Wt+ [BENSE & GEIS 1998].

Mycetophagus decempunctatus F., 1801: Ba+ [KLESS 1998].

Mycetophagus multipunctatus F., 1792: Hn+(:): Göttingen, WILLERS, 9.VI.1998, mehrfach (t. WEIGEL) an einem Blätterpilz an einer Weißpappel [coll. WILLERS, L. SCHMIDT i. l. 1999].

Typhaea decipiens LOHSE, 1989: MV+: Duvennest, ZIEGLER, 29.VI.1992 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Familie COLYDIIDAE

Langelandia anophthalma AUBÉ, 1842: Hs+: Wetzlar, Naturschutzzentrum-Außengelände, A. SCHMIDT, 1996/97, 8 Ex. [A. SCHMIDT mdL. 1998].

Langelandia anophthalma AUBÉ, 1842: Rh+(:): Bad Neuenahr, Weinberg „Sonnenberg/Görres Linden“, SCHEUERN, 20/26.VII.1998, 2 Ex. aus Strohmulch ges. [SCHEUERN i. l. 1998].

Synchita separanda (RTT., 1882): Wt+: Münchingen, MALZACHER, 20. und 21.VI.1988, 6 Ex. unter Feldahorn-Rinde und an Buchenholz-Stapel, Determination? [MALZACHER 1990].

Cicones undatus (GUER., 1844): St+ [ESSER 1998a].

Colydium elongatum (F., 1787): Wt+(:): [BRITZ & BERNHARD 1994].

Familie CORYLOPHIDAE

Sacium brunneum BRIS., 1863: Pf+(:): Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, 11.X.1998, 2 Ex. aus verpilzten Rinden einer Buchenruine [KÖHLER Mummelskopf].

Orthoperus punctatus WANK., 1865: Ba+: Überlingen, HORION, VI.1947, 1 Ex. abends gekeschert - Kleinkems, 3.XI.1997, 1 Ex. in einem Laubgesiebe [HORION 1954b, BÜCHE i. l. 1999]. Wt? [MEYER 1966].

Orthoperus nigrescens STEPH., 1829: Ba+: Kleinkems & Weinstetten, Rheinaue, BÜCHE & ESSER, 3.XI.1997 (ESSER det.) - Überlingen, HORION, II.1943, 1 Ex. aus Moos gesiebt [NEUMANN i. l. 1999, HORION 1954b].

Familie ENDOMYCHIDAE

Mycetina cruciata (SCHALL., 1783): Hs+(:): Groß-Gerau, HÖHNER, 10.V.1995, 1 Ex. aus Eichenmulm - Lampertheimer Wald [HÖHNER i. l. 1998, NOLTE et al. 1997].

Endomychus coccineus (L., 1758): Hs+(:): Messel, HÖHNER, 22.V.1993, 1 Ex. [HÖHNER i. l. 1998].

Familie COCCINELLIDAE

Cynegetis impunctata (L., 1767): Ba+: Grissheim, Rheintrockenau, SZALLIES, 23.V.1994 und 7.IV.1996, 2 Ex. [NEUMANN i. l. 1999].

Scymnus minusculus CAPRA FÜRSCH, 1967: WE+(:) [MAUS 1988].

Scymnus ater KUG., 1794: Ba+: Karlsruhe-Südstadt, BÜCHE, 28.X.1993, 1 Ex. - Grissheim, Rheinaue, BÜCHE, 29.XII.1994, 1 Ex. unter Rindenschuppen an Eichen [BÜCHE i. l. 1999].

Clitostethus arcuatus (Rossi, 1794): St+: Wörlitz/Elbe, LAU LSA, 1998, 1 Ex. in (JUNG det.) einer Malaisefallade [JUNG i. l. 1999].

Hyperaspis concolor SUFFR., 1843: Ba+: Berghausen, BÜCHE, 3.III.1991, 1 Ex. auf einer Streuobstwiese gesiebt - Karlsruhe-Grötzingen, BÜCHE 19.VI.1984, 1 Ex. an einer Streuobstwiese gekeschert [BÜCHE i. l. 1999].

Hyperaspis repens (HBST., 1783): Hs+: Vierheimer Heide, BRENNER, 16.VI.1994 und 18.VIII.1994, 5 Ex. (coll. HÖHNER) [HÖHNER i. l. 1998].

Hippodamia undecimnotata (SCHNEID., 1792): Br+ [BEIER 1998].

Adalia conglomerata (L., 1758): SH+: Güsing, Elbe, BURGARTH, 1.V.1990 [ZIEGLER i. l. 1999].

Oenopia impustulata (L., 1767): Ba- [HARTMANN 1924].

Familie CISIDAE

Xylographus bosstrichoides (DUF., 1843): Pf+: Worms, Bürgerpark, REIBNITZ, 24.X.1998, 1 Ex. und 8.XI.1998, 3 Ex. in einem harten Zunderschwamm an einem großen Eichenstumpf [REIBNITZ 1998].

Cis glabratus MELL., 1848: Pf+: Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, 23.VII.1998, 7 Ex. an Fomes - Bingen, Binger Wald, REIBNITZ, 18.VI.1997 an Birkenporling - Scheibenhardt, Bienwald, REIBNITZ, 19.VII.1998, in Birkenporling Steinfeld, REIBNITZ, 19.VII.1998, in Fomitopsis pinicola [KÖHLER Mummelskopf, REIBNITZ i. l. 1999].

Cis comptus GYLL., 1827: Hn+(:): Hardegsen, Fichtenforst Espol, WILLERS, 17.VII.1993, 1 Ex. (t. CONRAD) [coll. WILLERS, L. SCHMIDT i. l. 1999].

Cis punctulatus GYLL., 1827: Hs+(:): Langenselbold, HÖHNER, 12.VI.1976 - 17 Belege von verschiedenen Fundorten in coll. REIBNITZ [HÖHNER i. l. 1998, REIBNITZ i. l. 1999].

Cis fagi WALTL, 1839: MV+(:): Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 2.IV.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Cis castaneus MELL., 1848: Hs+: Belege von 24 Funden in Südhessen in coll. REIBNITZ [REIBNITZ i. l. 1999].

Cis dentatus MELL., 1848: Pf+: Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, 17.IV.1998, 1 Ex. an einer toten Fichte [KÖHLER Mummelskopf].

Cis fissicornis MELL., 1848: Br+: Schleipzig, Unterspreewald, BENSE, 1998 (t. REIBNITZ) [BENSE i. l. 1999].

Orthocis pseudolinearis (LOHSE, 1965): Hs?+(:): Beleg muß genauer geprüft werden. [REIBNITZ i. l. 1999]. Ne?+(:): keine sicheren Belege [REIBNITZ i. l. 1999]. SH?+(:): keine sicheren Belege [REIBNITZ i. l. 1999]. Wt?+(:): Bei dem Beleg handelt es sich um ein nicht von *Orthocis alni* zu unterscheidendes Weibchen [REIBNITZ i. l. 1999].

Orthocis linearis (SAHLB., 1901): **B+**: Oberaurach-Fabrik-schleichach, FLOREN, 2.-4.VIII.1995, 30.V.1996 und 1.VI.1996, ca. 50 Ex. in einem Eichenhochwald durch Kronenbegasung erhalten, REIBNITZ det. [REIBNITZ i. l. 1999].

Orthocis vestitus (MELL., 1848): **MV+**: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 4.VI.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Familie LYCTIDAE

Lycus cavicollis LEC., 1805: **Nei**: Amt Neuhaus, Neuhaus, TOLASCH, 4.VII.1995 [ZIEGLER i. l. 1999]. **Wf+**: Ahlen, RÖWEKAMP, 1 Ex. (coll. RENNER) [RÖWEKAMP & RENNER i. l. 1998].

Lycus linearis (GOEZE, 1777): **Wf+(?)**: Ennigerloh, RÖWEKAMP, 18.VII.1994, 1 Ex. (t. RENNER) [RÖWEKAMP & RENNER i. l. 1998].

Familie BOSTRICHIDAE

Rhyzopertha dominica (F., 1792): **Rh+**: Spay, Rheinbogen, KÖHLER, 6.VI.1998, 3 Ex. im Autokescher [coll. KÖHLER].

Lichenophanes varius (ILL., 1801): **Wt+**: Hohenhaslach, Teufelsberg, BENSE, VI.94, 1 Ex., aus Buchenästen gezogen [BENSE i. l. 1999].

Familie ANOBIIDAE

Episernus granulatus WEISE, 1887: **Wt+**: Dettingen bei Tübingen, BRITZ, VI.1992, 1 Ex. - Aulendorf, Brunnenholzried, LANGE, 1 Ex. (BÜCHE det.) [BRITZ & BERNHARD 1994, BÜCHE i. l. 1999].

Ernobius nigrinus (STURM, 1837): **MV+(?)**: Gothmann, ZIEGLER, 6.VI.1994 [ZIEGLER i. l. 1999].

Oligomerus pilinoides (WOLL., 1854): **Bai**: Freiburg, GEIS, in einer Holzhandlung [BÜCHE i. l. 1999].

Stegobium paniceum (L., 1758): **MV+(-)**: Gothmann, ZIEGLER, 1.VI.1994 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Gastrallus laevigatus (OL., 1790): **Wt+(-)**: Freudental, aufgelassener Weinberg, BENSE, 30.VI.1993, 1 Ex., von Apfelbaum geklopft [BENSE i. l. 1999].

Gastrallus knizeki ZAHRADNIK, 1996: **Ba+**: Karsruhe, Hardtwald-Wildpark, BÜCHE, V.1989, 5 Ex. und IV.1990 aus Kiefernmisteln gezogen, weitere Fundorte: Karlsruhe-Durlach, an der Pfiz - Karlsruhe - Durlach, Turmberg - Sandhausen, NSG „Pflege Schöna“ - Rheinmünder-Stollhofen, Rheinwald [BÜCHE 1998].

Xyletinus laticollis (DUFT., 1825): **SH+(-)**: Sylt, Ellenbogen, BURGARTH, TOLASCH, 29.VI.1997 [ZIEGLER i. l. 1999].

Xyletinus ater (CREUTZ., 1796): **Hn+**: Wesseln, NSG Steinberg, SPRICK, 25.V.1997, 1 Ex. von abgestorbenen Eichenästen geklopft [L. SCHMIDT i. l. 1999].

Xyletinus pectinatus (F., 1792): **Ba-** [NOWOTNY 1951].

Xyletinus fibyensis LUNDBLAD, 1949: **Ba+**: Grissheim, Rheintrockenau, SZALLIES, 30.VI.1995 und 2.VII.1997, 3 Ex. von Schwarzpappel [NEUMANN i. l. 1999].

Lasioderma serricorne (F., 1792): **Hni**: Lemke, KRENKEL, 28.IX.1998, 2 Ex. [coll. HAALBOHM, L. SCHMIDT i. l. 1999].

Lasioderma redtenbacheri (BACH, 1852): **By+(-)**: Kallmünz, Stadelberg, RENNER, 31.V.1998, 1 Ex. auf einem Trockenhang [RENNER i. l. 1999].

Stagetus borealis ISRAELSON, 1971: **Ba?**: Stollhofen, ehemaliger Fliegerhorst, SZALLIES, 24.V.1996, 1 Ex. im Autokescher (Bestimmung unsicher) [SZALLIES 1998].

Dorcatoma substriata HUMMEL, 1829: **St+(-)**: Everingen, Seggerder Bruch, BÜCHE, IV.97, aus Fruchtkörpern des Erlen-Schillerporlings (*Inonotus radiatus*) gezogen (IX.96) [BÜCHE i. l. 1999].

Dorcatoma minor ZAHRADNIK, 1993: **Hs+** [NEUMANN & BÜCHE 1998].

Anitys rubens (HOFFM., 1803): **Sd+**: Saarbrücken, Saarkohlenwald, MÖLLER, VIII.1998, in einer dünnen umgestürzten Schwefelporlingeiche [MÖLLER i. l. 1999].

Familie PTINIDAE

Gibbum psylloides (CZENP., 1778): **Hni**: Göttingen, Botanische Anstalten, DICKORE, XI.97, 2 Ex. in einem Herbarium [coll. WILLERS, L. SCHMIDT i. l. 1999]. **Hs+(-)**: Wetzlar, Stadtgebiet, A. SCHMIDT, 1998 [A. SCHMIDT mdl. 1998].

Tipnus unicolor (PILL.MITT., 1783): **MV+(-)**: Duvennest, ZIEGLER, 18.XII.1990 [ZIEGLER i. l. 1999].

Pinus bicinctus STURM, 1837: **Ba+(-)**: Weinstetten, Rheintrockenau, BÜCHE, 3.XI.1997, 1 Ex. (t. ESSER) - Geisingen, Unterhölzer Wald, LAUSBERGER, V-VI.1992 [KLESS 1998, NEUMANN i. l. 1999]. **MV+(-)**: Palingen, ZIEGLER, 18.XII.1990 [ZIEGLER i. l. 1999].

Pinus clavipes PANZ., 1806: **Ba+(-)**: kein neuer Beleg bekannt, letzte Meldung bei HORION (1951) [BÜCHE i. l. 1999].

Pinus dubius STURM, 1837: **MV+(-)**: Gothmann, ZIEGLER, 6.VI.1994 [ZIEGLER i. l. 1999].

Familie OEDEMERIDAE

Anogcodes fulvicollis (Scop., 1763): **Ba+(-)** [HORION 1956].

Ischnomera caerulea (L., 1758): **Hs+**: Erlensee, 21.III.1970, Hanau, 22.V.1979 und Hünfeld, 6.VI.1998, HÖHNER, 5 Ex. (gen.) [HÖHNER i. l. 1998].

Ischnomera cyanea (F., 1792): **MV+**: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 28.V.1994 [ZIEGLER i. l. 1999].

Ischnomera cinerascens (PAND., 1867): **MV+(-)**: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 28.V.1994 [ZIEGLER i. l. 1999]. **Ne+**: Amt Neuhaus, Forst Karrenzien, ZIEGLER, 14.V.1998 [ZIEGLER i. l. 1999].

Oedemera subulata OL., 1794: **Hs+(-)**: der aktuellen Meldung im Katalog lag eine pfälzische Quelle zugrunde, der Art muß ein neuer Status zugeordnet werden [FRANCK 1933, KLINGER i. l. 1999].

Oedemera monticola SVIHLA, 1978: **Ba+**: Todtmoos, Oberer Hotzenwald, Finsterlinger Moor, MERTENS, V.98, 1 Ex. (t. Ch. NEUMANN) [MERTENS mdl. 1999].

Familie PYTHIDAE

Pyro depresso (L., 1767): **Ba+** [BENSE & GEIS 1998].

Familie SALPINGIDAE

Rabocerus foveolatus (LJUNG, 1823): **Ba+** [KLESS 1998].

Lissodema cursor (GYLL., 1813): **MV+(-)**: Röggeliner Holz, ZIEGLER, 27.VI.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Familie SCRAPTIIDAE

Anaspis bohemica SCHILSKY, 1898: **Ne+**: Wichtenbek, MEYBOHM, 21.V.1998 [ZIEGLER i. l. 1999].

Anaspis thoracica (L., 1758): **MV+(-)**: Gothmann, ZIEGLER, 6.VI.1994 [ZIEGLER i. l. 1999].

Anaspis ruficollis (F., 1792): **Wt+** [MEYER 1966].

Anaspis melanostoma COSTA, 1854: **Rh+**: Taben-Rodt/Saar, Urwald von Taben, SCHEUERN, 30.V.1997, 2 Ex. (t. KÖHLER) [KÖHLER Taben].

Anaspis brunnipes MULS., 1856: **MV+(-)**: Gothmann, ZIEGLER, 18.VIII.1994 [ZIEGLER i. l. 1999].

Anaspis varians MULS., 1856: **Sd+**: Saarbrücken, Trarbacher Platz, EISINGER, 28.VI.1998, 27 Ex. von Blüten geklopft [coll. EISINGER].

Familie ADERIDAE

Aderus populeus (CREUTZ., 1796): **MV+(-)**: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 28.V.1994 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Euglene pygmaea (DEGEER, 1774): **Hs+(-)**: Neuhof, NWR Schönbusche, FLECHTER, 1990-92 [DOROW et al. im Druck].

Anidorus nigrinus (GERM., 1831): **MV+**: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 28.V.1994 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Otolitus pruinosis (KIESW., 1861): **Ba!**: Karlsruhe, Stutensee, NO-WOTNY, VI.1948 und IV.1951, 3 Ex. am Fuß von alten Eichen gesiebt, sicher Fehlbestimmung, da nicht bei HORION (1956) [NO-WOTNY 1951, MAUS i. l. 1999].

Familie ANTHICIDAE

Anthis luteicornis SCHM., 1842: **HN+**: Einbeck, Salzderhelden, WILLERS, 28.V.1989, 1 Ex an einem trockenen Wiesengraben [coll. WILLERS, L. SCHMIDT i. l. 1999].

Omonadus formicarius (GOEZE, 1777): MV+(-): Duvennest, ZIEGLER, 29.VI.1992 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].
Stricticomus tobias (MARS., 1879): MV+: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 27.VII.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Familie MELOIDAE

Lyta vesicatoria (L., 1758): Wt+(:) [WURST 1986].

Meloe cicatricosus LEACH, 1811: Hs+(:) der Angabe im Katalog liegt nur eine pfälzische Quelle zugrunde, die Art ist für Hessen zu streichen [KLINGER i. l. 1999].

Meloe coriarius BR.ER., 1832: Ba- [HORION 1956].

Meloe hungarus SCHRK., 1776: Ba- [HORION 1956].

Familie MORDELLIDAE

Variimorda villosa (SCHRANK, 1781): MV+(:): Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 27.VII.1995 [ZIEGLER i. l. 1999].

Mordella huetheri ERM., 1956: Sd+ [KÖHLER 1998g].

Curimorda bisignata (REDT., 1849): Br+ [ESSER 1998b]. Sn+(:) [BENSE 1998].

Mordellistena perrisi (MULS., 1856): Br+(:) [ESSER 1998b]. MV+: Gothmann, ZIEGLER, 6.VI.1994 [ZIEGLER i. l. 1999]. Rh+ [KÖHLER 1998e]. St+: Beringen, Elbaue, BÜCHE, 4.VI.1998, sehr zahlreich auf einem Trockenrasen auf Blüten von *Jasione montana* Wenddorf, BÜCHE, 14.VI.1998 - Zieltitz, ESSER, 6.VIII.1998 [BÜCHE i. l. 1999]. *Mordellistena parvula* (GYLL., 1827): St+(:): Bebertal, NSG Wellesberge, BÜCHE, 17.VI.1997, 1 Ex. - Olbetal, BÜCHE, 4.VII.1997, 1 Ex. [BÜCHE i. l. 1999].

Mordellistena stoeckleini ERM., 1956: Ba+: Hartheim, Rheinaue, BÜCHE, 15.V.1997, mehrfach auf einer schütter bewachsenen Trockenrasenfläche gekeeschert [BÜCHE i. l. 1999].

Mordellistena bicoloripilosa ERM., 1967: Ba+: Karlsruhe-Neureut, BÜCHE, 11.VI.1989, 1 Männchen [BÜCHE i. l. 1999]. Pf+: Neulauterburg, Bienwald. BÜCHE 21.VI.1992, zahlreich auf einer trockenen Rasenfläche von *Artemisia vulgaris* geklopft [BÜCHE i. l. 1999]. St+: Wenddorf, BÜCHE, 14.VI.1998, 3 Ex. auf einer Feldbrache von Rainfarm (*Tanacetum vulgare*) [BÜCHE i. l. 1999].

Mordellistena kraatzii EM., 1876: St+: Höldingen, Windmühlenberg, BÜCHE, 31.V.1996, 1 Ex. auf einem brachgefallenen Trockenrasen gekeeschert [BÜCHE i. l. 1999].

Mordellistena pseudobreviscauda ERM., 1963: Rh+(:) der Beleg vom Koppelstein bei Braubach (KÖHLER 1993) gehört zu *Mordellistena brevicauda* (KÖHLER det.) [KÖHLER 1998e].

Mordellistena confinis COSTA, 1854: Rh+(:) der Beleg vom Bausenberg bei Niederzissen/Eifel (KÖHLER 1978) gehört zu *Mordellistena reitteri* (HORAK det.) [KÖHLER 1998e].

Mordellistena luteipalpis SCHILSKY, 1895: St+: Rogätz, Elbtal bei Sandkrug, BÜCHE, 9.VI.1998 & ESSER, 13.VI.1998, zahlreich von einem blühenden Bestand der Eselswolfsmilch (*Euphorbia esula*) gekeeschert [BÜCHE i. l. 1999].

Mordellistena pureoneigra ERM., 1963: Hs+: Darmstadt, Vogt, 22.X.1961, 1 Ex. (coll. HÖHNER) [HÖHNER i. l. 1998]. St+: Olbetal, BÜCHE, 4.VII.1997, BÜCHE, 2 Ex. auf einem *Stipa capillata*-Steppenrasen [BÜCHE i. l. 1999].

Mordellistena hollandica ERM., 1966: No+(:) Belege fehlen oder sind falsch determiniert [KÖHLER 1998e]. Rh+(:) Belege fehlen oder sind falsch determiniert [KÖHLER 1998e].

Mordellistena neuwaldeggiana (PANZ., 1796): Sn+ [BENSE 1998].

Mordellistena nanula ERM., 1967: MV+ [ERMISCH 1967].

Mordellistena pseudonana ERM., 1956: Wt+ [MEYER 1966].

Mordellistena acuticollis SCHILSKY, 1895: St+(:): Ballenstedt, Geestesteine, 13.VII.1995, zahlreich - Wenddorf, 14.VI.1998, 1 Ex. Rogätz, Sandkrug, 13.VI.1998, 3 Ex., jew. BÜCHE leg. an *Artemisia campestris* [BÜCHE i. l. 1999].

Mordellochroa tournierii EM., 1876: Wt+ [HARDE & KÖSTLIN 1965].

Familie MELANDRYIDAE

Eustrophus dermestoides (F., 1792): Ba+ [REIBNITZ 1992].

Hallomenus axillaris (ILL., 1807): MV+(:): Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 26.VI.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Orchesia luteipalpis MULS., 1857: Sn+ [BENSE 1998]. St+: Everingen, Seggerder Bruch, BÜCHE, IX.96, zahlreich in Fruchtkörpern des Erlen-Schillerporlings (*Inonotus radiatus*) beobachtet [BÜCHE i. l. 1999].

Orchesia fasciata (ILL., 1798): St+(:): Seebenauer Holz, ZIEGLER, 3.VII.1993 [ZIEGLER i. l. 1999].

Anisoxys fuscula (ILL., 1798): MV+(:): Stintenburg, Schaalsee, ZIEGLER, 13.VII.1995 [ZIEGLER i. l. 1999]. Sn+ [BENSE 1998].

Abdera affinis (PAYK., 1799): Sn+(:) [BENSE 1998]. St+(:): Everingen, Seggerder Bruch, BÜCHE, IV.97, aus Fruchtkörpern des Erlen-Schillerporlings (*Inonotus radiatus*) gezogen [IX.96] [BÜCHE i. l. 1999].

Abdera flexuosa (PAYK., 1799): St+(:): Everingen, Seggerder Bruch, BÜCHE, IV.97, aus Fruchtkörpern des Erlen-Schillerporlings (*Inonotus radiatus*) gezogen [IX.96] [BÜCHE i. l. 1999].

Abdera quadriasciata (CURT., 1829): By+ [REIBNITZ 1996].

Abdera triguttata (GYLL., 1810): MV+(:): Stintenburg, Schaalsee, ZIEGLER, 13.VII.1995 [ZIEGLER i. l. 1999].

Hypulus querinus (QUENSEL, 1790): No+(:): Wesel, Diersfordter Wald, SCHAFR, Funddaten? [coll. SCHAFR].

Zilora sericea (STURM, 1807): Ba+ [SZALLIES 1998].

Familie TETRATOMIDAE

Tetratoma desmarestii LATR., 1807: Wt+ [REIBNITZ 1992].

Tetratoma ancora F., 1790: MV+(:): Röggeliner Holz, ZIEGLER, 25.VII.1995 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Familie LAGRIIDAE

Lagria atripes MULS.GUILLB., 1855: MV+: Klein Schmölen, Dömitz, ZIEGLER, 8.VI.1994 [ZIEGLER i. l. 1999].

Familie ALLECULIDAE

Allecula morio (F., 1787): Sd+: Saarbrücken, WaldSG Steinbachtal, MÖLLER, Funddaten unbekannt [coll. MÖLLER, EISINGER i. l. 1999].

Allecula rhenana BACH, 1856: Sd+: Saarbrücken, Saarkohlenwald, MÖLLER, VIII.1998, 1 Ex. nachts an einer großen Buchenruine [MÖLLER i. l. 1999].

Prionychus melanarius (GERM., 1813): Sd+: Saarhölzbach, Nähe Steinbruch Arweiler, LILLIG, 8.VIII.1998, 1 Ex. aus morscher Birke [coll. LILLIG, EISINGER i. l. 1999].

Mycetochara flavipes (F., 1792): Br+(:): Schleipzig, Unterspreewald, BENSE, 1998, mehrfach, an Leimringen [BENSE i. l. 1999].

Mycetochara axillaris (PAYK., 1799): Ba- [NOWOTNY 1951].

Mycetochara humeralis (F., 1787): Ba+ [NOWOTNY 1951].

Omophlus lepturoides (F., 1787): By+(:): „Allacher Forst München“ beruht auf Fehlbestimmung, die Art ist also verschollen (vgl. HORION 1956) [KÖHLER i. l. 1999]. Hs+(:): Der Fundort bei BETTAG et al. (1980) liegt an der Nahe, nicht in Hessen. [KÖHLER i. l. 1999].

Familie TENEBRIONIDAE

Bolitophagus reticulatus (L., 1767): Sd+: Saarhölzbach, Hundscheider Bach, LILLIG, 16.V.1998, 1 Ex. aus verpilztem Holz [coll. LILLIG, EISINGER i. l. 1999].

Platydema dejeani CAST.BRULLE, 1831: St+ [GEIS & TRÖGER 1997].

Alphitophagus bifasciatus (SAY, 1823): MV+(:): Duvennest, ZIEGLER, 29.VI.1992 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Myrmecihexenus subterraneus (CHEVR., 1835): MV+: Pritzier, ZIEGLER, 4.I.1999 [ZIEGLER i. l. 1999].

Myrmecihexenus vaporariorum (GUER, 1843): MV+: Duvennest, ZIEGLER, 29.VI.1992 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Corticibus bicoloroides (ROUB., 1933): Hs+: Frankfurt, Enkheimer Wald, 6.IX.1997, 1 Ex. aus morschem Holz eines Hainbuchen-Dürrständers (d 15-20 cm) [FLECHTNER i. l. 1999]. St+: Schartau, ESSER, 21.VI.1998, 2 Ex. an einer durch *Agrilus ateus* zum Absterben gebrachten, jungen Hybridpappel [BÜCHE i. l. 1999].

Palorus depressus (F., 1790): Sn+(:) [BENSE 1998].

Tribolium madens (CHARP., 1825): **Hs+:** Hanau, DEHNERT, 16.X.1976, 2 Ex. in einer Wohnung [HÖHNER i. l. 1998].

Tribolium confusum DUVAL, 1863: **Wt+(+):** Ennigerloh, RÖWEKAMP, 14.VIII.1996, 1 Ex. (t. RENNER) [RÖWEKAMP & RENNER i. l. 1998].

Gnatoecerus cornutus (F., 1798): **Ba+:** Karlsruhe, Universitäts-gelände, NEUMANN, XI.88, 1 Ex. synanthrop [NEUMANN i. l. 1999].

Ne+: Oldendorf, Lühe, HENGSMITH, 20.I.1999 [ZIEGLER i. l. 1999].

Latheticus oryzae WTRH., 1880: **Ne+(+):** mehrere Funde im Autoke-scher [ZIEGLER i. l. 1999].

Uloma culinaris (L., 1758): **Ba+** [HORION 1956, KNAPP 1998].

St+(-): [LÜCKMANN 1998].

Uloma rufa (PILL.MITT., 1783): **Wt-** [HORION 1956].

Stenomax aeneus (SCOP., 1763): **Hs+(+):** der aktuellen Meldung im Katalog lag eine pfälzische Quelle zugrunde, der Art muß ein neuer Status zugeordnet werden [HEYDEN 1904, KLINGER i. l. 1999].

Familie TROGIDAE

Trox perrisi FAIRM., 1868: **Ba+:** Freiburg-Ebringen, Schönberg, BAUM, IV.91, 1 Ex. (NEUMANN det.) in einer hohen Buche - Karlsruhe, Hardtwald, NEUMANN, 28.I.1990, 1 Ex. (t. GLADITSCH) in einer Spechthöhle in einer umgestürzten Eiche [NEUMANN i. l. 1999].

Familie GEOTRUPIDAE

Trypocopris pyrenaeus (CHARP., 1825): **Ba-** [HORION 1958, KRELL & FERY 1992].

Familie SCARABAEIDAE

Caccobius schreberi (L., 1767): **Wt.** [HORION 1958].

Onthophagus semicornis (PANZ., 1798): **By+:** Erlangen, Exerzierplatz, LAMPERSTORFER, 6.IX.1997 [SCHAFFRATH i. l. 1999].

Onthophagus vacca (L., 1767): **Wt+** [HORION 1958].

Aphodius brevis (ER., 1848): **WE+(-):** [MAUS 1983].

Aphodius quadriguttatus (HBST., 1783): **Hs(+):** Die Meldung von WEBER (1903) beruht vermutlich auf einer Namensverwechslung, die Art ist daher zu streichen [SCHAFFRATH 1994].

Aphodius pubescens STURM, 1800: **Hs(-):** Bei den Belegen in der Sammlung RIEHL (Marburg) handelt es sich um *Aphodius prodro-mus*, das Artvorkommen ist fraglich [SCHAFFRATH 1994].

Aphodius obscurus (F., 1792): **Ba+(-):** [HORION 1951].

Aphodius merdarius (F., 1775): **Hs(-):** [SCHAFFRATH 1994].

Aphodius convexus (ER., 1848): **Hn+:** Stadtoldendorf, Vaseberg, L. SCHMIDT, 9.V.1998, 1 Ex. an Schafskot [coll. L. SCHMIDT].

Aphodius borealis GYL., 1827: **Hs+** [SCHAFFRATH 1994].

Aphodius nemoralis ER., 1848: **Hs+:** Giesel, Schieferfarrain, SCHAFF-RATH, 7.IV.1994 - Fulda, Nonnenrod, FRISCH, 30.III.1981 [SCHAFF-RATH i. l. 1999].

Aphodius ictericus (LAICH., 1781): **Hn+(-):** Hildesheim, Osterberg, L. SCHMIDT, VI.-VIII.97, mehrfach an Schafskot [coll. L. SCHMIDT].

Aphodius lugens CREUTZ., 1799: **Ba+:** [HORION 1958].

Aphodius corvinus ER., 1848: **Hs+(-):** [FLECHTNER et al. 1995, SCHAFFRATH 1994].

Aphodius plagiatus (L., 1767): **By+(-):** Erlangen, Exerzierplatz, LAMPERSTORFER, 12.III.1997 Bad Neustadt a. S., NIEDLING, 5.VII.1997 (SCHAFFRATH det.) [SCHAFFRATH i. l. 1999].

Aphodius varians DUFT., 1805: **Hs(-):** [SCHAFFRATH 1994].

Heptaulacus testudinarius (F., 1775): **Ba-(-):** [HORION 1958].

Euheptaulacus villosus (GYL., 1806): **Hs+:** Niddastromfeld, Nord-hang, A. SCHMIDT, 1998, 65 Ex. in Barberfallen [A. SCHMIDT mdl. 1998].

Omaloplia nigromarginata (KÜST., 1849): **Hs-** [RÖSSNER 1995].

Miltotrogus aequinotialis (HBST., 1790): **Wt-** [KRELL 1993].

Chaetopteroplia segetum (HBST., 1783): **Ba-** [HORION 1958].

Gnorimus variabilis (L., 1758): **By+(-):** Rohrbunn, Rohrberg, KOHLER, 30.VIII.1998, Torsu und Larven in liegender Eiche [coll. KOHLER].

Trichius zonatus GERM., 1794: **Hs+(+):** der aktuellen Meldung im Katalog lag eine pfälzische Quelle zugrunde, der Art muß ein neuer Status zugeordnet werden [KLINGER i. l. 1999, coll. KLINGER].

Familie LUCANIDAE

Aesalus scarabaeoides (PANZ., 1794): **Hs+(+):** der aktuellen Mel-dung im Katalog lag eine pfälzische Quelle zugrunde, der Art muß ein neuer Status zugeordnet werden [KLINGER i. l. 1999, coll. KLIN-GER].

Familie CERAMBYCIDAE

Ergates faber (L., 1767): **Ba+:** [HORION 1974].

Nothorhina punctata (F., 1798): **Wt+** [HORION 1975].

Tetropium gallicum WEISE, 1905: **Ba+:** [HORION 1974].

Akimarus schaefferi (LAICH., 1784): **Ba+(-):** Schützingen, Schützin-ger Wald, RUMMETSCHE, 26.VI.1921, 1 Ex. - Maulbronn [BENSE i. l. 1999, HORION 1974]. **Wt+(-):** der von Horion genannte Fundort (b. Maulbronn) liegt im heutigen Baden [BENSE i. l. 1999].

Cortoderia humeralis (SCHALL., 1783): **No+:** Windeck-Au, SCHUMA-CHER, 5.V.1995, 1 Ex. [BAUMANN 1997]. **Sd+:** Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i. l. 1999].

Corymbia fulva (DEGEER, 1775): **Wt+(-):** nach Revision von Belegen zu streichen [BENSE i. l. 1999].

Corymbia cordigera (FEUSSL., 1775): **Ba-** [HORION 1974]. **No+:** Duisburg -Homberg, PLEISTER, vor 1849, nach FÖRSTER (1849) si-cher Fehldetermination [BAUMANN 1997].

Lepturobosca virens (L., 1758): **Ba-(-):** Schwarzwald, Funde vor 1900 [HORION 1974]. **Wt+(-):** Tübingen, Schönbuch, eine sehr zweifelhafte Meldung von ECKERT & LAUTERBACH [BENSE i. l. 1999].

Trichoferus griseus (F., 1792): **Bai:** Grissheim, Rheinaue, MATERN, 4.VIII.1998, 1 Ex. (KÖHLER det.) von Ulme geklopft [NEUMANN i. l. 1999].

Molorchus marmottani BRIS., 1863: **Hs+(+):** der aktuellen Meldung im Katalog lag eine pfälzische Quelle zugrunde, der Art muß ein neuer Status zugeordnet werden [HEYDEN 1904, KLINGER i. l. 1999]. *Rosalia alpina* (L., 1758): **Ba+(-):** Irndorf, Donautal, BENSE, seit 1992, mehrfach, an exponiertem Buchenholz [BENSE i. l. 1999]. **Nov** Köln -Mitte, AERTS, 1920, 1 Ex., verschleppt [BAUMANN 1997]. *Ropalopus clavipes* (F., 1775): **Hs+(-):** der Angabe im Katalog liegt nur eine pfälzische Quelle zugrunde, die Art ist für Hessen zu streichen [KLINGER i. l. 1999].

Xylotrechus stebbingi GAHAN, 1906: **Bai:** Kippenheim bei Lahr, MEINEKE, 11.VII.1994, 1 Ex. (BENSE det., coll. NEUMANN) in einer Lichtfalle [NEUMANN i. l. 1999].

Clytus rhamni GERM., 1817: **No+:** Velbert-Neviges, Wuppertal-El-berfeld und Duisburg-Homberg, vor 1900, ohne Belege [BAUMANN 1997].

Plagionotus floralis (PALL., 1773): **No+:** Velbert-Neviges, DE ROSSI, vor 1896, 1 Ex., nach GEILENKEUSER (1896), sicher Fehldetermina-tion [BAUMANN 1997].

Chlorophorus varius (MÜLL., 1766): **Hs+(-):** der Angabe im Katalog liegt nur eine pfälzische Quelle zugrunde, die Art ist für Hessen zu streichen [KLINGER i. l. 1999].

Chlorophorus herbistii (BRAHM, 1790): **Hs+(-):** der Angabe im Kata-log liegt nur eine pfälzische Quelle zugrunde, die Art ist für Hessen zu streichen [KLINGER i. l. 1999].

Chlorophorus pilosus (FORST., 1771): **Wtv** [HORION 1974]. *Isotomus speciosus* (SCHNEID., 1787): **Wtv** [HORION 1974].

Purpuricenus kaehleri (L., 1758): **Ba+(-):** [GAUSS 1963]. **Hs+(-):** der Meldung im Katalog lag eine pfälzische Quelle zugrunde, der Art muß ein neuer Status zugeordnet werden [PAULUS 1973, KLINGER i. l. 1999].

Parmena balteus (L., 1767): **Ba+:** Umkirch, Mooswald, VI.98, 1 Ex. aus einem Efeuast gezogen [ROPPEL 1998].

Monochamus sutor (L., 1758): **Hs+(-):** der Angabe im Katalog liegt nur eine pfälzische Quelle zugrunde, die Art ist für Hessen zu streichen [KLINGER i. l. 1999].

Mesosa curculionoides (L., 1761): **Ba+(-):** [HORION 1974].

Leiopus punctatus (PAYK., 1800): **No+:** Krefeld, vom BRUCK, vor 1900, 2 Ex., nach EVERTS (1901), Fehlbestimmung (ROETTGEN 1911) [BAUMANN 1997].

Acanthocinus reticulatus (RAZM., 1789): **Wt+(-):** Lorch, DOLDERER, vor 1950 [coll. DOLDERER, BENSE i. l. 1999].

Exocentrus adspersus MULS., 1846: **Sd+**: Saarbrücken, Saarkohlenwald, MÖLLER, VIII.1998, 1 Ex. am Licht [MÖLLER i. l. 1999].
Agapanthia cynarae (GERM., 1817): **No:** Duisburg-Homberg, PLIESNER, vor 1849, 1 Ex., nach FÖRSTER (1849), Fehlbestimmung [BAUMANN 1997].
Saperda perforata (PALL., 1773): **Hs-(+)**: der aktuellen Meldung im Katalog lag eine pfälzische Quelle zugrunde, der Art muß ein neuer Status zugeordnet werden [HEYDEN 1904, KLINGER i. l. 1999]. **Wt(-)** [HORION 1974].
Menesia bipunctata (ZOUBK., 1829): **Hs(+)**: der aktuellen Meldung im Katalog lag eine pfälzische Quelle zugrunde, der Art muß ein neuer Status zugeordnet werden [HEYDEN 1904, KLINGER i. l. 1999].
Oberea erythrocephala (SCHRK., 1776): **Wt(-)** [HORION 1974].
Phytoecia scutellata (F., 1792): **Ba-**: Untergrombach, Michaelsberg, NOWOTNY, VI.1949 [HORION 1974]. **Hs(+)**: der Angabe im Katalog liegt nur eine pfälzische Quelle zugrunde, die Art ist für Hessen zu streichen [KLINGER i. l. 1999].
Phytoecia uncinata (REDT., 1842): **Ba+** [HORION 1974].
Phytoecia molybdaea (DALM., 1817): **Hs(+)**: der Angabe im Katalog liegt nur eine pfälzische Quelle zugrunde, die Art ist für Hessen zu streichen [KLINGER i. l. 1999].
Tetrops starkii CHEVR., 1859: **No+** [BAUMANN 1997].

Familie CHRYSOMELIDAE

Donacia versicolorea (BRAHM, 1790): **Hs(+)**: der aktuellen Meldung im Katalog lag eine pfälzische Quelle zugrunde, der Art muß ein neuer Status zugeordnet werden [HEYDEN 1904, KLINGER i. l. 1999].

Donacia malinovskyi AHR., 1810: **Ne(+)**: die Meldung beruhte auf einer Fehlbestimmung [ZIEGLER i. l. 1999].

Donacia sparganii AHR., 1810: **St+**: Stendat, Schönhauser Damm, Trübenbruch, SPRICK, 8.VII.1997, 1 Ex. von *Sparganium emersum* [coll. SPRICK, L. SCHMIDT i. l. 1999].

Donacia obscura GYLL., 1813: **Ba+** [BAUM 1989].

Donacia thalassina GERM., 1811: **Ba-** [HARTMANN 1907].

Donacia tormentosa AHR., 1810: **Hs(+)**: der Angabe im Katalog liegt nur eine pfälzische Quelle zugrunde, die Art ist für Hessen zu streichen [KLINGER i. l. 1999].

Plateumaris braccata (SCOP., 1772): **Hn+**: Wolfsburg, ohne Finder, VIII.1972, 1 Ex. (M. SCHMITT det., coll. MAUS) [MAUS i. l. 1999].
Oulema duftschmidii (REDT., 1874): **Sd+**: Altforweiler, Häsfeld, EISINGER, 25.V.1997, 1 Ex. [coll. EISINGER].

Labidostomis tridentata (L., 1758): **Ba+**: Efringen, 30.V.19 vor 1926, LAUTERBORN, auf Eichengebüsch - Gräfheim, MAUS & NEUMANN, S.VI.1993 und 11.V.1994, 3 Ex. [LAUTERBORN 1926, MAUS & MAUSER in Vorber.]. **Hn-**: Braunschweig, querumer Holz, STEINHAUSEN, 30.V.1949, 1 Ex. [coll. STEINHAUSEN, L. SCHMIDT i. l. 1999].

Labidostomis lucida (GERM., 1823): **Hs-(+)**: der aktuellen Meldung im Katalog lag eine pfälzische Quelle zugrunde, der Art muß ein neuer Status zugeordnet werden [ERBER 1983, KLINGER i. l. 1999].

Labidostomis longimana (L., 1761): **Hn+**: Langelsheim, Kahnstein, SPRICK & E. PALM, 21.VI.1998, 1 Ex. [coll. SPRICK, L. SCHMIDT i. l. 1999].

Pachybrachis hieroglyphicus (LAICH., 1781): **Hn-**: Alfeld, ohne Datum, 2 Ex. (L. SCHMIDT det.) [coll. Mus. Hannover, L. SCHMIDT i. l. 1999].

Pachybrachis sinuatus MULS.REY, 1859: **Hs(+)**: der Angabe im Katalog liegt nur eine pfälzische Quelle zugrunde, die Art ist für Hessen zu streichen [KLINGER i. l. 1999].

Pachybrachis picus WEISE, 1882: **Ba-(+)** [BAUM 1989].

Cryptocnemis cordyli (L., 1758): **Hs+**: Darmstadt, 27.V.1982, 3.VI.1983 und 27.V.1988, HÖHNER, 4 Ex. an *Tilia* - Lorch, SCHINDLER, 26.V.1963, 1 Ex. [HÖHNER i. l. 1998].

Cryptocnemis distinguenda SCHNEID., 1792: **Ba+(+)**: Hotzenwald, Spielmannswies, MERTENS, an *Betula pubescens* [MAUS i. l. 1999].
Cryptocnemis primaria HAR., 1872: **Hs(+)**: der Angabe im Katalog liegt nur eine pfälzische Quelle zugrunde, die Art ist für Hessen zu streichen [KLINGER i. l. 1999].

Cryptocnemis punctiger PAYK., 1799: **Ba+**: Grissheim, Rheintrockenau, NEUMANN, 16.VI.1993, 2 Ex. (t. MAUS) [NEUMANN i. l. 1999]. **Hn-**: Barsinghausen, Klosterforst, ohne Datum, 1 Ex. (t. SPRICK) [coll. Mus. Hannover, L. SCHMIDT i. l. 1999].

Cryptocnemis parvulus MÜLL., 1776: **Rh+(+)**: Taben-Rodt/Saar, Urwald von Taben, KÖHLER, 30.V.1997, 2 Ex. auf einer Blockhalde von Birken geklopft [KÖHLER Taben].

Cryptocnemis quadripustulatus GYLL., 1813: **MV+(+)**: Gothmann, ZIEGLER, 1.VI.1994 [ZIEGLER i. l. 1999].

Cryptocnemis bilineatus (L., 1767): **Hn-**: Hannover, Annateich, 8.VII.1935, 2 Ex. (L. SCHMIDT det.) [coll. Mus. Hannover, L. SCHMIDT i. l. 1999].

Cryptocnemis fulvius GOEZE, 1777: **Sd+**: Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i. l. 1999].

Cryptocnemis macellus SUFFR., 1848: **Hs+**: Lorch, Weinbergslagen, HÖHNER, 13.VII.1996 und 27.VII.1996, 11 Ex. auf Eichen [HÖHNER i. l. 1998].

Cryptocnemis populi SUFFR., 1848: **Hs(+)**: der Angabe im Katalog liegt nur eine pfälzische Quelle zugrunde, die Art ist für Hessen zu streichen [KLINGER i. l. 1999].

Oomorphus concolor (STURM, 1807): **Hn+** [JUNG 1998].

Pachnephorus pilosus (ROSSI, 1790): **Hn-**: Hildesheim, ohne Datum, 1 Ex. (L. SCHMIDT det.) [coll. Mus. Hannover, L. SCHMIDT i. l. 1999].

Chrysolina cerealis (L., 1767): **Hs(+)**: der aktuellen Meldung im Katalog lag eine pfälzische Quelle zugrunde, der Art muß ein neuer Status zugeordnet werden [PATRI 1936, KLINGER i. l. 1999].

Chrysolina purpurascens (GERM., 1817): **Hs+** [FLECHTNER et al. 1993, SCHÜRMANN 1968].

Chrysolina oricalcia (MÜLL., 1776): **Sd-(+)**: Niederkirchen, Biotop, EISINGER, 2.VIII.1985, 1 Ex. aus Mähgut [coll. EISINGER].

Chrysolina fuliginosa (OL., 1807): **Hn-**: Ringelheim, VI.1908, 2 Ex. (L. SCHMIDT det.) [coll. Mus. Hannover, L. SCHMIDT i. l. 1999].

Chrysolina hyperici (FORST., 1771): **MV+**: Rüterberg, Elbe, ZIEGLER, 31.VIII.1994 [ZIEGLER i. l. 1999].

Chrysolina brunsvicensis (GRAV., 1807): **Hn+(+)**: Hannover, Ahlener Wald, STEINHAUSEN, 11.IX.1952, mehrfach [coll. STEINHAUSEN, L. SCHMIDT i. l. 1999].

Chrysolina quadrigeminata (SUFFR., 1851): **Ba-** [HARTMANN 1907].

Chrysolina analis (L., 1767): **Hn-**: Eschede, 17.X.1909, 1 Ex. [coll. Mus. Hannover, L. SCHMIDT i. l. 1999].

Chrysolina marginata (L., 1758): **Sd+**: Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i. l. 1999].

Neophaedon pyritosus (ROSSI 1792): **Ba-** [HARTMANN 1907].

Chrysomela collaris L., 1758: **Hn-**: Engelbostel, 16.VI.1924, 2 Ex. [coll. Mus. Hannover, L. SCHMIDT i. l. 1999].

Phratora atriorevires (CORN., 1857): **Hs+(+)**: Berger, Hang, Gettenbach, Hanau, Obertshausen, omnia HÖHNER leg. [HÖHNER i. l. 1998].

Galeruca interrupta ILL., 1802: **Hn-**: Mandelsloh, VI.1916, 3 Ex. [coll. Mus. Hannover, L. SCHMIDT i. l. 1999].

Galeruca laticollis SAHLB., 1837: **Hn+(+)**: Harz, Hohegeiß, SPRICK, 30.V.1998, mehrere Larven von *Trollius europaeus* gesammelt, zwei Wochen später 5 Imagines erhalten. [coll. SPRICK, L. SCHMIDT i. l. 1999].

Galeruca melanocephala PONZA, 1805: **MV+**: Dömitz, ZIEGLER, 20.VII.1996 [ZIEGLER i. l. 1999].

Luperus flavipes (L., 1767): **MV+(+)**: Gothmann, ZIEGLER, 6.VI.1994 [ZIEGLER i. l. 1999].

Phylloptreta christinae (HKTR., 1941): **Hs+** [FLECHTNER et al. 1995].

Phylloptreta diadema FOUDR., 1860: **Ba+(+)**: Grissheim, Rheintrockenau, NEUMANN, 28.VI.1995, 2 Ex. (t. DÖBERL) [NEUMANN i. l. 1999].

Phylloptreta consobrina (CURT., 1837): **Ba-(+)** [HORION 1955b].

Phylloptreta procura (REDT., 1849): **Wf-**: Neubeckum, Steinbruch, RÖWEKAMP, 12.X.1996, 1 Ex. (t. RENNER) [RÖWEKAMP & RENNER i. l. 1998].

Aphthona abdominalis (DUFT., 1825): **Wt+** [HARDE & KÖSTLIN 1965].

Longitarsus ochroleucus (MARSH., 1802): **Hn+(+)**: Salzgitter-Thiede, Thieder Lindenberge, STEINHAUSEN, 4.IX.1952, mehrfach [coll. STEINHAUSEN, L. SCHMIDT i. l. 1999].

- Longitarsus symphyti* HKTR., 1912: **Wt+** [MEYER 1966].
Longitarsus australis (MULS.REY, 1874): **Ba-(-)**: Kaiserstuhl, Lili- enhof, MAUS, 27.IV.1985, 4 Ex. (DÖBERL det.) - Grissheim, Rheintrockenau, NEUMANN, 1. und 5.IX.1994, zahlreich [MAUS 1987, NEUMANN i. l. 1999].
Longitarsus ferrugineus (FOUDR., 1860): **St+**: Stendal, NSG Bindfelde, SPRICK, 4.IX.1997, 2 Ex. an einem neu angelegten Still- gewässer unter *Mentha arvensis* [coll. SPRICK, L. SCHMIDT i. l. 1999].
Longitarsus membranaceus (FOUDR., 1860): **Hs+(?)**: Hanau, Kleine Bulau, HÖHNER, 22.XII.1993 aus Hochwassergarten [HÖHNER i. l. 1998].
Longitarsus lewisii (BALY, 1874): **Ba+**: Hartheim, Rheintrockenau, BÜCHE, 15.V.1997, zahlreich [NEUMANN i. l. 1999].
Longitarsus dorsalis (F., 1781): **Sd+**: Saarbrücken, Trarbacher Platz, EISINGER, 29.III.1998, 1 Ex. (KÖHLER det.) aus verrottenden Stengeln gesiebt [coll. EISINGER].
Longitarsus parvulus (PAYK., 1799): **Ba-** [HARTMANN 1926].
Altica brevicollis FOUDR., 1860: **St+**: Stendal, Springlaake, SPRICK, 4.V.1993, 10 Ex. in einem feuchten Laubwald am Waldrand von *Corylus avellana* - Seebenauer Holz, ZIEGLER, 3.VII.1993 [SCHMIDT i. l. 1999, ZIEGLER i. l. 1999].
Batophila rubi (PAYK., 1799): **MV+(-)**: Gothmann, ZIEGLER, 18.VIII.1994 [ZIEGLER i. l. 1999].
Ochrosis ventralis (ILL., 1807): **Hn-**: Hils, ohne Datum, 2 Ex. [coll. Mus. Hannover, L. SCHMIDT i. l. 99]. **Wt+()** [KÖSTLIN 1958b].
Asioptera nigritula (GYLL., 1813): **Hn-**: Deister, ohne Datum, 2 Ex. (t. SPRICK) [coll. Mus. Hannover, L. SCHMIDT i. l. 99].
Crepidodera aurea (FOURCR., 1785): **MV+(-)**: Gothmann, ZIEGLER, 18.VIII.1994 [ZIEGLER i. l. 1999].
Chaetocnema procerula (ROSH., 1856): **Br+(-)** [ESSER 1998b].
Chaetocnema procerula (ROSH., 1856): **Wt+** [HARDE & KÖSTLIN 1965].
Chaetocnema compressa (LEIZN., 1846): **MV+**: Klein Schmölen, Dömitz, ZIEGLER, 8.VI.1994 [ZIEGLER i. l. 1999]. **No+**: Wesel, Diers- fordter Wald, SCHARF, 10.X.1995, 1 Ex. (coll. RÖWEKAMP, t. RENNER) [RÖWEKAMP & RENNER i. l. 1998].
Apteropeda splendida ALL., 1860: **Hn+**: Deister, Steinkrug, SPRICK, 21.V.1998, 2 Ex. (t. GÜRLICH) [coll. SPRICK, L. SCHMIDT i. l. 1999].
Apteropeda globosa (ILL., 1794): **Hn+**: Diekholzen, Kalte Beuster, L. SCHMIDT, 30.V.1998, 1 Ex. [coll. L. SCHMIDT].
Mniophila muscorum (KOCH, 1803): **Pf+**: Schaidt, NWR Mörder- häufel, KÖHLER, 28.IX.1997, 15 Ex. an einem bemoosten Eichenstamm [KÖHLER Bienwald].
Dibolia cynoglossi (Koch, 1803): **Ba-** [HORION 1955b].
Psylliodes luteolus (MÜLL., 1776): **Ba-** [HORION 1955b].
Psylliodes thlaspis FOUDR., 1860: **Ba-** [HARTMANN 1907].
Cassida murraea L., 1767: **MV+(-)**: Dömitz, ZIEGLER, 9.VIII.1994 [ZIEGLER i. l. 1999].
Cassida margaritacea SCHALL., 1783: **St+**: Athenstedt, JUNG, 1998, 1 Ex. [JUNG i. l. 1999].

Familie BRUCHIDAE

- Spermophagus calystegiae* LUKJ.TER-MIN., 1957: **No+**: Frechen, Grube Karl, KÖHLER, 10.VII.1998, 6 Ex. auf ehemaligem Bahngelände [coll. KÖHLER].
Bruchus rufipes HBST., 1783: **SH+**: Beleg in coll. LOHSE aus Bad Oldesloe [ZIEGLER i. l. 1999].

Familie ANTHRIBIDAE

- Tropidereus dorsalis* (THUNB., 1815): **Wt+**: Isny, NSG Bodenmösler, BENSE, 6.1998, 1 Ex., Zucht aus Birkenästen [BENSE i. l. 1999].
Phaeochrotes cinctus (PAYK., 1800): **SH+**: Dalldorf, ZIEGLER, 17.VI.1998 [ZIEGLER i. l. 1999].
Choragus sheppardi KIRBY, 1818: **Ba+**: Rheinmünster-Greffern, Rheinwald, REIBNITZ, 19.VI.1994, 1 Ex. [BENSE i. l. 1999]. **Br+**: Schleipzig, Unterspreewald, BENSE, 1998, 1 Ex. am Leimring [BENSE i. l. 1999].

Familie SCOLYTIDAE

- Scolytus multistriatus* (MARSH., 1802): **Sd+(-)** [EISINGER 1997].
Hylastes ater (PAYK., 1800): **Ba+**: Grissheim, Rheintrockenau, SZALLIES, 7.IV.1996, 2 Ex. (t. BENSE) [NEUMANN i. l. 1999].
Hylastes linearis ER., 1836: **Ba+**: Grissheim, Rheintrockenau, GEIS, 8.V.1994, 1 Ex. (BENSE det.) [BENSE & NEUMANN i. l. 1999]. **Wt+** [RAHLE 1972].
Hylurgus ligniperda (F., 1792): **Sd+**: Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i. l. 1999].
Hylesinus oleiperda (F., 1792): **Rh+(-)**: Spay, Rheinbogen, KÖHLER, 6.VI.1998, 1 Ex. im Autokescher [coll. KÖHLER]. **Sn+(-)** [BENSE 1998].

Pteleobius kraatzi EICHH., 1864: **Hs-**: ohne Fundort (event. auch Rheinhessen?) [HORION 1951].

Xylechinus pilosus (RATZ., 1837): **Pf+**: Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, 15.V.1998, 1 Ex. in einer Fensterfalle an einer Kiefer [KÖHLER Mummelskopf].

Lymantor aceris LINDEM., 1875: **St+**: Seebenauer Holz, ZIEGLER, 7.VII.1993 im Autokescher [ZIEGLER i. l. 1999].

Dryocoetes hectographus RTT., 1913: **Ba+**: Schwarzwald, mehrere Fundorte (t. BENSE) [coll. Museum Stuttgart].

Ernporicus caucasicus LINDEM., 1876: **Ba+**: Münstertal/Südschwarzwald, 450 m, BAUM, aus Lindenästen - Berghausen, BÜCHE, 25.V.1987, 1 Ex. - Untergrombach, NSG Kaiserberg, VI.91, 1 Ex. in coll. BÜCHE [BAUM 1989, BÜCHE i. l. 1999]. **Sn+(-)** [BENSE 1998].

Gnathotrichus materarius (FITCH, 1855): **SH+**: Düneberg bei Geesthacht, TOLASCH, 15.IV.1998 [ZIEGLER i. l. 1999].

Pityogenes bistridentatus (EICHH., 1879): **Br+(-)**, **By+(-)**, **Hs?(-)**, **Sn+(-)**, **Wt+(-)**: vermutlich jeweils *Pityogenes conjunctus* [BENSE i. l. 1999].

Pityogenes conjunctus (RTT., 1887): **Ba+** [BENSE 1996b].

Orthotomicus proximus (EICHH., 1867): **Ba+**: Hartheim, MAUS, 30.V.1981, 1 Ex. (det.coll. KAMP) - Grissheim, Rheintrockenau, NEUMANN, 11.IX.1994, zahlreich (BENSE det.) [KAMP 1983, NEUMANN i. l. 1999]. **Hs-**: Mitteldick, EGGERS, 9.X.1991, 2 Ex. (coll. HÖHNER) [HÖHNER i. l. 1998].

Ips cembrae (HEER, 1836): **MV+**: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 28.V.1995 [ZIEGLER i. l. 1999].

Xyleborus alni NIJIMA, 1909: **Hs-**: Neuhof, NWR Schönbusche, FLECHTER, 1990-92 [DOROW et al. im Druck].

Xyleborus peregrinus EGGERS, 1944: **Wf+**: Wimbern, Voßwinkel, LÜCKMANN, 16.V.1998, 2 Ex. (KÖHLER det.) und später weitere Exemplare in einem Eichenforst [KÖHLER i. l. 1998].

Familie RHYNCHITIDAE

Auletobius sanguisorbae (SCHRK., 1798): **Wt+()** [HARDE & KÖSTLIN 1962].

Rhynchites bacchus (L., 1758): **Ne+(-)**: Amt Neuhaus, Stixe, ZIEGLER, 23.IV.1998 [ZIEGLER i. l. 1999].

Deporaus tristis (F., 1794): **Rh+**: Taben-Rodt/Saar, Urwald von Taben, RENNER, 30.V.1997, 1 Ex. [KÖHLER Taben].

Familie APIONIDAE

Diplazon stolidum (GERM., 1817): **Sd+**: Saarbrücken, Trarbacher Platz, EISINGER, 18.V.1998, 37 Ex. von Margeriten [coll. EISINGER].

Aspidapion aeneum (F., 1775): **Sd+**: Saarbrücken, Trarbacher Platz, EISINGER, 25.V.1998, 10 Ex. von *Althaea rosea* [coll. EISINGER].

Squamapion vicinum (KIRBY, 1808): **Sd+**: Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i. l. 1999].

Protapion varipes (GERM., 1817): **Ba+** [REIBNITZ 1990, MAUS 1991].

Protapion difforme (GERM., 1818): **Ba-** [REIBNITZ 1990].

Mesotrichapion punctirostre (GYLL., 1839): **Wt?**: Fund vor 1950 nach REIBNITZ (1990), KÖSTLIN (1973) nennt einen sehr fraglichen Fund aus Würtemberg [REIBNITZ 1990].

Cyanapion columbinum (GERM., 1817): **Hn+(-)**: Diekholzen, Bahnbrücke der ICE-Trasse, SPRICK, 19.VI.1998, 1 Ex. Kissenbrück, Ösel, L. SCHMIDT, 3.VII.1998, 1 Ex. (t. SPRICK) [L. SCHMIDT i. l. 1999].

Oxystoma dimidiatum (DESBR., 1897): **Hs+** [FLECHTNER et al. 1995].
Oxystoma pomonae (F., 1798): **Sd+**: Saarbrücken, Trarbacher Platz, EISINGER, 29.VI.1998, 1 Ex. von Staude [coll. EISINGER].
Eutrichapion melancholicum (WENCK., 1864): **Wt+(.)** [MEYER 1966].

Familie CURCULIONIDAE

Otiorynchus armadillo (Rossi, 1792): **SH+(i)**: seit dem Erstnachweis mehrfach gefunden worden [ZIEGLER i. l. 1999].

Otiorynchus arcticus (O.F., 1780): **By-** [BRANDSTETTER & KAPP 1998].

Otiorynchus corruptor (HOST, 1789): **Bai(+)** [MAUS 1998b]. **Hni** [MAUS 1998b].

Otiorynchus crataegi GERM., 1824: **Ba+** [MAUS 1998b].

Otiorynchus cribicollis GYL., 1834: **Bai** [MAUS 1998b]. **Hsi** [MAUS 1998b].

Otiorynchus meridionalis GYL., 1834: **Bai** [MAUS 1998b].

Simo variegatus (BOH., 1843): **Ba+**: Sechs Fundorte in Südbaden, MAUS & NEUMANN, 9 Ex. meist an wärmeren Stellen [MAUS & NEUMANN i. l. 1999].

Phyllobius cinerascens (F., 1792): **Th+(+)**: Bleicherode, JUNG, 1975, 2 Ex. [JUNG i. l. 1999].

Omitas seminulum (F., 1792): **Ba?(-)**: nach HORIZON (1951), Quelle?, ohne sicheren Beleg fraglich [MAUS i. l. 1998].

Trachyphloeus rectus THOMS., 1865: **SH+**: Sylt, Morsum, TOLASCH, 15.VI.1998 [ZIEGLER i. l. 1999]. **Wt+** [HARDE & KÖSTLIN 1962].

Polydrusus pilosus GREDL., 1866: **Ne+**: Thörenwald bei Sittensen, HERRMANN, 30.III.1998 [ZIEGLER i. l. 1999].

Brachysomus setiger (GYL., 1840): **Hn+**: Kissenbrück, Ösel, L. SCHMIDT, V.98, mehrfach (t. SPRICK) in Bodenfallen [coll. L. SCHMIDT].

Foucartia ptochoides (BACH, 1856): **Ba?(-)**: nach HORIZON (1951), Beleg in coll. WOLF gehören zu *Foucartia squamulata* (MAUS det.) [MAUS i. l. 1998].

Strophosoma faber (HBST., 1785): **Sd+**: Altforweiler, Häsfeld, EISINGER, 14.IX.1997, 1 Ex. [coll. EISINGER].

Sitona languidus GYL., 1834: **Ne+**: Uelzen, Hambrock, RENNER, 19.IX.1961 [ZIEGLER i. l. 1999].

Sitona lineellus (BONS., 1785): **SH?(-)**: Sylt, Morsum, TOLASCH, 30.VI.1997 [ZIEGLER i. l. 1999].

Sitona waterhousei WALT., 1846: **Wt-** [HARDE & KÖSTLIN 1962].

Lixus paraplecticus (L., 1758): **Ba-** [HARTMANN 1907, 1926].

Lixus iridis OL., 1807: **Hs?(-)**: Lorch, HÖHNER, 16.VI.1997, 1 Ex. an Umbellifere [HÖHNER i. l. 1998].

Lixus cylindrus (F., 1781): **Ba-** [HARTMANN 1907].

Lixus myagri OL., 1807: **SH?(-)**: Sterleyer Heide, ZIEGLER, 11.VI.1998 [ZIEGLER i. l. 1999]. **St+(-)**: Weferlingen, Salzstelle, BÜCHE 8.VI.1996, 1 Ex. an *Barbara vulgaris* - Rogätz, Kieswerk, BÜCHE, 13.VI.1998, 3 Ex. unter *Rorippa anceps* (und Larven in Wurzeln) - Stendal-Schönhausen, Elbeufer, SPRICK, 4.VI.1992, 1 Ex. im Ufersand an *Rorippa silvestris* (BÜCHE i. l. 1999, L. SCHMIDT i. l. 1999).

Lixus rubicundus ZOUBK., 1833: **Ne+**: Lübbow, ZIEGLER, 12.VIII.1998 [ZIEGLER i. l. 1999].

Lixus bardanae (F., 1787): **Wt-** [HARDE & KÖSTLIN 1962].

Lixus filiformis (F., 1781): **Hn+(:)**: Langelsheim, Kahnstein, SPRICK & E. PALM, 21.VI.1998, mehrfach [coll. SPRICK, L. SCHMIDT i. l. 1999].

Larinus turbinatus GYL., 1836: **SH+**: Göttin, SUIKAT, 17.VI.1998 [ZIEGLER i. l. 1999].

Conio cleonus nebulosus (L., 1758): **Ba-** [HARTMANN 1907].

Chromoderus affinis (SCHRK., 1781): **Wt+** [HARDE & KÖSTLIN 1962].

Mecaspis alternans (HBST., 1795): **Hs+**: Hanau, L. NEUMANN, ca. 1910, 2 Ex. - Schläuchtern, BORNHOLDT, 13.V.1987, 1 Ex. (coll. HÖHNER) [HÖHNER i. l. 1998].

Cyphocleonus dealbatis (GMEL., 1790): **Ne+**: Lübbow, PALM, 5.VI.1998 [ZIEGLER i. l. 1999].

Adosomus roridus (PALL., 1781): **Ba?** fraglich [HORIZON 1951].

Euophryum confine (BROUN, 1881): **SH+**: Kiel, KOLLIGS, 18.VIII.1996, Lichtfang [ZIEGLER i. l. 1999].

Brachytemnus porcatus (GERM., 1824): **Ba+**: Karlsruhe, Hardtwald, NEUMANN, 26.VIII.1988, zahlreich (t. MAUS) Hartheim, Rheintrockenäue, BAYER, 12.V.1997 (t. WINKELMANN) Rheinmünster-Stollhofen, verschiedene Finder, 1994, mehrfach und LANGE, 19.V.1997 [NEUMANN i. l. 1999, REINBITZ i. l. 1999].

Hexarthrum capitulum (WOLL., 1858): **SH+**: Hamburg-Dammtor, BURGARTH, 9.VI.1995 [ZIEGLER i. l. 1999].

Bagois argillaceus GYL., 1836: **Ba-** [HARTMANN 1907].

Bagois subcarinatus GYL., 1836: **Wt-** [HARDE & KÖSTLIN 1962].

Bagois longitarsis THOMS., 1868: **Ba+** [GLADITSCH 1978].

Bagois glabrirostris (HBST., 1795): **Ba-** [HARTMANN 1907].

Hydronomus alismatis (MARSH., 1802): **Ba-** [HARTMANN 1907].

Tanysphyrus ater BLATCH., 1928: **Hs-** [DIECKMANN 1959].

Dorytomus affinis (PAYK., 1800): **WE+(-)**: Spiekeroog, MAUS, 22.VII.1987, 2 Ex. [MAUS in Vorber.].

Dorytomus salicis WALT., 1851: **Ba+**: Hotzenwald, Spielmannswies, MERTENS & NEUMANN, Datum?, 10 Ex. an *Salix aurita* [MERTENS i. l. 1999].

Dorytomus nebulosus (GYL., 1836): **MV+**: Gothmann, ZIEGLER, 18.VIII.1994 [ZIEGLER i. l. 1999].

Dorytomus salicinus (GYL., 1827): **Ba+**: Weinstetten, Rheintrockenäue, MAUS, 23.IV.1994, [NEUMANN i. l. 1999].

Dorytomus majalis (PAYK., 1792): **Ba-**: Istein, Rheinaue, HARTMANN [NEUMANN i. l. 1999].

Dorytomus puberulus (BOH., 1843): **Ba+**: Hartheim, Rheinaue, MAUS, 28.II.1994, 2 Ex. fliegend, C. BAYER, 12.V.1987, mehrere Ex. an Silberpappeln (1 Ex. coll. BÜCHE) - Grissemheim, Rheintrockenäue, NEUMANN, 1.III.1999, 2 Ex. (t. MAUS) [MAUS & MAUSER in Vorber., BÜCHE i. l. 1999].

Dorytomus dorsalis (L., 1758): **Ba+** [HORIZON 1955b].

Thryogenes festucae (HBST., 1795): **Ba+** [HORIZON 1955b, GLADITSCH 1978].

Compsinus setiger (BECK, 1817): **Sd+**: Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i. l. 1999].

Smicronyx reichii (GYL., 1836): **Ba+**: Grissemheim, Rheintrockenäue, NEUMANN, 5.VI.1993, 1 Ex. (MAUS det., t. BEHNE), 22.VI.1995 und VI.96, je 1 Ex. (t. MAUS) [NEUMANN i. l. 1999].

Smicronyx nebulosus TOURN., 1874: **Ba+**: Kleinkems, Rheintrockenäue, BÜCHE, 3.XI.1997, 1 Ex. (WINKELMANN det.) auf einem Trockenrasen gesichtet [BÜCHE i. l. 1999].

Smicronyx jungermanniae (REICH, 1797): **Wt+** [HARDE & KÖSTLIN 1962].

Tychius schneideri (HBST., 1795): **Hn+**: Bad Sachsa, Neuhof, L. SCHMIDT, 19.VI.1998, mehrfach (PALM & SPRICK det.) in einem Steinbruch [coll. L. SCHMIDT].

Tychius squamulatus GYL., 1836: **Hn+**: Bad Sachsa, Neuhof, E. PALM, 19.VI.1998, 1 Ex. in einem Steinbruch [coll. E. PALM, L. SCHMIDT i. l. 1999].

Tychius aureolus KIESW., 1851: **Hn+**: Bad Sachsa, Neuhof, L. SCHMIDT, 19.VI.1998, mehrfach (SPRICK det.) in einem Steinbruch [coll. L. SCHMIDT]. **Sn+**: Leipzig, Lößnig-Döllitz, Ruine Imkerei, SPRICK, 7.VII.1995, mehrfach von *Medicago sativa*, auf durchlässigen Schlackeboden [coll. SPRICK, L. SCHMIDT i. l. 1999].

Tychius crassirostris KIRSCH, 1871: **Hn+**: Bad Sachsa, Neuhof, L. SCHMIDT, 19.VI.1998, mehrfach (PALM & SPRICK det.) in einem Steinbruch [coll. L. SCHMIDT].

Tychius stephenii SCHÖNH., 1836: **Hn+(-)**: Bad Sachsa, Neuhof, L. SCHMIDT, 19.VI.1998, mehrfach (PALM & SPRICK det.) in einem Steinbruch [coll. L. SCHMIDT].

Tychius meliloti STEPH., 1831: **Sd+**: Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i. l. 1999].

Sibinia sodalis GERM., 1824: **Hn+**: Goslar-Steinfeld, Oker, L. SCHMIDT, 02.VI.1998, 1 Ex. am Okerufer - Langelsheim, Kahnstein, L. SCHMIDT, 21.VI.1998, 2 Ex. [coll. L. SCHMIDT].

Sibinia phalerata (GYL., 1836): **Hn+**: Salzgitter-Gitter, Segelflughafen Schäferstuhl, L. SCHMIDT, 18.V.1998, 1 Ex. (SPRICK det.) [coll. L. SCHMIDT]. **Sd+**: Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i. l. 1999]. **Wt-** [HARDE & KÖSTLIN 1962].

- Sibinia pellucens* (SCOP., 1772): **Sd+** [KÖHLER 1998g].
Sibinia subelliptica (DESBR., 1873): **MV+(:)**: Klein Schmölen, Dömitz, ZIEGLER, 20.VI.1994 [ZIEGLER i. l. 1999].
Anthonomus piri KOLLAR, 1837: **Wt+** [HARDE & KÖSTLIN 1962].
Anthonomus spilotus REDT., 1849: **Wt-** [HARDE & KÖSTLIN 1962].
Curculio elephas (GYLL., 1836): **Pf(+)**: Falschmeldung [Ch. NEUMANN mdl. Mitt. 1998].
Pissodes validirostris (SAHLB., 1834): **MV+:** Klein Schmölen, Dömitz, ZIEGLER, 20.VI.1994 [ZIEGLER i. l. 1999].
Pissodes harcyniae (HBST., 1795): **Ba+(:)**: Nord-Schwarzwald, Bannewälder Wilder See und Hoher Ochsenkopf, BENSE, 1995, an und in Fichtenwäldern Hartheim, Rheintrockenau, MATERN, 1.V.1995, 1 Ex. (KÖHLER det.) [BENSE & GEIS 1998, NEUMANN i. l. 1999].
Magdalitis nitidipennis (BOH., 1843): **Wt-** [HARDE & KÖSTLIN 1962].
Magdalitis fuscicornis DESBR., 1870: **Ba+:** Grissheim, Rheintrockenau, MAUS, 23.VI.1991 (t. BEHNE) [MAUS & MAUSER in Vorb.). **Wt+** [HARDE & KÖSTLIN 1962].
Magdalitis punctulata (MULS. REY, 1859): **Wt+** [HARDE & KÖSTLIN 1962].
Lepyrus capucinus (SCHALL., 1783): **Ne+(:)**: Pevestorf, Elbe, MEYBOHM, 22.V.1998 [ZIEGLER i. l. 1999].
Hylobius transversovittatus (GOEZE, 1777): **Hn+(:)**: Nienburg, Prinzenwerder, HAHLOHBM, 20.IX.1998, mehrfach [coll. HAHLOHBM, L. SCHMIDT i. l. 1999].
Leiosoma kirschi GREDL., 1866: **Wt/**: Eberdingen, SZALLIES, 11.V.1997, 1 Ex. (SZALLIES 1998) ist Fehlbestimmung [NEUMANN mdl. Mitt. 1999].
Donus palumbarius (GERM., 1821): **Hs+:** [FLECHTNER et al. 1993]. **Wt-(:)** [HARDE & KÖSTLIN 1962].
Donus tessellatus (HBST., 1795): **Hn+(:)**: Hildesheim, Osterberg, L. SCHMIDT, 19.VII.1998, 1 Ex. (t. SPRICK) [coll. L. SCHMIDT].
Donus tessellatus (HBST., 1795): **Hs+:** Frankfurt-Höchst, BÜCKING, 4.III.1906, 2 Ex. (coll. HÖHNER) [HÖHNER i. l. 1998].
Donus tessellatus (HBST., 1795): **MV+:** Gütze, ZIEGLER, 12.III.1999 [ZIEGLER i. l. 1999].
Donus tessellatus (HBST., 1795): **Wt+** [HARDE & KÖSTLIN 1962].
Hypera kunzii GERM., 1822: **Ba-(:)**: Kaiserstuhlgebiet, WOLF leg. (HORION 1951) ist Fehlbestimmung (t. MAUS) [MAUS i. l. 1998].
Hypera pastinacae (ROSSI, 1790): **Hs+:** Lorch, HÖHNER, 13.VII.1996, 1 Ex. an *Anthonomus tinctioria* [HÖHNER i. l. 1998].
Hypera pastinacae (ROSSI, 1790): **Wt-** [MALZACHER 1990].
Hypera venusta (F., 1781): **Hn+:** Bad Sachsa-Neuhof, NSG Sachsenstein, MELBER, 28.VIII.1997, 1 Ex. (t. SPRICK) [coll. L. SCHMIDT].
Coniatus wenckeri CAP., 1868: **Ba-(:)**: Kleinkems, HARTMANN, 12.V.1894, 10 Ex. (coll. Mus. Dresden) [HARTMANN 1907, MAUS & MAUSER in Vorb.].
Gasterocercus depressirostris (F., 1792): **Hs+(:)** [REIBNITZ 1986a].
Acalles lemnii (GERM., 1824): **Sd+** [KÖHLER 1998g].
Baris morio (BOH., 1844): **Hs+(:)**: Lorch, HÖHNER, 13.VII.1996, 1 Ex. an Reseda luteola [HÖHNER i. l. 1998].
Baris picicornis (MARSH., 1802): **Sd+:** Burbach, Alsbachschaft, EISINGER, 21.VI.1992, 1 Ex. von Reseda spec. [coll. EISINGER].
Baris chlorizans GERM., 1824: **Sd+:** Auersmacher, Saaraue, EISINGER, 19.V.1997, 1 Ex. am Saarauer [coll. EISINGER].
Coryssomerus capucinus (BECK, 1817): **Ne+(:)**: Schreyahn, HENGIMTH, 23.V.1998 [ZIEGLER i. l. 1999]. **Sd+ [KÖHLER 1998g].**
Pelenomus velaris (GYLL., 1827): **Hs+:** Langenselbold, HÖHNER, 7.VII.1973, 1 Ex. an einem Tümpel [HÖHNER i. l. 1998].
Pelenomus quadricorniger (COLONN., 1986): **Ba-:** [HORION 1955b].
Neophytobius granatus (GYLL., 1836): **Wt+(-)** [HARDE & KÖSTLIN 1962].
Neophytobius quadrinodosus (GYLL., 1813): **Ba-:** [HARTMANN 1907].
Rhinoncus inconspectus (HBST., 1795): **Sd+:** Saarbrücken, Nauwies, EISINGER, 16.VI.1996, 1 Ex. von Seggen gekeschert [coll. EISINGER].
Drupenatus nasturtii (GERM., 1824): **Hn+:** Harste, WILLERS, 5.VII.1998, 1 Ex. (t. BEHNE) in einem Bach an Brunnenkresse [coll. WILLERS, L. SCHMIDT i. l. 1999].
Poophlagus hopffgarteni TOURN., 1874: **St+(-):** Wörslitz/Elbe, LAU LSA, 1998, 1 Ex. (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i. l. 1999].
- Caeliodes nigritarsis* HARTM., 1895: **Hn+:** Rodewald, HAHLOHBM, 22.IV.1984, 1 Ex. (MEYBOHM det.) [coll. HAHLOHBM, L. SCHMIDT i. l. 1999].
Ceutorhynchus erysimi (F., 1787): **Sd+** [KÖHLER 1998g].
Ceutorhynchus ignitus GERM., 1824: **Sd+:** Saarbrücken, Trarbacher Platz, EISINGER, 29.VI.1998, 2 Ex. von Steinkraut [coll. EISINGER].
Ceutorhynchus aeneicollis GERM., 1824: **Ba-:** [HORION 1955b].
Ceutorhynchus puncticollis BOH., 1845: **Sd+:** Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i. l. 1999].
Ceutorhynchus quereti (GYLL., 1813): **Ba-:** [HARTMANN 1907].
Ceutorhynchus puncticollis (GYLL., 1827): **Hs+:** Viernheimer Heide, HÖHNER, 26.VI.1995 und 31.V.1997, 3 Ex. [HÖHNER i. l. 1998].
Ceutorhynchus pyrrhorhynchus (MARSH., 1802): **Ba+:** Karlsruhe-Rintheim, BÜCHE, 6.VI.1993, 1 Ex. [BÜCHE i. l. 1999]. **Sd+:** Saarbrücken, Trarbacher Platz, EISINGER, 28.VI.1998, 1 Ex. von Steinkraut [coll. EISINGER].
Neoglocianus maculaalba (HBST., 1795): **Wt+(-)** [HARDE & KÖSTLIN 1962].
Datonychus urticae (BOH., 1845): **Wt+** [HARDE & KÖSTLIN 1962].
Mogulones abbreviatulus (F., 1792): **SH+(-):** Boberg, SUIKAT, 19.V.1998 [ZIEGLER i. l. 1999].
Mogulones raphani (F., 1792): **Sd+:** St. Ingbert, Forst Lindscheid, EISINGER, 6.VI.1982, 1 Ex. (KÖHLER det.) [coll. EISINGER].
Mogulones geographicus (GOEZE, 1777): **Sd+:** Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i. l. 1999].
Sirocalodes quericola (PAYK., 1792): **Ba-:** [HARTMANN 1907].
Trichosirocalus barnevillei (GRÉN., 1866): **Wt+** [MEYER 1966].
Stenocarus cardui (HBST., 1784): **Ba-:** [HARTMANN 1924].
Mecinus collaris GERM., 1821: **Wt+** [HARDE & KÖSTLIN 1965].
Gymnetron rostellum (HBST., 1795): **Ne+:** Putensen, MEYBOHM, 10.I.1998 [ZIEGLER i. l. 1999].
Gymnetron asellus (GRAV., 1807): **Hn+:** Hannover-Herrenhausen, Universitätsgelände, L. SCHMIDT, 16.VII.1998, 1 Ex. (t. SPRICK) [coll. L. SCHMIDT].
Gymnetron hispidum BRULLÉ, 1832: **Wt+** [HARDE & KÖSTLIN 1962].
Gymnetron netum (GERM., 1821): **Hn+:** Braunlage, Warme Bode, L. SCHMIDT, 22.VII.1997, 1 Ex. (t. SPRICK) [coll. L. SCHMIDT].
Gymnetron bipustulatum (ROSSI, 1792): **Sd+:** Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i. l. 1999].
Miarus ajugae (HBST., 1795): **Sn+:** Zwota, Klingental, RENNER, 24.V.1998, 2 Ex. auf einer Waldwiese [RENNER i. l. 1999].
Cionus olivieri ROSENSCH., 1838: **Ba+:** [HARDE & KÖSTLIN 1962]. **Wt+(-)** [HARDE & KÖSTLIN 1962].
Cionus nigritarsis RTT., 1904: **Hs+:** Odenwald, VOGT, 21.VIII.1956 (coll. HÖHNER) [HÖHNER i. l. 1998].
Cleopus solani (F., 1792): **Hn+(:)**: Nienburg, Prinzenwerder, HAHLOHBM, 20.IX.1998, mehrfach [coll. HAHLOHBM, L. SCHMIDT i. l. 1999].
Pseudorchesites pratensis (GERM., 1821): **Wt?:** Tübingen, Spitzberg, MEYER, VII.1952, 1 Ex. (Bestimmung unsicher) [MEYER 1966, MAUS i. l. 1999].
Tachyerges pseudostigma (TEMP., 1982): **Ba+:** Grißheim, Rheinaue, NEUMANN, V.1993, 1 Ex. - Greffern, GLADITSCH, 18.VI.1994 [MAUS & MAUSER in Vorb.].

6. Literatur

- ASSING, V. (1998a): A Revision of the Palearctic Species of *Zoosetha* MULSANT & REY and *Poromniusa* GANGLBAUER (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae). Mitt. Mus. Nat.kd. Berlin, Dtsch. ent. Z. (Berlin) 45, 73-94.
- ASSING, V. (1998b): *Gyrophaena transversalis* STRAND im südlichen Niedersachsen (Staphylinidae). - Ent. Bl. (Krefeld) 94, 142.
- BAUM, F. (1989): Zur Käferfauna des Belchengebietes, in: Der Belchen. Geschichtlich-naturkundliche Monographie des schönsten Schwarzwaldberges. Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs 13. Karlsruhe, 965-1030.
- BEIER, W. (1998): Erstrachweis des Marienkäfers *Hippodamia undecimnotata* (SCHNEIDER, 1792) (Col., Coccinellidae) für das Land Brandenburg. - Ent. Nachr. Ber. (Dresden) 42, 242-243.

- BENSE, U. & K.-U. GEIS (1998): III. Holzkäfer, in: BÜCKING, W. (Hrsg.): Faunistische Untersuchungen in Bannwäldern. Mitt. Forstl. Vers.-Forsch.anst. Bad.-Württ. (Freiburg) 203, 45-117.
- BENSE, U. (1996b): *Pityogenes conjunctus* (R.T.) im Schwarzwald und in Oberschwaben (Col., Scolytidae). Kleine Mitteilung 177. Mitt. ent. Ver. Stuttgart 31, 111.
- BENSE, U. (1998): Ein Beitrag zur Holzkäferfauna von Nordwest-Sachsen. - Veröff. Naturkundemuseum Leipzig (Leipzig) 16, 56-84.
- BESUCHET, Cl. & A. SUNDT (1971): 21. Familie: Ptiliidae, in: FREUDE, H., K. W. HARDE & G. A. LOHSE (Hrsg.): Die Käfer Mittel-europas, Band 3. - Krefeld, 311-342.
- BETTAG, E., NIEHUIS, M., SCHIMMEL, R. & W. VOGT (1980): Bemer-kenswerte Käferfunde in der Pfalz und benachbarten Gebieten. 5. Beitrag zur Kenntnis der Käfer der Pfalz. - Pfälzer Heimat 31, 2-8.
- BISINGER, D. (1997): Die Käferfauna (Coleoptera) von Forst Lind-scheid bei St. Ingbert im Saarland. Decheniana-Beihefte (Bonn) 36, 141-184.
- BRANDSTETTER, C. & A. KAPP (1998): Ein Altfund von *Otiorhynchus arcticus* (F.) - neu für Deutschland (Curculionidae). - Ent. Bl. (Krefeld) 94, 114.
- BRECHTEL, F. & H. U. KOSTENBAUDER (im Druck): Die Pracht- und Hirschläuse Baden-Württembergs.
- BRITZ, R. & D. BERNHARD (1994): Ein Beitrag zur Holzkäferfauna des Landschaftsschutzgebietes Rammert bei Tübingen. - Veröff. Naturschutz u. Landespflege Bad.-Württ. 68/69, 339-353.
- BRITZ, R. (1990): Bemerkenswerte Käferfunde aus dem Kreis Tü-bingen. - Mitt. ent. Ver. Stuttgart (Stuttgart) 25, 66-72.
- BÜCHE, B. (1998): *Gastrallus knizeki* ZAHRADNIK 1996, eine für Deutschland neue Art (Coleoptera: Anobiidae). Mitt. ent. Ver. Stuttgart (Stuttgart) 33, 74-76.
- BÜCKING, H. (1930-1932): Die Käfer von Nassau und Frankfurt. Er-ster Nachtrag zur 2. Auflage des Hauptverzeichnisses von Lucas von HEYDEN. - Ent. Bl. (Berlin) 26, 145-163, 27, 39-42, 83-89, 122-128, 174-183, 28, 73-80, 122-125, 167-170.
- CUPPEN, J., VORST, O. & R. BELLSTEDT (1998): Five beetles new for Thuringia, and records of endangered water beetles (Coleoptera: Dy-tiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Staphylinidae). - Thür. Faun. Abh. (Gotha) 5, 169-178.
- DIECKMANN, L. (1959): Die mitteleuropäischen Arten der Gattung *Tanysphyrus* SCHÖNHERR. - Ent. Bl. (Krefeld) 55, 16-24.
- DOROW, W. H. O., G. FLECHTNER & J.-P. KOPELKE (im Druck): Na-turwaldreservate in Hessen No. 6/2. Schönbiache, Zoologische Un-tersuchungen. - Mitt. Hess. Landesforstverw.
- ERBER, D. (1983): Faunistik der hessischen Koleopteren. Elfter Bei-trag: Familie Chrysomelidae, I. Unterfamilie Clytrinae. - Mitt. Int. Ent. Ver. (Frankfurt) 7, 70-100.
- ERMISCH, K. (1967): Neue *Mordellistena*-Arten aus Mitteleuropa und der Balkanhalbinsel. - Ent. Bl. (Krefeld) 63, 110-119.
- ERPELDING, A. (1998): Faunistisch-ökologische Charakterisierung ausgewählter Auwald-Stillgewässer an der unteren Kinzig (Hessen), dargestellt am Beispiel der Wasserkäferfauna. Diplomarbeit.
- ESSER, J. (1998a): Interessante Käferfunde aus Deutschland (Col.). - Ent. Nachr. Ber. (Dresden) 42, 95-97.
- ESSER, J. (1998b): Neue Käferfunde aus Berlin (Col.). - Ent. Nachr. Ber. (Dresden) 42, 241-242.
- FLECHTNER, G. (1984): Der Eich-Gimbsheimer Altrhein. Limnische Lebensräume und Lebensgemeinschaften. Untersuchung im Rah-men der Biotop-Kartierung, 2. Stufe Intensivkartierung (1983/1984). - Gutachten Landesamt für Umweltschutz Rheinland-Pfalz (Oppenheim).
- FLECHTNER, G., W. DOROW & J.-P. KOPELKE (1995): Die Fauna des Naturwaldreservates „Niddahänge östlich Rudingshain“ (Hoher Vö-gelsberg), in: Stiftung hessischer Naturschutz (Hrsg.): Wieviel Ur-wald braucht unser Land, 11-26. - Wiesbaden.
- FLECHTNER, G., W. H. O. DOROW & J.-P. KOPELKE (1999): Natur-waldreservate in Hessen No. 5/2. Niddahänge östlich Rudingshain, Zoologische Untersuchungen. - Mitt. Hess. Landesforstverw. 32, im Druck.
- FRANCK, P. (1933): Zur Käferfauna des Meißner. - Entomol. Bl. 29, 150-155.
- GAUSS, R. (1963): Bemerkenswerte badische Käferfunde. Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N.F. 8, 439-443.
- GEIS, K.-U. & M. TRÖGER (1997): *Platydema dejani* CAST. (Col., Tenebrionidae) an der Mittelalpe. Ent. Nachr. Ber. (Dresden) 41, 182.
- GLABITSCH, S. (1978): Zur Käferfauna des Rußheimer Altrheinge-biets (Elisabethenwörth), in: Der Rußheimer Altrhein, eine nordba-dische Auenlandschaft. Natur- und Landschaftsschutzgebiete Ba-den-Württembergs 10. Karlsruhe, 451-522.
- HARDE, K. W. & R. KÖSTLIN (1962): Beiträge zur württem-bergischen Käferfauna II. Jh. vaterl. Ver. Naturkunde 117, 299-313.
- HARDE, K.W. & R. KÖSTLIN (1965): Beiträge zur württembergischen Käferfauna III. Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württemberg 120, 247-267.
- HARTMANN, F. (1907): Beiträge zu Badens Käferfauna. Mitt. Bad. zool. Ver. 18, 152-198.
- HARTMANN, F. (1911): Beiträge zu Badens Käferfauna II. - Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz 251-253, 1-16, 30-38.
- HARTMANN, F. (1924): Beiträge zu Badens Käferfauna III. Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N.F. 2, 41-56.
- HARTMANN, F. (1926): Beiträge zu Badens Käferfauna IV. Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N.F. 1, 274-284.
- HEBAUER, F. (1994): Katalog der bayerischen Wasserkäfer. Ber. ANL (Laufen/Salzach) 18, 47-59.
- HEBAUER, F. (1997): *Cercyon* (s. str.) *renneri* sp. n. - eine deutsche Art? (Coleoptera: Hydrophilidae). - Acta Coleopterologica (Mün-chen) 13, 73-74.
- HEMMANN, K. (1979): Käferfunde aus Südwest-Deutschland. Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N.F. 12, 107-108.
- HENZE, W. (1996): *Bidessus minutissimus* (GERM.) - Fund in Ober-schwaben (Col., Dytiscidae). Kleine Mitteilung 168. - Mitt. ent. Ver. Stuttgart (Stuttgart) 31, 104.
- HEYDEN, L. v. (1904): Die Käfer von Nassau und Frankfurt. Frank-furt/M.
- HILLESHEIM-KIMMEL, U., H. KARAFIAT, K. LEWEJOHANN & W. LOBIN (1978): Die Naturschutzgebiete in Hessen. 2. Aufl. - Schrif. Inst. Na-turschutz (Darmstadt) 11.
- HINTERSEHER, W. (1979): Faunistische Mitteilungen über einige in Deutschland seltene Käferarten, vorwiegend aus Hessen. - Ent. Bl. (Krefeld) 74, 180-181.
- HORION, A. (1951): Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutsch-land, Österreich, Tschechoslowakei) mit kurzen faunistischen Anga-ben, 2 Bde. - Kernen, Stuttgart.
- HORION, A. (1951b): Beiträge zur Kenntnis der Käfer-Fauna des Feldbergegebietes I. Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N.F. 5, 196-212.
- HORION, A. (1954): Beiträge zur Kenntnis der Käfer-Fauna des Feld-bergegebietes II. Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N.F. 6, 92-109.
- HORION, A. (1954b): Beitrag zur Käfer-Fauna des badischen Boden-segebiets. 1. Abteilung. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtL. 13, 51-61.
- HORION, A. (1955b): Beitrag zur Käfer-Fauna des badischen Boden-segebiets. 2. Abteilung. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtL. 14, 57-69.
- HORION, A. (1956): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. V: Heteromera. Tutzing.
- HORION, A. (1959): Bemerkungen zur Faunistik der württembergi-schen Käfer. I. Carabidae. Jh. Ver. vaterl. Naturk. Württemberg 114, 177-190.
- HORION, A. (1960): Bemerkungen zur Faunistik der württembergi-schen Käfer. II. Halphilidae bis Scaphidiidae
- HORION, A. (1960b): Koleopterologische Neumeldungen für Deutsch-land. 4. Reihe. - Mitt. Münch. Ent. Ges. 50, 119-162. Jh. Ver. vaterl. Naturk. Württemberg 115, 316-329.
- HORION, A. (1961b): Bemerkungen zur Faunistik der württembergi-schen Käfer. III. Staphylinidae - 1. Teil. - Jh. Ver. vaterl. Nat.kd. Württemberg (Stuttgart) 116, 238-265.
- HORION, A. (1963): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. IX: Staphylinidae, 1. Teil Microptilinae bis Euaesthetinae. Überlin-gen/Bodensee.
- HORION, A. (1975): Nachtrag zur Faunistik der mitteleuropäischen Cerambyciden (Col.). - Nachr.bl. Bayer. Ent. (München) 24, 97-115.
- IPSEN, A. & T. TOLASCH (1997): *Choleva septentrionalis sokolowskii* n. ssp., eine neue cavernicole Unterart von *Choleva septentrionalis* Jeannel aus Mitteleuropa (Col., Cholevidae). Ent. Nachr. Ber. (Dresden) 41, 167-171.
- JUNG, M. (1998): Blattkäferfunde aus Sachsen-Anhalt und dem Harz (Col., Chrysomelidae). - Ent. Nachr. Ber. (Dresden) 42, 85-86.
- KAMP, H.J. (1978): Zur Insekten-Faunistik Südwestdeutschlands. Coleoptera: Scolytidae und Platypodidae (1. Nachtrag). Mitt. ent. Ver. Stuttgart 13, 1-8.
- KAMP, H. J. (1983): Bemerkenswerte Borkenkäferfunde aus Baden-Württemberg. Mitt. ent. Ver. Stuttgart 18, 53-58.
- KLESS, J. (1959): Bemerkenswerte Käferarten aus der Wutach-schlucht. Mitt.Bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N.F. 7, 357-362.

- KLESS, J. (1998): Käfer aus dem NSG Unterhölzer Wald auf der Baar. Ergebnisse der Exkursion 1992 der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen. - Mitt. ent. Ver. Stuttgart (Stuttgart) 33, 81-95.
- KNAPP, H. (1998): *Uloma culinaria* (L.) - Neu für Baden-Württemberg (Col., Tenebrionidae). - Mitt. ent. Ver. Stuttgart (Stuttgart) 33, 79-80.
- KOCH, K. (1990): Dritter Nachtrag zur Käferfauna der Rheinprovinz. Teil I: Carabidae Scaphidiidae. Decheniana (Bonn) 143, 307-339.
- KÖHLER, F. (1996a): Käferfauna in Naturwaldzellen und Wirtschaftswald. Vergleichsuntersuchungen im Waldreservat Kermeter in der Nordeifel. - Schriftenr. LÖBF/LAfAO NRW (Recklinghausen) 6, 1-283.
- KÖHLER, F. (1966g): Zur Käferfauna (Col.) des unteren Saartales und des westlichen Mosel-Saar-Raumes. Mitt. Arb.gem. Rhein. Koleopterologen (Bonn) 6, 217-246.
- KÖHLER, F. (1997d): Anmerkungen zur Käferfauna der Rheinprovinz XI. - Mitt. Arb.gem. Rhein. Koleopterologen (Bonn) 7, 29-51.
- KÖHLER, F. (1998e): Anmerkungen zur Käferfauna der Rheinprovinz XII. - Mitt. Arb.gem. Rhein. Koleopterologen (Bonn) 8, 35-51.
- KÖHLER, F. (1998f): Vergleichende Untersuchungen zur Totholzkäferfauna (Coleoptera) des Naturwaldreservates „Himbeerberg“ im Hunsrück. - Mainzer naturw. Archiv (Mainz) 36, im Druck.
- KÖHLER, F. (Rienwald): Bestandserhebungen zur Totholzkäferfauna in den Naturwaldreservaten „Stuttpferch“ (Forstamt Schaidt) und „Mörderhäufel“ (Forstamt Hagenbach) im Bienwald. - In Vorbereitung.
- KÖHLER, F. (Taben): Untersuchungen zur Käferfauna des Naturwaldreservates „Urwald von Taben“ und angrenzender Bereiche bei Taben-Rodt/Saar. - In Vorbereitung.
- KÖHLER, F. (Mummelskopf): Die Totholzkäferfauna (Col.) des Naturwaldreservates „Mummelskopf“ im südlichen Pfälzer Wald, in Vorber.
- KÖHLER, F. (Oberpfalz): Die Totholzkäferfauna (Col.) der oberpfälzer Naturwaldreservate „Gitschger“ und „Schwarzwirhberg“, in Vorber.
- KÖHLER, F. (Ochsenberg): Die Totholzkäferfauna (Coleoptera) der Naturwaldzelle Ochsenberg. Unpubl. Gutachten (LÖBF/LAfAO Recklinghausen), LÖBF-Schrr. im Druck.
- KÖHLER, F. (Stelzenbach): Die Totholzkäferfauna (Col.) des Naturwaldreservates Stelzenbach und eines angrenzenden Wirtschaftswaldes im Westerwald, in Vorber.
- KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (Hrsg.) (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. - Ent. Nachr. Ber. (Dresden) Beiheft 4, 1-185.
- KÖLLN, T. & P. HAASE (1997): Über einige seltene Wasserinsekten des Westharzes. - Göttinger naturkundl. Schr. (Göttingen) 4, 173-179.
- KÖSTLIN, R. (1957): Weitere bemerkenswerte Käferfunde in Württemberg. - Jh. vaterl. Ver. Naturkund. 112, 325-328.
- KÖSTLIN, R. (1958): Weitere bemerkenswerte Käferfunde in Württemberg. - Jh. Ver. vaterl. Naturkd. Württemberg 113, 324-327.
- KÖSTLIN, R. (1973): Beiträge zur Insekten-Faunistik Südwestdeutschlands. Die Gattung *Apion*. Mitt. Ent. Ver. Stuttgart (Stuttgart) 8 (Sonderheft 12), 1-198.
- KRELL, F. T. (1993): Die Lamellicornia der Käfersammlung PAUL DOLDERER, Heidenheim. - Mitt. Ent. Ver. Stuttgart (Stuttgart) 28, 34.
- KRELL, F. T. & H. FERY (1992): Familienreihe Lamellicornia, in: LOHSE, G. A. & W. LUCHT (Hrsg.): Die Käfer Mitteleuropas. Zweiter Supplementband mit Katalogteil (Band 13). - Krefeld, 200-252.
- LAUTERBORN, R. (1926): Faunistische Beobachtungen aus dem Gebiet des Oberrheins und des Bodensees. 6. Reihe. Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N.F. 2, 3-12.
- LUCHT, W. (1981b): Coleoptera Westfalica: Familia Trogositidae. - Abh. Landesmus. Nat.kd. Münster (Münster) 43, 35-42.
- LUCHT, W. & KLAUSNITZER, B. (Hrsg.) (1998): Die Käfer Mitteleuropas. Vierter Supplementband (Bd. 15). - Jena.
- LILLIG, M. (1998): *Amara anthobia* A. & J. B. VILLA, 1833 - eine für das Saarland neue Laufkäferart (Coleoptera: Carabidae). - Delatinnia (Saarbrücken) 30, 578-579.
- LÜCKMANN, J. (1998): Bemerkenswerte Nachweise von zwei Schwarzkäferarten im NSG Mahlpfuhler Fenn (Col., Tenebrionidae). - Ent. Nachr. Ber. (Dresden) 42, 239-240.
- MALZACHER, P. (1990): Zur Käferfauna gehölzdominierter Strukturlemente der Gemarkungen Ludwigsburg, Kornwestheim und Kornthal-Münchingen. - Mitt. ent. Ver. Stuttgart 25, 122-141.
- MARTEN, M. (1983): Die Ephemopteren, Plecopteren, Heteropteren und Coleopteren der Fulda. Diplomarbeit, Berlin.
- MAUS, Ch. & J. Mauser (in Vorber.): Die phytophagen Käfer (Coleoptera: Chrysomelidae, Curculionidae s.l.) der Trockenaugebiete am südbadischen Oberrhein.
- MAUS, Ch. (1983): Beiträge zur Käferfauna Spiekerroogs/I. Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N.F. 13, 245-254.
- MAUS, Ch. (1986): Beiträge zur Käferfauna Spiekerroogs/II. Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N.F. 14, 127-145.
- MAUS, Ch. (1987): Zweiter Beitrag zur Käferfauna Südwestdeutschlands. - Mitt. ent. Ver. Stuttgart 22, 5-28.
- MAUS, Ch. (1988): Beiträge zur Käferfauna Spiekerroogs/III. - Mitt. bad. Landesver. Naturk. Natursch. (Freiburg) 14, 661-680.
- MAUS, Ch. (1991): Die Apioniden (Coleoptera) der Sammlungen des Museums für Naturkunde in Freiburg. - Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N.F. 15, 439-445.
- MAUS, Ch. (1996): Taxonomische und phylogenetisch-systematische Untersuchungen zur Untergattung *Aleochara* MULSANT & REY, 1874 der Gattung *Aleochara* GRAVENHORST, 1802 (Coleoptera, Staphylinidae). Diplomarbeit, Universität Freiburg.
- MAUS, Ch. (1998a): Taxonomical contributions to the subgenus *Aleochara* MULSANT & REY, 1874 of the genus *Aleochara* GRAVENHORST, 1802 (Coleoptera: Staphylinidae). - Kol. Rundschau (Wien) 68, 81-100.
- MAUS, Ch. (1998b): Bemerkenswerte *Otiorhynchus*-Funde aus Südwestdeutschland. Mitt. ent. Ver. Stuttgart 33, 60-64.
- MAUS, Ch. (in Vorber.): Beiträge zur Käferfauna Spiekerroogs IV.
- MEYER, K. H. (1966): Die Käfer des Spitzbergs. In: Der Spitzberg bei Tübingen. - Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs. Landesstelle für Naturschutz und Landschaftspflege, Ludwigsburg, 855-930.
- MOLENDA, R. (1996): Zoogeographische Bedeutung Kaltluft erzeugender Blockhalden im außeralpinen Mitteleuropa: Untersuchungen an Arthropoda, insbesondere Coleoptera. Verh. naturwiss. Ver. Hamburg, N.F. 35, 5-93.
- MÜLLER, A. & K. REISSENMANN (1998): *Hypocaccus rugiceps* (DUFT, 1805) - Wiederfund für die Rheinprovinz mit allgemeinen Anmerkungen zur Gattung *Hypocaccus* (Thoms.) (Col., Histeridae). - Mitt. Arb.gem. Rhein. Koleopterologen (Bonn) 8, 121-123.
- NEUMANN, Ch. & B. BÜCHE (1998): *Dorcatoma minor* ZAHRADNIK 1993 (Coleoptera: Anobiidae). Anmerkungen zur Bestimmung, Verbreitung und Biologie auch der verwandten Arten. Mitt. ent. Ver. Stuttgart (Stuttgart) 33, 67-71.
- NIEHUIS, M. (1997): Der Prachtkäfer *Agrilus ribesii* SCHAEFER, 1946 (Coleoptera: Buprestidae) neu in der Rheinprovinz und in Rheinland-Pfalz. - Mitt. Arb.gem. Rhein. Koleopterologen (Bonn) 7, 67-71.
- NIEHUIS, M. & U. BRENNER (1998): *Anthaxia millefolii polychloros* AB. - Wiederfund am Mittelrhein. - Mitt. Arb.gem. Rhein. Koleopterologen (Bonn) 8, 101-107.
- NOLTE, O. (1995): *Cardiophorus asellus* ER. und *Dicronychus equisetoides* LOHSE, zwei interessante Elateriden in Südhessen (Col., Elateridae). Kleine Mitteilung 165. - Mitt. ent. Ver. Stuttgart 30, 24.
- NOLTE, O., G. GEGINTAS & H. WEIHRÄUCHT (1997): Erfassung xylobionter Käfer (Coleoptera) des Lampertheimer Waldes (Südhessen), ein Zwischenbericht. - Hess. faun. Briefe (Darmstadt) 16, 33-48.
- NOWOTNY, H. (1951): Beobachtungen über die Insektenwelt des Naturdenkmals Stutensee. - Carolinae 10, 46-56.
- OSTEN, T. (1992): *Velleius dilatatus* F. (Col., Staphylinidae) zu Gast im Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart. Kleine Mitt. 130. - Mitt. ent. Ver. Stuttgart (Stuttgart) 27, 6.
- PATTRI, H. O. E. (1936): Sind Hymenopteren und Orthopteren an bestimmte geologische Formationen gebunden? - Ber. oberhess. Ges. Natur- u. Heilkunde N.F. 17, 109-113.
- PAULUS, H. F. (1973): Daten zur Cerambycidenfauna der näheren und weiteren Umgebung von Mainz (Insecta, Coleoptera). - Entomologische Zeitschrift (Frankfurt) 83, 233-247.
- PERSONH, M. & P. BÜNGENER (1998b): Neue und wiederentdeckte Käfer in der Pfalz (Insecta: Coleoptera). 2. Teil. - Pfälzer Heimat 40, 130-136.
- PESCHKE, K. & D. FULDNER (1977): Übersicht und neue Untersuchungen zur Lebensweise der parasitoiden Aleochariden. Zool. Jahrb. Syst. 104, 242-262.
- PÜTZ, A. & P. SPRICK (1996): Zwei neue Nachweise von *Curimopsis monticola* (FRANZ, 1967) und *Curimopsis paleata* (ERICHSON, 1846) aus Sachsen-Anhalt (Col., Byrrhidae: Syncalyptinae). - Ent. Nachr. Ber. (Dresden) 40, 256-258.
- PÜTZ, A. (1984b): *Cryptopleurum subtile* (SHARP) in der Umgebung von Eisenhüttenstadt (Col., Hydrophilidae). - Ent. Nachr. Ber. (Dresden) 28, 225.

- PÜTZ, A. (1989a): *Euplectus bonvouloiri narentinus* REITTER, 1881, neu für die Fauna der DDR (Coleoptera, Pselaphidae). - Ent. Nachr. Ber. (Dresden) 33, 93-94.
- PÜTZ, A. (1998): 47. Familie: Byrrhidae, in: LUCHT, W. & B. KLAUSNITZER (Hrsg.): Die Käfer Mitteleuropas. Vierter Supplementband (Bd. 15). - Jena.
- RÄHLE, W. (1972): Ein Nachtrag zur Käferfauna des Spitzbergs bei Tübingen. - Veröff. Landesanst. Natursch. Landschaftspflege (Ludwigsburg) 40, 129-138.
- REIBNITZ, J. (1986a): *Gasterocercus depressirostris* F. (Curculionidae). Kleine Mitteilung 77. - Mitt. ent. Ver. Stuttgart 21, 47.
- REIBNITZ, J. (1986b): *Triplax lepida* Falz. (Erotylidae). Kleine Mitteilung 76. - Mitt. ent. Ver. Stuttgart 21, 46-47.
- REIBNITZ, J. (1990): Verzeichnis der Käfer von Baden-Württemberg (2): Curculionidae I, Apioninae. Mitt. ent. Ver. Stuttgart 25, 111-116.
- REIBNITZ, J. (1992): Verzeichnis der Käfer von Baden-Württemberg (3): Melandryidae und Tetratomidae. Mitt. ent. Ver. Stuttgart 27, 13-25.
- REIBNITZ, J. (1996): *Abdera quadrifasciata* (Curt.) Fund in Luxemburg, Bayern und Hessen (Col., Melandryidae). Kleine Mitteilung 175. - Mitt. ent. Ver. Stuttgart 31, 110.
- REIBNITZ, J. (1998): *Xylographus bostrychoides* (Duf.) Neu für Deutschland (Col., Cisidae). Mitt. ent. Ver. Stuttgart (Stuttgart) 33, 131.
- RENNER, K. (1998): Ein *Clambus* von der Südhälfkugel als neue Adventivart in Deutschland (Coleoptera, Clambidae). - Mitt. Arb. gem. Rhein. Koleopterologen (Bonn) 8, 124.
- RÖSSNER, E. (1995): Verbreitung der Gattung *Omaloplia* SCHÖNHERR, 1817 in der Bundesrepublik Deutschland (Col., Melolonthidae, Sericinae). - Ent. Nachr. Ber. (Dresden) 39, 213-217.
- ROPPEL, J. (1990): Einige bemerkenswerte Käfer aus dem Schwarzwald (Wutachtal, Unterhölzer Wald). - Mitt. ent. Ver. Stuttgart 25, 19-23.
- ROPPEL, J. (1998): *Parmena balteatus* L. (Col., Cerambycidae) Erstfund für Deutschland in Freiburg i. Br. - Mitt. ent. Ver. Stuttgart (Stuttgart) 33, 59.
- SCHAFFRATH, U. (1994): Beitrag zur Kenntnis der Blattrhorn- und Hirschläuse (Col.): Trogidae, Geotrupidae, Scarabaeidae, Lucanidae in Nordhessen. - Philippia 7, 1-60.
- SCHILLER, W. (1979a): Neue Käferfunde aus Südbaden. - Mitt. Ent. Ges. Basel (Basel) N.F. 29, 68-75.
- SCHILLER, W. (1979b): Die Käferfauna von Grenzach-Wyhlen. In: Der Buchwald bei Grenzach (Grenzacher Horn). Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs 9, 361-387.
- SCHILLER, W. (1989): Die Staphylinidae (Kurzflügler) des Belchengebietes im Südschwarzwald, in: Der Belchen - Geschichtlich-naturkundliche Monographie des schönsten Schwarzwaldberges. Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs 13. Karlsruhe.
- SCHMID, G. (1965): Bemerkenswerte Käfer und Wanzen aus Baden-Württemberg. - Veröff. Landesstelle Naturschutz u. Landsch.pflege Bad.-Württ. 33, 248-256.
- SCHÜLKÉ, M. (1998a): Zur Identität einiger westpaläarktischer Arten der Gattung *Thinobius* KIESENWETTER, 1844 (Col., Staphylinidae, Oxytelinae). - Ent. Nachr. Ber. (Dresden) 42, 127-138.
- SCHÜLKÉ, M. (1998b): *Medon rufiventris* (NORDMANN) in Sachsen-Anhalt (Staph.). - Ent. Bl. (Jena) 94, 98.
- SCHÜLKÉ, M. (1998c): Zwei Neufunde für Sachsen-Anhalt (Staphylinidae). - Ent. Bl. (Krefeld) 94, 126.
- SCHULE, P. & M. PERSOHN (1997): Anmerkungen zum Vorkommen und zur Verbreitung einiger Laufkäferarten (Coleoptera, Carabidae) in Rheinland-Pfalz und dem nördlichen Rheinland, Teil I. Mitt. Arb. gem. Rhein. Koleopterologen (Bonn) 7, 13-25.
- STIPPICH, G. & S. KROOSS (1998): Auswirkungen von Extensivierungsmaßnahmen auf Spinnen, Laufkäfer und Kurzflügler, in: GEROWITT, B. & M. WILDENHEYN (Hrsg.): Ökologische und ökonomische Auswirkungen von Extensivierungsmaßnahmen im Ackerbau. - Göttingen.
- SZALLIES, A. (1998): Bemerkenswerte Käfer aus Baden-Württemberg (2). - Mitt. ent. Ver. Stuttgart (Stuttgart) 33, 47-52.
- UHLIG, M. & F. C. F. STERRENBURG (1990): Die Gattung *Erichsonius* FAUVEL (Coleoptera, Staphylinidae) in den Niederlanden. - Ent. Bl. (Krefeld) 86, 166-174.
- WEBER, L. (1903): Verzeichnis der bei Cassel in einem Umkreis von ungefähr 25 Kilometer aufgefundenen Coleopteren. - Abhandlungen und Bericht XLVIII. des Vereins für Naturkunde zu Kassel über das Vereinsjahr 1902-1903 (Kassel), 97-212.
- WEIGEL, A. (1997): *Scintillatrix dives* und *Litargus balteatus* - zwei neue Arten der Thüringer Käferfauna (Col., Buprestidae, Mycetophagidae). - Ent. Nachr. Ber. (Dresden) 41, 178.
- WINTER, K. (1991): Untersuchungen über die xylobionte Käferfauna in Niedersachsen. - NNA-Berichte (Schneverdingen) 4, 157-162.
- WÖLKERLING, H. (1998): Kleine Mitteilungen Nr. 2186: *Calosoma maderae* spp. *europunctatum* (HERBST) im östlichen Niedersachsen. - Ent. Bl. (Jena) 94, 99.
- WOLF, E. (1963): Beiträge zur Käferfauna der Freiburger Bucht und des Kaiserstuhls. - Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N.F. 8, 431-438.
- WURST, C. (1986): *Lytta vesicatoria* L. (Col., Meloidae). Kleine Mitteilung 80. - Mitt. ent. Ver. Stuttgart 21, 47-48.
- WURST, C. (1989): Bemerkenswerte Käferfunde in Baden-Württemberg. - Mitt. ent. Ver. Stuttgart 24, 58.
- WURST, C. (1990): *Globicornis fasciatus* FAIRM. (Col., Dermestidae). Kleine Mitteilung 123. - Mitt. ent. Ver. Stuttgart 25, 143.
- WURST, C. (1993): Ein gutes halbes Dutzend *Ampedus*-Erstmeldungen für Baden-Württemberg nebst einem Neufund für Vorarlberg (Coleoptera: Elateridae). - Mitt. ent. Ver. Stuttgart 28, 43-45.

Anschrift des Verfassers:

Frank Köhler
Strombergstraße 22a
D-53332 Bornheim
frank.koehler@online.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten und Berichte](#)

Jahr/Year: 2000/2001

Band/Volume: [44](#)

Autor(en)/Author(s): Köhler Frank

Artikel/Article: [Erster Nachtrag zum "Verzeichnis der Käfer Deutschlands". 60-84](#)