©Ges. zur Förderung d. Erforschung von Insektenwanderungen e.V. München, download unter www.biologiezentrum.at

Die Spanische Fliege, eine Art mit mediterranem Verbreitungsschwerpunkt (BOLOGNA 1991), weist bezüglich ihres Auftretens in Deutschland starke Schwankungen auf (HORION 1956, KOCH 1968). In Jahren mit Masseneinflügen dringt die Art in nördlicher Richtung bis nach Skandinavien vor und kann dann auch in Mitteleuropa durch Schadfraß an Fraxinus excelsior negativ auffallen (HORION 1956, BOLOGNA 1991).

Lytta vesicatoria ist in Deutschland relativ weit verbreitet, tritt aber im kontinentalen Osten sehr viel regelmäßiger und häufiger als im Westen des Gebietes auf (HORION 1956, KÖHLER & KLAUSNITZER 1998). HORION (1956) weist darauf hin, daß die Art im 19. Jahrhundert in manchen Gebieten deutlich häufiger aufgetreten ist als im 20. Jahrhundert. Eine systematische Zusammenstellung neuerer Funde existiert vor allem für Rheinland-Pfalz (SCHNEIDER 1984, REDER 1999), wo die Art insbesondere im Juni 1998 in größeren Mengen beobachtet wurde (REDER 1999). Eine umfassende Zusammenstellung thüringischer Nachweise gibt RAPP (1934), der auch den Kyffhäuser und das Umfeld von Bad Frankenhausen als Fundorte aufführt. Aus den letzten Jahren liegen nur vereinzelte Streufunde aus Thüringen vor. So führt POLLER (1993) die Beobachtung eines Einzeltieres aus dem Altenburger Land an, JÄNICKE (1997) ergänzt noch drei weitere Funde für den Zeitraum nach 1985 und HARTMANN et al. (1998) nennen ebenfalls einen Fundort, so daß aktuell neben dem oben aufgeführten Nachweis mindestens fünf weitere Nachweise aus unterschiedlichen Teilräumen Thüringens vorliegen.

Literatur

BOLOGNA, M. A. (1991): Coleoptera Meloidae. – Fauna d'Italia. Bologna.
BRINGMANN, H. D. (1992): Zum gegenwärtigen Vorkommen des Weberbockes (*Lamia textor*) in Ostdeutschland (Col., Cerambycidae). – Ent. Nachr. Ber. 36: 126-129.
GEISER, R. (1998): Rote Liste der Käfer (Coleoptera) (Bearbeitungsstand 1997). – Schriftenreihe Landschaftspfl. Naturschutz 55: 168-230.
HARTMANN, M., KOPETZ, A. &A. WEIGEL (1998): Bemerkenswerte Käferfunde in Thüringen 1996-1997 mit Ergänzungen aus den Vorjahren (Insecta, Coleoptera). – Thür. Faun. Abhandlungen 5: 215-226.
HORION, A. (1956): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. 5: Heteromera. – Tutzing.
HORION, A. (1974): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. 12: Cerambycidae. – Überlingen.
JÄNICKE, M. (1997): Ergänzungen zur Checkliste der Thüringer Ölkäfer (Meloidea) (Stand: 01.11.1997). – In: Thüringer Entomologenverband (Hrsg.): Check-Listen Thüringer Insekten 5: 44.
JEDICKE, E. (1996): Käfer. – In: Die Roten Listen. Gefährdete Pflanzen, Tiere, Pflanzengesellschaften und Biotoptypen in Bund und Ländern: 334-398.
KLAUSNITZER, B. & M. SIEBER (1993): Anmerkungen zur Bockkäferfauna der Oberlausitz (Col., Cerambycidae). – Ent. Nachr. Ber. 37: 13-20.
KOCH, K. (1968): Käferfauna der Rheinprovinz. Decheniana, Beiheft 13: 1-382.
KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. - Ent. Nachr. Ber. Beih. 4, 185 S.
NEUMANN, V. (1993): Rote Liste der Bockkäfer des Landes Sachsen-Anhalt. – Ber. Landesamt Sachsen-Anhalt 9: 48-52.
NÜSSLER, H. (1983): Die Bockkäfer der Umgebung von Dresden (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae). 2. Nachtrag. – Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 10: 163-168.
POLLER, U. (1993): Zur Bedeutung neuer Nachweise von *Meloë violaceus* MARSH. und *Lytta vesicatoria* (L.) für die Lokalfauna Altenburgs. – Mauritiana (Altenburg) 14: 113-114.
RAPP, O. (1934): Die Käfer Thüringens. Bd. 2. – Erfurt.
REDER, G. (1999): Beobachtungen bei einem Massenauftreten der Spanischen Fliege – *Lytta vesicatoria* (LINNAEUS, 1758) – im südlichen Rheinhessen (Coleoptera: Meloidae). – Fauna Flora Rheinland-Pfalz 9: 139-150.
SCHNEIDER, W. (1984): Die Spanische Fliege (*Lytta vesicatoria*, Coleoptera: Meloidae) in Rheinland-Pfalz. – Mitt. Pollichia 72: 305-314.
WEIGEL, A. (1999): Aktualisierte Checkliste der Bockkäfer Thüringens (Coleoptera: Cerambycidae). – In: Thüringer Entomologenverband (Hrsg.): Check-Listen Thüringer Insekten und Spinnentiere 7: 59-66.
ZEUNER, M. (1994): Die Bockkäferfauna des sächsischen Erzgebirges und Vogtlandes (Col., Cerambycidae). – Veröff. Mus. Naturk. Chemnitz 17: 95-156.

Anschrift der Verfasser:
Carsten Renker & Roman Aßhoff
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Institut für Ökologie
Dornburger Straße 159
D-07743 Jena

MITTEILUNGEN

Internationales Symposium Landschaftsplanung contra Evolution?

Evolutive Prozesse in der Natur und ihre Bedeutung für die Landschaftsplanung, Landschaftsentwicklung und Umsetzungspraxis vom 31.1.-2.2.2001 in Neuhaus/Solling

InteressentInnen für Vorträge und Posterpräsentationen sowie Informationen:
Prof. Dr. Bernd Gerken und Dipl.-Forsting. Martin Görner
p.A. Lehrgebiet Tierökologie
An der Wilhelmshöhe 44
D-37671 Höxter
Fax: 05271/687-235
e-mail: tieroeko@hx.uni-paderborn. de

3. Workshop **Populationsbiologie von Tagfaltern und Widderchen** vom 1.-3. März 2001 im Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle.
Veranstalter:
PD Dr. Josef Settele
UFZ Leipzig-Halle
Projektbereich Naturnahe Landschaften und Ländliche Räume
Permoserstr. 15
D-04318 Leipzig
e-mail: settele@pro.ufz.de
Tel. 0341/235-2003
Fax 0341/235-2534

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Nachrichten und Berichte

Jahr/Year: 2000/2001

Band/Volume: 44

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Mitteilungen. 204