© Entomologische Nachrichten und Berichte; down

TRENTINI, M. (2002): Ragni velenosi del Salento: *Cheiracanthium, Latrodectus, Loxosceles* e *Lycosa*. – In: PEPE, R, FORTUNA, M & BELMONTE, G. (Eds.): „Tarante" veleni e guarigioni. Atti del Convegno Interdisciplinare Lecce 31 ottobre 2000. – ideemultimediali, Nardò: 79-88.
VELLARD, J. (1936): Le venin des araignées. – Masson, Paris: 1-311.
VETTER, R. S. (2007): A bacterial infection frequently mistaken for spider bites. – Newsletter of the British arachnological Society **108**: 4-5.
VETTER, R. S. & ISBISTER, G. K. (2006): Verified bites by the woodlouse spider, *Dysdera crocata*. – Toxicon **47**: 826-829.
VETTER, R. S., ISBISTER, G. K., BUSH, S. P. & BOUTIN, L. J. (2006): Verified bites by yellow sac spiders (genus *Cheiracanthium*) in the United States and Australia: Where is the necrosis? – American Journal of Tropical Medicine and Hygiene **74**: 1043-1048.
WHITE J., CARDOSO J. L. & FAN H. W. (1995): Clinical toxicology of spider bites. – In: MEIER, J. & WHITE, J. (Eds.): Handbook of Clinical Toxicology of Animal Venoms and Poisons. – CRC press, Boca Raton, New York, London, Tokyo: 259-302.
WHITE, J. (2003): Debunking spider bite myths. Necrotising arachnidism should be a diagnosis of last resort. – Medical Journal of Australia **179**(4): 180-181. [Kontrolle]
WITSCHI, F. (2006): Spinnen. – Vontobel-Stiftung, Zürich: 1-130.
WOLF, A. (1988a): *Cheiracanthium punctorium* – Portrait einer berüchtigten Spinne. – Natur und Museum **118**(10): 310-317.
WOLF, A. (1988b): Die Sackspinnen *Cheiracanthium pennyi* als Wirt der Schlupfwespe *Zaglyptus varipes*. – Carolinea **46**: 145-146.
WOLF, A. (1989): Zur Verbreitung, Biotopbindung und Gefährdung von Dornfingerspinnen (*Cheiracanthium* C. L. Koch, 1839) der nordbadischen Rheinebene. Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg **64/65**: 255-280.
WOLF, A. (1990): Taxonomical studies on *Cheiracanthium erraticum* (WALCKENAER, 1802) and *Cheiracanthium pennyi* O. P. CAMBRIDGE, 1873 (Araneae, Clubionidae). – Zoologische Beiträge **33**(2): 233-245.

Manuskripteingang: 30.5.2009

Anschrift der Verfasserin:
Dr. Barbara Knoflach
Universität Innsbruck
Institut für Ökologie
Technikerstrasse 25
A-6020 Innsbruck

BUCHBESPRECHUNGEN

HARTMANN, M. & WEIPERT, J. (Hrsg.) (2009): Biodiversität und Naturausstattung im Himalaya III. – Verein der Freunde & Förderer des Naturkundemuseums Erfurt e. V., 478 S. + 20 Farbtafeln.

Bezugsadresse: Verein der Freunde & Förderer des Naturkundemuseums Erfurt e. V., Große Arche 14, D-99084 Erfurt oder e-mail: naturkundemuseum@erfurt.de. ISBN 978-3-00-027117-5

Nun liegt schon der 3. Band der „Himalaya-Reihe" vor, wieder herausgegeben von den Erfurter Kollegen des Naturkundemuseums, erneut das Ergebnis einer wissenschaftlichen Tagung. Wieder ist es ein überaus vielfältiges und umfangreiches Werk, das 42 Beiträge enthält. Drei betreffen allgemeine Themen, eines die Parasitologie, zwei die Botanik, eines den Roten Panda, zwei Aves, eines Krebstiere, die anderen 32 sind entomologischen Inhalts, deren Titel hier genannt werden sollen:

BROCKHAUS, T.: Erste kommentierte Checkliste der Libellen des Himalayagebirges (Insecta: Odonata). (S. 87-106).
DEODATI, T., D. CESARONI & V. SBORDONI: Molecular phylogeny, classification, and biogeographic origin of *Callerebia* and other related Sino-Himalayan genera (Insecta: Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). (S. 107-114).
HUBER, C. & J. SCHMIDT: Contribution to the knowledge of *Nebria* LATREILLE, 1802 (*Patrobonebria* BÄNNINGER, 1923) from the Nepal Himalaya (Insecta: Coleoptera: Carabidae: Nebriinae). (S. 115-120).
MÜLLER-MOTZFELD, G.: Neues zur biogeographischen Gliederung der Laufkäferfauna der Subtribus Bembidiina in Zentralasien (Insecta: Coleoptera: Carabidae). (S. 121-126).
SCHMIDT, J.: A remarkable new species of the genus *Bembidion* LATREILLE, 1802 from the Arun River Valley of East Nepal (Insecta: Coleoptera: Carabidae). (S. 127-130).
SCHMIDT, J., W. LORENZ & D. W. WRASE: Notes on taxonomy and distribution of Himalayan species of the *Pterostichus* subgenus *Bothriopterus* CHAUDOIR, 1835 (Insecta: Coleoptera: Carabidae: Pterostichini). (S. 131-135).
SCHMIDT, J.: *Platyderus anandi* sp. n., ein Tertiärrelikt im zentralen Nepal-Himalaya (Insecta: Coleoptera: Carabidae: Sphodrini). (S. 137-140).
SCHMIDT, J.: Taxonomie und Verbreitung von Arten der Gattung *Lucicolpodes* SCHMIDT, 2000, stat. n. (Insecta: Coleoptera: Carabidae: Platynini). (S. 141-161).
HIEKE, F. & J. SCHMIDT: Eine neue *Amara*-Art des Subgenus *Curtonotus* STEPHENS, 1828 aus Südtibet (Insecta: Coleoptera: Carabidae). (S. 163-166).
WRASE, D. W. & B. M. KATAEV: New species of *Psychristus* ANDREWES, 1930 subgenus *Nipponobradycellus* HABU, 1973 from China and faunistic notes on species previously described (Insecta: Coleoptera: Carabidae: Harpalini: Stenolophina). (S. 167-180).
JÄCH, M. A. & A. SKALE: Revision of the *Hydraena* (s. str.) *cirrata* species group (Insecta: Coleoptera: Hydraenidae). (S. 181-236).
BORDONI, A.: Contribution to the knowledge of the Xantholinini from China. XIII. Species from Yunnan, Zhejiang and Sichuan collected by ANDREAS PÜTZ (Insecta: Coleoptera: Staphylinidae). (S. 237-242).
BORDONI, A.: New data on the Xantholinini of the Oriental Region. 18. Specimens from Nepal of the Naturkundemuseum Erfurt (Insecta: Coleoptera: Staphylinidae). (S. 243-247).
AHRENS, D. & S. FABRIZI: New species of Sericini from the Eastern Himalaya and Tibet (Insecta: Coleoptera: Scarabaeidae). (S. 249-284).

 Berichte; download unter www.biologiezentrum.at

JÄGER, O. & PÜTZ, A.: Contributions to the knowledge of the genus *Morychus* ERICHSON, 1847 of Nepal (Insecta: Coleoptera: Byrrhidae). (S. 285-288).
PÜTZ, A.: Zur Kenntnis der Byrrhidenfauna von Arunachal Pradesh (Indien) (Insecta: Coleoptera: Byrrhidae). (S. 289-292).
PÜTZ, A.: *Simplocaria* (*Simplocaria*) *myanmarica* sp. n. – der erste Vertreter der Familie Byrrhidae aus Myanmar (Insecta: Coleoptera: Byrrhidae). (S. 293-294).
KLAUSNITZER, B.: Neue Arten der Gattung *Prionocyphon* L. REDTENBACHER, 1858 aus Nepal (Insecta: Coleoptera: Scirtidae) (142. Beitrag zur Kenntnis der Scirtidae). (S. 295-297).
CONSTANTIN, R.: A revision of the genus *Lobonyx* JACQUELIN DU VAL, 1859, of Central Asia, with the description of a new species from Nepal (Insecta: Coleoptera: Prionoceridae). (S. 299-311).
BRANCUCCI, M.: Ichthyurini from Nepal (Insecta: Coleoptera: Cantharidae). (S. 313-326).
KAZANTSEV, S. V.: The species of the genus *Laemoglyptus* FAIRMAIRE, 1886 of Nepal (Insecta: Coleoptera: Cantharidae). (S. 327-333).
KOPETZ, A.: Checkliste und Bibliographie der Cantharidae Nepals (Insecta: Coleoptera). (S. 335-350).
GERSTMEIER, R.: Some further notes on Himalayan Cleridae (Insecta: Coleoptera: Cleridae). Checkered Beetles of the Himalaya, Part 3. (S. 351-358).
HÁVA, J.: Key to genera and subgenera of dermestid beetles of the Himalaya (Insecta: Coleoptera: Dermestidae). (S. 359-361).
SCHAWALLER, W.: Two new epigean species of the genus *Menimus* SHARP, 1876 from Yunnan (China) (Insecta: Coleoptera: Tenebrionidae). (S. 363-365).
SPRECHER-UEBERSAX, E.; A. S. KONSTANTINOV, K. D. PRATHAPAN & M. DÖBERL: Revision of the genus *Benedictus* SCHERER (Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae). (S. 367-406).
MEDVEDEV, L. N.: New species of leaf beetles from the collection of the Naturkundemuseum Erfurt (Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae). (S. 407-410).
WEIGEL A. & C. HOLZSCHUH: Die *Exocentrus*-Arten Nepals (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae: Acanthocinini). (S. 411-421).
HOLZSCHUH, C.: Eine neue Art der Gattung *Glenea* NEWMAN, 1842 aus dem Himalaya (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae: Saperdini). (S. 423-424).
DAS, B.C.: The influence of some ecological factors on the abundance and distribution of aphidiine fauna of the Garhwal Himalayas (Insecta: Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae). (S. 425-439).
CHAKRABARTI, S. & M. DEBNATH: Diversity of Aphidophagous Parasitoids (Insecta) of Northwest and Western Himalayas, India. (S. 441-454).
BURGER, F.; F. CREUTZBURG & M. HARTMANN: Die Hummeln von Nepal (Insecta: Hymenoptera: Apidae: *Bombus*). (S. 455-462).

Es ist sehr erfreulich, dass neben 27 Beiträgen in englischer Sprache auch 15 Arbeiten deutsch geschrieben sind und damit helfen, unsere Muttersprache als Wissenschaftssprache zu pflegen und zu erhalten.

Heute ist das Naturkundemuseum Erfurt mit seinen überaus aktiven Mitarbeitern (es gibt einen ganzen Forscherkreis) längst zum Zentrum der Erforschung der Natur des Himalaja geworden. Man kann nur zuraten, diese Konzentration beizubehalten (Thüringen kommt schon nicht zu kurz) – der Erfolg und das internationale Ansehen sind der Lohn.

Der 3. Band ist – wie schon die anderen beiden – hervorragend ausgestattet und äußerst interessant. Er kann uneingeschränkt empfohlen werden. Die Beiträge beider Bände werden noch lange in die Zukunft wirken. Den Herausgebern gebührt ein herzlicher Dank und Glückwunsch! An die entomologische Familie richte ich die Bitte: kauft diesen Band – er ziert jede Entomologenbibliothek und der Verein der Freunde & Förderer des Naturkundemuseums Erfurt e. V. braucht Unterstützung.

BERNHARD KLAUSNITZER

ERLESENES

Maden auch in Sauerkirschen?

Madige, von *Rhagoletis cerasi* befallene Süßkirschen sind schon lange Ärgernis und ökonomisches Problem, künftig muss man auch mit Maden in Sauerkirschen (Prunus cerasus) rechnen, in denen sich *Rh. cerasi* nicht entwickelt. 2001 wurde in den Niederlanden einer der bedeutendsten Schädlinge im nordamerikanischen Kirschenanbau, *Rhagoletis cingulata* in Früchten der Spätblühenden Traubenkirsche (Prunus serotina) festgestellt, zunächst allerdings für *Rh. indifferens* gehalten. Die Fliegen unterscheiden sich von anderen Arten der Gattung durch ein gegabeltes (mitunter teilweise zu Punkten reduziertes) Apikalband im Flügel. 2003 wurden vom niederländischen Pflanzenschutz umfangreiche Untersuchungen durchgeführt, die eine schon damals weite Verbreitung erwiesen. Inzwischen ist die Fliege auch im Rheintal und in Niedersachsen vorhanden und eine Ausrottung kaum noch möglich. Es wird für möglich gehalten, dass auch *Rh. indifferens* eingeschleppt wurde. *Rh. cingulata* wurde als Quarantäneschädlinge eingestuft,. bei dem es im Export keine Nulltoleranz gibt. (Nederlandse Faunistische Mededelingen **28:** 1-16, 2008)

U. SEDLAG

Großer Räuber, Kleine Beute

Altbekannt ist der Masseneinflug der einst von den sich damit mästenden Ureinwohnern ausgebeuteten Bogong-Eule *Agrotis infusa* in den australischen Alpen. Vergleichbares gibt es auch in Nordamerika. Im Hochgebirge des Yellowstone Nationalparks stießen ein Bärenexperte und ein Kameramann Ende Juli 2008 auf gewöhnlich solitäre Grizzlybären, die an steilen, kahlen Felsen Kopf an Kopf Eulenfalter (*Euxoa auxiliaris*) ausgruben, die hier wie die australischen Eulen kühle Schlupfwinkel zum Übersommern aufsuchen. Es wurde geschätzt, dass ein Bär bis zu 40.000 Falter am Tag erbeutet. (BBC **27:** H. 2: 58, 2009)

U. SEDLAG

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Nachrichten und Berichte

Jahr/Year: 2009

Band/Volume: 53

Autor(en)/Author(s): Klausnitzer Bernhard

Artikel/Article: Buchbesprechungen. 73-74