

Quatre Saprinini (Coleoptera-Histeridae) inédits du pays des Somalis

Par J. Therond (Nîmes)

1. *Baeckmanniolus virescens* nov. sp.

Ovale allongé, assez convexe; d'un noir luisant à reflet vert-métallique (ce reflet bien apparent à travers une goutte d'eau); mandibules, pattes et antennes ferrugineuses, ces dernières à massue testacée. Front transverse, légèrement bombé, imponctué, garni de deux légers chevrons plus ou moins courbés; strie frontale entière, droite en devant et saillante.

Pronotum un peu plus large que long, à peine bisinué à la base, oblique et subsinué sur les côtés, rétréci et échancré en devant, avec les angles arrondis; portant tout à fait à la base une rangée unique de points fins et écartés et quelques autres points fins et espacés près des angles antérieurs, à une certaine distance de la marge; strie marginale entière.

Elytres un peu plus longs que le pronotum, de sa largeur à la base, sans dilatation sensible aux épaules, rétrécis postérieurement; la ponctuation, éparsée, est localisée au tiers postérieur, entre la strie suturale et la 2ème dorsale, ne pénètre pas dans les interstries, mais remonte obliquement vers la suture; stries dorsales nettes, ponctuées: la première jusqu'au milieu, la 2ème le dépassant, les 3ème et 4ème égales, atteignant le tiers postérieur; strie suturale entière, reliée à la 4ème dorsale par un arc basal et à l'apicale; humérale oblique, très fine et rapprochée de la première dorsale; sub-humérale interne très courte, médiane; subhumérale externe indistincte; marginale forte et entière.

Propygidium couvert de points peu serrés; pygidium de points plus fins et encore plus espacés à la base, lisse à l'apex.

Prosternum en carène un peu concave; stries internes convergentes à la base, presque réunies au niveau des hanches, puis continuant leur course, parallèles, très proches l'une de l'autre, mais n'atteignant pas le sommet; stries externes peu obliques à la base, puis convergentes, enveloppant les internes et réunies à l'apex en un angle aigu, entre les deux fossettes pré-apicales. Mesosternum entièrement rebordé, lisse comme le metasternum; suture meso-metasternale surchargée d'une rangée de points écartés.

Tibias antérieurs élargis, garnis de 6-7 denticules épineux, dont les trois derniers, les plus grands, sont néanmoins beaucoup moins forts que chez *B. dimidiatus* Ill.

Long.: 1,8–2,5 mill.

Hab. Somalie: Mogadiscio, prov. Benadir, quatre exemplaires (C. Koch, VII. 1959). Type et paratype au Museum G. Frey à Tutzing, paratype dans ma collection.

Ressemble à *B. dimidiatus* var. *hummleri* Müll., mais s'en distingue à première vue par sa taille en moyenne plus petite et son reflet vert-métallique. La massue antennaire est testacée; le pronotum, moins transversal, n'a qu'une rangée de points sur la base et en porte quelques-uns près des angles antérieurs; les stries dorsales sont mieux limitées, et, ce sont les internes qui sont les plus longues; la zone ponctuée des élytres est obliquement arrêtée vers la suture et les points sont plus écartés; les pygidia sont plus finement ponctués; les stries prosternales internes n'arrivent pas jusqu'au sommet du prosternum, etc.

2. *Baeckmanniolus laevis* nov. sp.

Se distingue des autres congénères surtout par la surface tout à fait lisse de ses élytres.

Ovale allongé, assez convexe, d'un brun ferrugineux assez clair, surtout aux élytres. Tête comme dans *B. virescens* m., un peu plus large proportionnellement; chevrons frontaux très fins.

Pronotum lisse, à peine subsinué sur les côtés, très peu rétréci en devant, échancré, avec les angles largement arrondis; finement ponctué sur l'extrême base seulement; strie marginale entière.

Elytres lisses; stries dorsales pas visiblement ponctuées: la 1ère atteignant à peine le milieu, les 2ème et 3ème égales, la 4ème, la plus longue, réunie par un arc basal à la suturale, qui est elle-même liée à la portion apicale de la strie marginale, laquelle est entière; humérale oblique, fine; un vestige peu distinct de subhumérale interne.

Pygidia couverts d'un pointillé peu serré; l'apex du pygidium lisse.

Sternum conformé comme chez *B. virescens* m.

Tibias antérieurs élargis, garnis de 6 denticules épineux, dont les trois derniers, surtout les deux derniers sont grands.

Long.: 2–2,5 mill.

Hab. Somalie: Obbia, Mudugh, 2 exemplaires (VIII. 1958, C. Koch). Type au Museum G. Frey à Tutzing.

3. *Styphrus somaliensis* nov. sp.

Ovale oblong, fort bombé, d'un brun-ferrugineux luisant, garni en-dessous, latéralement, surtout sur les côtés du pronotum de longs poils jaunes serrés. Antennes d'un rouge pâle. Pattes d'un roux ferrugineux. Front transversal, lisse et peu convexe, dépourvu de strie.

Pronotum court, beaucoup plus large que long, arqué à la base, oblique sur les côtés, rétréci et échancré en devant, avec les angles abaissés; longuement cilié de jaune sur les côtés; tout à fait lisse, sauf une rangée de points le long et tout contre la base; strie marginale visible sur les côtés seulement.

Elytres un peu plus longs que le pronotum, de sa largeur à la base, dilatés à l'épaule, rétrécis postérieurement; lâchement ponctués à l'extrémité du 4ème intervalle jusqu'à la 3ème strie; la ponctuation remontant, irrégulière, jusqu'au milieu vers la suture et n'occupant que la moitié interne du 4ème intervalle. Stries bien marquées, assez fines; dorsales fortes, courbées, surtout la première, qui est entière comme les autres, mais qui est prolongée le long de la base par une irrégulière rangée de points jusqu'à la 4ème dorsale; 4ème dorsale réunie à la suturale par un arc basal; suturale entière, plus rapprochée de la suture en arrière qu'en avant; humérale fine, proche de la 1ère dorsale; subhumérale interne assez longue, à peine disjointe; subhumérale externe imperceptible; strie marginale entière.

Propygidium irrégulièrement ponctué. Pygidium bombé, très incliné, très finement ponctué, lisse au bout.

Prosternum en carène tranchante, concave dans le sens de la longueur; stries internes obliques à la base et tôt réunies, peu distinctes sur la carène où elles semblent parallèles, excessivement proches l'une de l'autre; stries externes réunie un peu avant l'apex, entre les deux fossettes préapicales. Mesosternum peu visiblement ponctué, entièrement rebordé. Côtés des sterna et de l'abdomen longuement villeux.

Tibias antérieurs munies de 3 énormes dents, précédées d'un peigne de 4 à 6 denticules; tibias postérieurs élargis, garnis de longues épines ferrugineuses et de cils pâles; ongles en griffes excessivement tenues.

Long.: 3 mill.

Hab. Somalie: El Cabobe, Mudugh, 1 ex. (VIII. 1958, C. Koch); Obbia, Mudugh, 1 ex. (VIII. 1958, C. Koch); Uarsciek, Benadir Prov., 1 ex. (VIII. 1958, C. Koch); Mogadiscio, Benadir Prov., 1 ex. (VII. 1959, C. Koch). Type au Museum G. Frey à Tutzing, paratypes dans cette collection et dans la mienne.

Cette espèce rappelle d'assez près *Xenonychus tridens* Jac Du Val; mais elle s'en distingue à première vue par son front totalement dépourvu de strie, son pronotum absolument lisse, etc.

4. *Neopachylopus kochi* nov. sp.

Ovale, très bombé, d'un roux-ferrugineux, imponctué. Antennes ferrugineuses, à massue plus claire. Front large, entouré d'une strie entière, presque

droite en devant et portant derrière elle un chevron très fin, en forme d'accent circonflexe.

Pronotum arrondi en arrière, très luisant (à un fort grossissement on ne distingue que quelques points très fins sur le disque); strie marginale entière, mais très légère derrière la tête; côtés presque droits; angles antérieurs arrondis et avancés; pas de points le long de la base.

Élytres de la largeur du pronotum à la base, plus longs que lui, dilatés à l'épaule, rétrécis postérieurement, arqués au bout, les angles externes arrondis. Stries dorsales faibles: 1ère longue, 2ème dépassant le milieu, 3ème et 4ème courtes, basales, la 3ème obsolète, la 4ème réunie par un arc basal à la suturale, qui est entière, prolongée jusqu'à l'apicale, elle-même liée à la marginale; strie humérale oblique; subhumérale externe nulle, interne courts, médiane.

Pygidia lisses comme le reste du corps, le pygidium grand, vertical, peu convexe.

Prosternum en carène tranchante, très concave dans sa portion antérieure; stries internes tôt réunies, externes convergentes, très courtes, arrivant à peine au milieu de la carène. Mesosternum finement, mais entièrement rebordé. Metasternum portant un sillon longitudinal au milieu.

Tibias antérieurs armés à la base d'un peigne de 5-6 petites dents serrées, suivies vers le sommet de 3 plus grosses, assez écartées. Fémurs postérieurs renflés, tibias postérieurs dilatés, garnis en dehors de courtes épines serrées, irrégulièrement plantées.

Long.: 3 mill.

Hab. Somalie: Balad, Benadir Prov., 2 ex. (VII. 1958, C. Koch); Obbia, Mudugh, 1 ex. (VII. 1958, C. Koch); Mogadiscio, Benadir Prov., 2 ex. (VIII. 1958 et VIII. 1959, C. Koch). Type au Museum G. Frey à Tutzing, paratypes dans cette collection et dans la mienne.

Rappellerait assez *Baeckmanniolus laevis* m., décrit ci-dessus, mais, la striation des élytres et du prosternum, la denticulation des tibias antérieurs et surtout la conformation des pattes postérieurs, se rapprochant de celle de *Pachylopus dispar* Er., l'en séparent nettement.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Arbeiten Museum G. Frey](#)

Jahr/Year: 1963

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Therond J.

Artikel/Article: [Quatre Saprinini \(Coleoptera-Histeridae\) ineditis du pays des Somalis. 110-113](#)