

Nova Coleoptera Malacodermata.¹⁾

Par M. Pic, Digoin, Frankreich.

Phengodes ? fusca v. nov. *atricolor* (*Phengodidae*).

Nigra, mandibulis et abdomine apice testaceis, nitida, elytris subopacis. Capite breve et lato, nitido, oculis valde prominulis; antennis biramulosis, nigris, articulo 1° rufo notato; thorace breve et lato; elytris subopacis, ad basin latis, valde dehiscentibus, postice angustatis, dense ruguloso-punctatis, in disco subcostulatis. Long. 10 mill. environ.

Costa Rica: Turrialba (P. Schild).

Se distingue au moins de *P. fusca* Gorh. (ex description) par la taille moindre, l'avant-corps autrement (non rugueusement) ponctué.

Phrixothrix opacus n. sp. (*Drilidae*).

Elongatus, longe griseo pubescens et parum hirsutus, supra opacus, piceus, pro parte brunneus, capite thoraceque rufo notatis, elytris apice anguste flavo marginatis. Capite parum elongato, sat lato, dense ruguloso-punctato, oculis nigris, parum prominulis; antennis fractis; thorace parum lato, antice attenuato, supra antice impresso, dense ruguloso-punctato; elytris thorace paulo latioribus, elongatis, postice paulo dehiscentibus et attenuatis, ruguloso-punctatis, postice densiore; infra corpore nitido, piceo, abdomine apice rufo, longe prominulo; pedibus parum gracilibus. Long. 9 mill.

Perou: Callanga.

Peut se placer près de *P. nigrofasciatus* Pic, s'en distingue, à première vue, par les élytres dépourvus de fascie noire et la forme un peu plus allongée.

Phrixothrix Fischeri n. sp. (*Drilidae*).

Oblongus, longe et subhirsute griseo et pro parte fusco pubescens, nitidus, testaceus, antennis, capite, elytris et abdomine, apice excepto, nigris, pedibus testaceis, tibiis tarsisque pro parte brunneis. Capite nigro, antice rufo, sat lato, fortiter sat dense punctato, oculis validis, paulo prominulis; antennis nigris articulo 1° testaceo, brevibus, ramulis pilosis binis, gracilibus et apice recurvatis; thorace rufo, parum lato, antice attenuato, fortiter non dense punctato; scutello rufescente; elytris nigris, thorace paulo latioribus, sat brevibus, post medium paulo dilatatis, apice paulo dehiscentibus et attenuatis, ad basin parum dense punctatis, postice dense ruguloso-punctatis; abdomine piceo, apice testaceo, longe prominulo; pedibus sat gracilibus. Long. 4 mill.

¹⁾ Les types se trouvent dans la collection de la Deutsches Entomolog. Institut. Berlin-Dahlem, Gosslerstr. 90; quelques co-types aussi dans la collection Pic: *Laius subhumulatus*; *Athemus* v. *obliteratus*; *Malthodes testaceohumeralis*; *Ichthyurus Saeteri*.

Brésil: Rio de Janeiro (R. Fischer).

Voisin de *P. piceipennis* Pic, s'en distingue par la tête moins robuste, le prothorax moins large et brillant, fortement ponctué, les élytres plus foncés, entièrement noirs.

Monocladus testaceonotatus n. sp. (*Drilidae*).

Elongatus parum, nitidus, griseo pubescens, niger, pro parte brunnescens, elytris antice longe testaceo notatis, tibiis, tarsis pro parte testaceis. Capite nigro, parum lato et breve, dense ruguloso-punctato; antennis piceo-brunneis, articulis 3^e et sequentibus longe et sinuate flabellatis; thorace nigro, breve et lato, lateraliter fere recto, antice subarcuato, anguste marginato, medio longitudinaliter impresso, fortiter et dense punctato, angulis posticis paulo prominulis, testaceis; scutello nigro, apice brunneo, elongato, apice truncato, dense punctato; elytris thorace paulo latioribus, elongatis, subparallelis, postice, attenuatis, diverse punctatis, subcostulatis, his piceo-brunneis, intus et antice longe testaceis: infra corpore brunnescente; pedibus validis, femoribus brunneis, tibiis testaceis, tarsis bicoloribus. Long. 6 mill.

Indes or.

Peut se placer près de *S. vittatus* Gorh., en diffère par les élytres sans bande suturale foncée, les pattes bicolores.

Laius sublunulatus n. sp. (*Malachiidae*).

Oblongus, grandis, sparse griseo pubescens aut fusco hirsutus, subnitidus, elytris pro parte subopacis, testaceus, capite postice, antennis apice, scutello, pectore pedibusque pro majore parte nigris, elytris testaceis, ad humeros arcuate violaceo-cyaneo maculatis, post medium in disco incomplete cyaneo-violaceo annulatis, annulo intus interrupto. Capite antice flavo-testaceo et depresso, postice nigro, minute punctato, oculis nigris, prominulis; antennis nigris, articulis primis testaceis, robustis, articulo primo in mare lato, depresso, apice subangulato-dilatato, tertio lato, monstroso, supra inaequale impresso, articulis intermediis in mare apice intus prolongatis, ultimis angustatis; antennis ♀ simplicibus, ad basin latioribus; thorace testaceo, lato, sat breve, antice et postice attenuato, parum punctato; scutello nigro; elytris thorace sat latioribus, parum elongatis, postice paulo attenuatis, diverse, pro majore parte dense, punctatis, ad suturam et lateraliter plicatis, testaceis, signaturis diversis et violaceo-cyaneis ornatis; pedibus sat validis, nigris, femoribus anticis et tarsis pro parte testaceis, tibiis anticis pro parte brunnescentibus; abdomine testaceo, pectore nigro. Long. 7-7,5 mill.

Australie: Queensland

A placer près de *L. major* Lea, s'en distingue par la structure des antennes différente (avec le premier article plus épais, etc.) et la présence, sur les élytres, d'une macule postérieure métallique lunulée non complète, interrompue en dedans sur son milieu.

Philhedonus brevelineatus n. sp. ♀ (*Malachiidae*).

Oblongo-elongatus, postice latior, griseo pubescens et longe fusco hirsutus, nitidus, nigro-cyaneo metallicus, thorace rufo, medio nigro-cyaneo vittato, vitta postice oblitterata, elytris cyaneis, abdomine testaceo. Capite robusto, simplice, minute et sparse punctato, medio paulo impresso; antennis validis, subdentatis, nigris, ad basin infra rufo notatis; thorace breve et lato, postice attenuato et marginato, minute et sparse punctato; elytris parum elongatis, post medium latioribus, apice breve attenuatis minute non dense punctatis, pro parte costulatis, antice valde impressis; pedibus nigris, sat gracilibus. Long. 5 mill. environ.

Afrique: Usambara.

Ressemble à *P. rugulosus* Gorb. mais la sculpture élytrale est différente, l'abdomen testacé. Espèce caractérisée par la présence, sur le prothorax, d'une bande médiane foncée non complète, éloignée de la base.

Attalus biapicalis n. sp. ♀ (*Malachiidae*).

Elongatus, postice latior, pro parte griseo-holosericeo pubescens et in elytris longe fusco hirsutus, nitidus, elytris subopacis, testaceus aut flavus, capite postice nigro et thorace antice medio breve nigro notato, elytris olivaceis, apice testaceo notatis et flavo maculatis. Capite robusto, nigro, antice flavo, minute et sparse punctato; antennis elongatis, denticulatis, articulis primis et ultimo apice testaceis, 7-11 diverse piceis; thorace sat breve et lato, postice attenuato, parum punctato, rufo, postice et lateraliter flavo marginato, antice, reducte nigro notato; scutello rufo; epipleuris testaceis, elytris elongatis, post medium latioribus, apice breve attenuatis, tricoloratis, minute et dense punctatis, in disco subcostulatis; infra corpore pedibusque flavo-testaceis, his gracilibus. Long. 4 mill.

Afrique occ.: Kamerun (Conradt).

Espèce très caractérisée et distincte de celles connues par la coloration particulière des élytres, ces organes étant ornés d'une macule allongée antéapicale flave jointe à une macule apicale testacée.

Attalus flavonotatus n. sp. ♀ (*Malachiidae*).

Sat elongatus, postice latior, griseo pubescens et in elytris sparse fusco hirsutus, nitidus, elytris subopacis, flavus, capite postice, thorace medio elytrisque nigris, his apice testaceo notatis et flavo maculatis. Capite robusto, minute punctato, nigro, ante oculos flavo; antennis elongatis, gracilibus, denticulatis, flavis, apice piceis; thorace parum breve sat lato, lateraliter subarcuato, postice attenuato, parum punctato, nigro, lateraliter, antice latiore, flavo marginato; scutello nigro; elytris parum elongatis, post medium latioribus, apice breve attenuatis, minute et dense punctatis, tricoloratis, epipleuris antice flavis; infra corpore pedi busque flavis, his gracilibus. Long. 3,5 mill.

Kamerun (Conradt).

La système de coloration aux élytres est analogue au précédent avec cette différence que la macule allongée flave est bordée de foncé sur les

côtés; diffère, en outre, du précédent par la forme plus robuste de l'avant corps, lequel en plus est autrement coloré, les élytres moins longs, à fond noir et sans costules nettes.

Attalus Drakei n. sp. (*Malachiidae*).

Oblongus, griseo pubescens aut fusco hirsutus, nitidus, rufo-testaceus, capite, pygidio et abdomine supra nigris, elytris in singulo ad humeros et post medium nigro maculatis, macula postica maxima. Capite breve et lato, fere impunctato, nigro, labro rufo; antennis gracilibus, porum elongatis, testaceis; thorace breve et lato, lateraliter subarcuato, minute et sporse punctato; elytris parum elongatis, postice latioribus, apice breve attenuatis, fortiter sat dense punctatis, lateraliter antice carinatis; pedibus testaceis, sat gracilibus. Long. 4 mill.

Paraguay (Dr. Drake).

Peut se placer près de *A. Gounellei* Pic, en outre de la coloration bien différente s'en distingue par la ponctuation plus forte des élytres.

Attalus trimaculatus n. sp. (*Malachiidae*).

Sat elongatus, parum griseo pubescens, non hirsutus, testaceus, capite postice, scutello et infra corpore (abdomine rufo?) pro parte nigris, elytris flavo-testaceis, post scutellum nigro maculatis et in singulo ante apicem nigro maculatis, membris testaceis. Capite deplanato, antice testaceo, in vertice nigro, oculis griseis, prominulis; antennis gracilibus, testaceis; thorace testaceo, breve et lato, lateraliter subarcuato, parum punctato; scutello nigro; elytris sat elongatis, post medium parum latioribus, postice longe attenuatis, minute et dense punctatis, floris et nigro maculatis; pedibus gracilibus, testaceis. Long. 3 mill.

Guatemala.

Espèce très distincte par les élytres flaves et trimaculés de foncé, pouvant se placer près de *A. goyasensis* Pic.

Ebaeus Conradti n. sp. ♂ (*Malachiidae*).

Sat elongatus, parum nitidus, griseo pubescens et in elytris fusco semihirsutus, niger, epipleuris elytrisque apice vage rufis et brunneo truncato apperdiculatis, abdomine rufescente, membris testaceis pedibus pro parte brunnescentibus. Capite robusto; antennis elongatis, gracilibus, flavo-testaceis, articulo 1° supra brunneo notato; thorace breve et lato, lateraliter subarcuato, mediocre punctato; elytris sat elongatis, postice mediocre latioribus, postice attenuatis, apice foveolatis et appendiculatis, sat fortiter et dense punctatis, antice oblique sat fortiter impressis; pedibus gracilibus, pro majore parte testaceis. Long. 8 mill. environ.

Kamerun (Conradt).

Cette petite espèce, peut prendre place près de *Martini* Pic, et s'en distingue, à première vue, par la coloration générale foncée, la ponctuation forte et les impressions très distinctes des élytres.

Pseudocolotes lateapicalis n. sp. (*Malachiidae*).

Oblongo-subconvexus, parum pubescens, nitidus, pro parte rufo-brunneus, elytris olivaceo-viridibus, antice testaceo marginatis, apice late testaceis, membris testaceis. Capite mediocre, breve, rufo-brunnescente, ad oculos testaceo lineato, oculis griseis, prominulis, antennis testaceis, pro parte fractis; thorace breve sat lato, lateraliter subarcuato, parum punctato, rufo-brunnescente, postice et lateraliter testaceo marginato; elytris bicoloratis, oblongo-subovalis, apice attenuatis, subconvexis, humeris subrotundatis, apice excepto, fortiter et irregulariter punctatis; pedibus testaceis. Long. 2 mill. environ.

Kamerun (Conradt).

Peut se placer près de *P. apicalis* Pic, dont il se distingue facilement par la coloration, les élytres olivâtres, bordés de clair sur les côtés et plus largement testacés au sommet.

Carphurus Horni n. sp. (*Malachiidae*).

Elongatus, griseo pubescens, nitidus, rufus, infra corpore pedibusque obscurioribus, elytris nigropiceis, in disco longe flavo maculatis, humeris rufis. Capite rufo, robusto, cum oculos thorace paulo latiore, oculis griseis, prominulis; antennis elongatis, testaceis, apice nigris; thorace rufo, parum elongato, postice paulo angustiore, parum punctato; elytris parum brevibus, postice paulo latioribus, minute punctatis, diverse coloratis; abdomine prominulo, nigro, vage rufo notato; pedibus piceis, gracilibus. Long. 2,5 mill.

Ceylan: Kandy (W. Horn).

Cette petite espèce est tranchée dans le genre par la présence, sur les élytres, d'une macule allongée flave rapprochée des bords; on peut la placer près de *C. transaripennis* Mots.

Silis trinotaticollis n. sp. ♂ (*Telephorini* ou *Cantharini*).

Elongata, griseo pubescens, parum nitida, nigra, capite antice thoraceque flavis, illo medio nigro sinuate vittato et lateraliter ad medium piceo maculato. Capite sat lato, oculis prominulis; antennis nigris, longissimis, filiformibus, pilosis; thorace breve et lato, antice attenuato, marginato, lateraliter postice inciso et bispinoso, parum punctato, medio supra impresso, elytris elongatis, subparallelis, apice breve attenuatis, sat minute et dense punctatis, vage costulatis; pedibus piceis, gracilibus. Long. 4 mill.

Guatemala (Conradt).

Espèce reconnaissable entre toutes par la particulière coloration du prothorax, celui-ci étant marqué de foncé sur les côtés, en plus d'une bande médiane noire non régulière. Peut se placer près de *S. sepulchralis* Gorh.

Athemus atroopacus n. sp. (*Telephorini*).

Elongatus, subnitidus, elytris opacis, nigro-fuliginosus, supra parum griseo aut fulvo pubescens, infra corpore griseo-holosericeo pubescente.

Capite parum robusto, parum punctato, oculis prominulis; antennis brevibus, gracilibus, articulo 2° elongato, tertio brevior; thorace subquadrato, lateraliter subsinuato et ciliato, in disco sulcato, supra lateraliter antice et postice impresso, parum punctato; elytris thorace valde latioribus, parum elongatis, lateraliter subsinuatis, minute ruguloso-punctatis, in disco interne multi costulatis; pedibus gracilibus, unguibus simplicibus, aliquis ad basin dilatatis aut spinosis. Long. 12 mill.

Formose: Chosokei (H. Sauter).

Espèce très distincte par sa coloration générale noire, ses élytris opaques et en partie costulées longitudinalement. Sans doute voisin de *A. xanthogaster* Chp. qui ne m'est connu que par la description.

Athemus chosokeiensis n. sp. (*Telephorini*).

Angustatus, nitidus, sparse griseo pubescens et hirsutus, testaceus, oculis antennisque pro majore parte nigris, membris pilosis. Capite sat robusto, inter oculos, his prominulis, paulo excavato, minute et sparse punctato; antennis gracilibus, sat brevibus, nigris, ad basin testaceis, articulo 2° elongato tertio fere dimidio brevior; thorace angustato et elongato, lateraliter fere recto, medio sulcato, supra lateraliter antice et postice impresso, minute et sparse punctato; elytris thorace sat latioribus, parum elongatis, subparalleles, apice breve attenuatis, inaequale ruguloso-punctatis, subcostulatis; pedibus gracilibus, unguibus simplicibus, aliquis ad basin dilatatis aut appendiculatis. Long. 10 mill. environ.

Formose: Chosokei.

Espèce très distincte par sa coloration générale testacée. Peut être voisin de *A. monostigma* Chp. et s'en distinguant (ex description) au moins par le prothorax non maculé et les pattes testacées.

Athemus flavonotaticeps n. sp. (*Telephorini*).

Elongatus, diverse griseo pubescens, nitidus, diverse testaceus aut niger, elytris cyaneo aut cyaneo-viridescence metallicis. Capite nigro, infra oculos flavo notato, mandibulis pro parte rufis mediocre, oculis sparse punctato oculis prominulis; antennis nigris, ad basin infra testaceis, gracilibus, elongatis, articulo 2° tertio brevior; thorace sat angustato et elongato, lateraliter sinuato, medio sulcato, antice lateraliter et postice impresso, diverse non dense punctato, illo testaceo, pro parte flavo, antice nigro notato, in disco nigro bimaculato (forma typica), aut immaculato (var. nov. oblitérata); scutello nigro; elytris metallicis, thorace sat latioribus, parum elongatis, postice paulo attenuatis, dense ruguloso-punctatis; infra corpore pro parte (pectore) nigro (forma typica), aut testaceo (var. oblitérata); abdomine testaceo, lateraliter, apice excepto, nigro maculato; pedibus nigris, femoribus pro parte infra rufis aut ad basin late testaceis, parum gracilibus, unguibus simplicibus, aliquis ad basin dilatatis. Long. 15 mill.

Formose: Chosokei (H. Sauter).

Très distinct de *A. rubricollis* Hope par la tête noire, le prothorax

non rétrécé en avant et marqué de foncé, l'écusson foncé, la sculpture élytrale plus forte.

Absidia multistriata v. nov. *atricollis* (Cantharini).

Parum elongata, subnitida, griseo pubescens, nigra, capite infra oculos externe et abdomine circa testaceis; capite robusto, oculis valde prominulis; thorace subquadrato, medio impresso et bigibbuloso; elytris thorace latioribus, substriatis, et lineato granulatis. Long. 7 mill.

Indes: Darjeeling.

Distinct, à première vue, de *A. multistriata* Pic par le prothorax foncé.

Malthodes testaceohumeralis n. sp. (*Malthinini*).

Elongatus, griseo pubescens, nitidus, testaceus, capite in vertice, antennis apice, palpis, scutello et elytris piceis, his ad humeros et apicem testaceo notatis. Capite sat robusto, testaceo, in vertice piceo maculato, oculis nigris, prominulis, minute non dense punctato; antennis gracilibus et elongatis, piceis, ad basin et ad apicem breve testaceis; thorace testaceo, breve et lato, marginato, medio sulcato, minute sat dense punctato; scutello piceo; elytris bicoloratis, thorace paulo latioribus, parum brevibus, subparallelis, apice subrotundatis et breve dehiscentibus, minute et dense punctatis; infra corpore testaceo, abdomine longe prominulo, pygidio lato, apice valde emarginato, externe subangulato; pedibus testaceis, gracilibus. Long. 4 mill. environ.

Pérou: Vilcanota.

Espèce très tranchée par sa particulière coloration élytrale; diffère de *M. peruvianus* Pic, par le prothorax dépourvu de bande discale, les élytres à macule humérale testacée, le pygidium testacé, autrement conformé.

Malthodes niponicus v. nov. *formosanus* (*Malthinini*).

Parum elongatus, nitidus, piceus, capite rufo, articulis 2° basalibus antennarum pedibusque pro majore parte testaceis. Capite thorace non latiore, oculis nigris, prominulis; antennis gracilibus, sat brevibus; thorace breve et lato, medio longe excavato; elytris brevibus, valde dehiscentibus, irregulariter punctatis, costa humeralis distincta. Long. 3 mill. environ.

Formose: Anping (H. Sauter).

Diffère au moins de *M. niponicus* Ksw. par la tête plus claire, le prothorax creusé au milieu.

Malthodes testaceoprolongatus n. sp. (*Malthinini*).

Parum elongatus, nitidus, testaceus, antennis apice et infra corpore nigris, elytris piceis externe, apice exoepto, testaceo marginatis et ad humeros testaceo notatis. Capite testaceo, thorace non latiore, oculis nigris, prominulis; antennis robustis, brevibus, ad basin testaceis, articulis 5 et sequentibus nigris; thorace testaceo, breve et lato, marginato, antice lateraliter paulo angulato; elytris bicoloratis, parum elongatis, apice

subrotundatis et paulo dehiscentibus, diverse, intus et ad apicem fortiore, punctatis, in disco incostatis, ad suturam et lateraliter postice plicatis; pedibus testaceis, femoribus posticis pro parte brunneis. Long. 3 mill. environ.

Tjibodas (Java occ.).

Ressemble à *M. testaceobasalis* Pic, en diffère par les antennes à quatre premiers articles testacés, le prothorax moins robuste, la macule humérale testacée se prolongeant en arrière sous forme de bande.

Malthodes costatipennis n. sp. (*Malthinini*).

Parum elongatus, nitidus, nigro-piceus, pro parte rufescens, antennis ad basin infra pedibusque pro parte testaceis, segmentibus abdominis pro parte testaceo marginatis. Capite rufescente, thorace non latiore, oculis nigris, prominulis; antennis pro majore parte nigro-piceis, sat brevibus et gracilibus; thorace nigro-piceo, breve sat lato, lateraliter antice valde tuberculato, supra inaequale; scutello nigro piceo; elytris pro parte piceis, pro parte rufo-brunneis, sat elongatis, apice subrotundatis et paulo dehiscentibus, fortiter et inaequale punctatis, in disco antice costatis, ad suturam et lateraliter postice plicatis; pedibus brunneis et testaceis. Long. 2,5 mill. environ.

Tjibodas (Java occ.).

Diffère du précédent, en outre de la coloration plus foncée, par le prothorax nettement tuberculé sur les côtés, les élytres avec une côté discale.

Ichthyurus Sauteri n. sp. (*Malthinini*).

Angustatus, parum nitidus, pro parte flavus, pro parte niger, aut diverse brunnescens (ex. decoloratis). Capite antice et ad oculos flavo, postice nigro aut brunnescente, medio vertice paulo excavato; antennis nigris aut brunneis, ad basin infra flavis; thorace breve, sat lato, antice arcuato, nigro aut brunneo, lateraliter flavo; scutello flavo; elytris brevibus, sat longe dehiscentibus, apice subrotundatis, granulosus, his nigris aut brunneo-testaceis, infra humeros flavo notatis, ad suturam diverse et apice flavo marginatis; pedibus simplicibus, nigris aut brunneis, femoribus ad basin late flavis; infra corpore nigro aut brunneo, abdomine flavo marginato, pygidio nigrò aut brunneo, sat angustato, apice fortiter inciso. Long. 8-9 mill.

Formose: Maruyama (H. Sauter).

Très voisin de *Fruhstorferi* Gestro, en diffère par la coloration claire remontant sur les côtes internes des yeux, les élytres plus étroitement marquées de flave au sommet et ornés d'une macule supplémentaire infrahumérale claire.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1937

Band/Volume: [33](#)

Autor(en)/Author(s): Pic Maurice

Artikel/Article: [Nova Coleoptera Malacodermata. 58-65](#)