

## Eine neue *Acalles*-Art von den Kanaren.

Von Dr. D. L. Uyttenboogaart, Heemstede.

*Acalles zumpti* nov. sp. *A. wollastoni* Chevr. et *seticolis* Woll. proxime agnatus, eis compar ovato-oblongus, angustulus, ample major quam *seticolis*, fortasse fere aeque magnitudine quam maxima specimina *wollastonii* sed ab ea specie distinctus i. a. per fasciam conspectam et per setas longiores, ab uterque speciebus distinctus per pedes pro ratione longiores et evidenter graciliores, ab *seticolle* per pronoti et elytrorum striarum punctulationem subtiliorem, interstitiis pro ratione latioribus. Pronoti longitudo maxima dimidio minor quam elytrorum, latera rotundata, versus apicem ample quam retro coartata, prima tertia pars impressa. Elytra humeris conspicuis, retro aliquo dilatata deinde rotundate, in ultima tertia parte amplius, quasi acute, coartata. Rostrum planatum vix tenuissime punctatum, nitidum suffusum; antennae, tibiae, tarsisque rufescentes, femora suffusca. Prothorax squamis rotundatis albidis dense tectus, setis squamiformibus longiusculis, duabus seriebus transversis in fronte, ad latera anguste in disco parce, ornatus, contra scutellum cum obscuram maculam incertam. Elytra in disco squamis rotundatis albidis suffuscis variatis, praeter latera dominante suffuscis, tecta, fere in medio fascia lata fusca transversa versus latera obliqua suffusa, retro fascia angustiori albida versus latera obsoleta, ornata, versus apicem squamis albidis suffuscis variatis tecta, interstitiis in una serie setis erectis squamiformibus fuscis albidisque retro directis, ornatis. Pars inferior squamis albidis dense tecta. Habitat in Tenerife, Agua mansa, I. V. 1927. Illustrissimo Curculionidarum perito Doctori F. Zumpt reverenter dedicatus.

Eine sehr auffällige Art, die durch die schmale Gestalt mit *wollastoni* Chevr. und *seticolis* Woll. eine natürliche Gruppe bildet, sich aber nach meiner Überzeugung von beiden Arten<sup>1)</sup> durch viel ansehnlichere Größe, die relativ viel längeren und besonders schwächtigen Beine unterscheidet. Von *wollastoni* ist sie außerdem noch durch die deutliche Zeichnung unterschieden, indem eine breite braune Binde und hinter ihr eine schmale weiße deutlich sichtbar sind. Von *seticolis* unterscheidet sie sich durch die feinere Punktur des Halsschildes. Im übrigen verweise ich auf die lateinische Diagnose. Das einzige Exemplar befindet sich in meiner Sammlung.

<sup>1)</sup> Ich halte die Längenangabe bei *wollastoni* mit lin.  $1\frac{7}{8}$  (Insecta Maderensia p. 342) für einen Druck- oder Schreibfehler, den Wollaston auch bei der Verfassung seines Catalogue of Madeiran Coleoptera übersehen hat. Die Angabe stimmt nämlich gar nicht mit dem Satz zwischen Klammern in der Beschreibung: „the smallest, so far as I have hitherto observed of the whole Madeiran Curculionidae“. Stücke über 2 mm sind in seiner Sammlung nicht anwesend.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1938

Band/Volume: [35](#)

Autor(en)/Author(s): Uyttenboogaart D.L.

Artikel/Article: [Eine neue Acalles-Art von den Kanaren. 209](#)