

Herr Franke verlegte sich hauptsächlich auf das Sieben. Untersuchte aber auch an Ort und Stelle morsche Lagerhölzer und sammelte unter Moos und Rinde verschiedener stehender Baumarten.

Auf letztere Weise ergab Ahorn die besten Ausbeuten, während faules Holz dieses Baumes am wenigsten geboten hat, dafür ist es entgegengesetzt bei allen anderen Baumarten der Fall gewesen. Außerdem siebte er auch tiefe Laublagen, die Erde unter den Lagerhölzern und Moos. Herr Franke behauptet, daß trotz größerer Kälte die Käfer im Holze bei ihrer Ueberraschung ganz links waren und nur die, welche der Schneeschicht etwas zu nahe gelegen sind, waren starr und tauten erst in der Stubenwärme auf.

Von den gesammelten Koleopteren führe ich hier, systematisch geordnet, nur die interessanteren oder selteneren Arten auf<sup>1)</sup>:

*Cicindela germanica* 1 St. aus dem Laube, *Leistus ferrugineus* 1 St., *Bembidion nitidulum* 1 St., *Trechus* v. *cardioiderus* i. A., *Panagaeus bipustulatus* 1 St., *Ophonus* v. *Sturmi* 1 St., *Anisodactylus nemorivagus* 2 St., *Amara aulica* 2 St., *Stomis punicatus* 1 St., *Abax carinatus* 2 St., *Pocillus v. affinis* 2 St., *Platyderus dalmatinus* 1 St., *Agonum scrobiculatum* i. A., *antennarium* i. A., *Metabletus obscuroguttatus* 2 St., *Microlestes minutulus* 3 St., *Dromius agilis* und *4-maculatus* i. großer A. an stehenden Ahornbäumen unter Moos, *Drypta dentata* i. A., *Rhysodes sulcatus* i. A. m. B., *Germari* i. A. m. B., *Siagonium humerale* u. B.-R. i. A., *Phyllodrepa melanocephala* u. B.-R. i. A., v. *nigra* 1 St., *Phyllodrepoidea crenata* 7 St., *Astenus immaculatus* 3 St., *Paederus Baudii* i. A., *Medon brunneum* 2 St., *Xantholinus glaber* 1 St., v. *angularis* 2 St., *decorus* 2 St., *Gawropterus fulgidus* 1 St., *Philonthus umbratilis* 1 St., *Staphylinus chloropterus* 1 St., *Quedius scitus* 4 St., *picipes* 1 St., *semiaeneus* 1 St., *rufipes* 3 St., v. *brevipennis* 2 St., *Acylophorus glaberrimus* 1 St., *Bolitobius 3-maculatus* 2 St., v. *Kraatzi* 2 St., *Conosoma bipustulata* 2 St., *Bolitochara obliqua* 2 St., *Scydmaenus tarsatus* 1 St., *Mastigus dalmatinus* i. A., *Bathyscia montana* 1 St., *Leptinus testaceus* in Mauselöchern 10 St., *Opilo mollis* i. A. u. A.-R., *Ostoma grossum* 2 St. u. R., *Ipidia 4-maculata* 3 St. u. R., *Cucujus cinnabarinus* über 60 St. unter Ahorn- und Espenrinde, die meisten im Januar, an einem sonnigen Februartag 2 St. angefliegen, *Pediacus dermestoides* i. A., *Mycetophagus a. antemacularis* 2 St., v. *erythrocephalus* 1 St., *Colydium elongatum* 2 St., *Cicones undatus* i. A. u. R., *Pycnomerus terebrans* 1 St., *Anommatus Schrötteri* 1 St. u. L., *Globicornis corticalis* 14 St., *Adelocera punctata* i. E., *forticornis* i. A. B. u. E., *elegantulus* i. A. i. m. E., *Rhinosimus ruficollis* i. A. u. A.-R., *planirostris* i. A. u. A.-R., *Macratia hungarica* i. A., *Notoxus miles* i. A., *Orchesia luteipalpis* i. A. i. M., *Boleophagus reticulatus* i. A., *Scaphidema metallicum* 1 St. u. R., *Melasia culinaris* u. *Perroudi* i. A. m. E. B., *Laena Hopffgarteni* i. A. M., *Anoplopus velikensis* i. A. (überall), *Spermophagus variolosopunctatus* 5 St., *Aparopion costatum* i. A. u. A.-R., *Acalles denticollis* u. *hypocryta* i. A. u. m. R., *Aesalus scarabaeoides* 4 St. i. m. E.

Proßnitz (Mähren).

V. Zoufal, k. k. Professor i. R.

## C. Nonnullorum Europae Coleopterorum patriae novae<sup>2)</sup>.

III<sup>3)</sup>.

*Carabus violaceus* L. v. *crenatus* Sturm. — C.: Ga. G. — P. n.: Hi.

*C. violaceus* L. v. *Wolffi* Dej. — C.: Hu. m. or. Rum. — P. n.: Tatra (Zakopane).

*Amara Quenseli* Schönh. — C.: E. b. Alp. S. Balc. — P. n.: Boh.

<sup>1)</sup> Abkürzungen: i. A. = in Anzahl; m. B. = morsches Buchenholz; u. B.-R = unter Buchenrinde; M. = Moos; A. = Ahorn; L. = Laub; E. = Eiche.

<sup>2)</sup> Species, quarum patriae novae in scriptis aliis, post annum 1906 publicatis, indicatae sunt, in his additionibus non reperiuntur.

<sup>3)</sup> Pars I. in Ent. Bl., 1910, 108—110; pars II. in Ent. Bl., 1911, 236—238.

- Cymindis axillaris* F. v. *palliat*a Fisch. — C.: R. m. Hu. Gr. — P. n.: Ca. b.
- Phyllocladepa translucida* Kr. — C.: G. — P. n.: Boh. R. (Moskva).  
*Trogophloeus distinctus* Fairm. — C.: Alp. Ga. m. I. — P. n.: Bos. et Serb. (Klima, Mongr. in M. K. Z. II.).
- Platystethus brevipennis* Baudi. — C.: S. — P. n.: R. (Kijev).  
*P. rufospinus* Hochh. — C.: Ca. Gr. S. (Rum.). — P. n.: R. (Oděsa).  
*Stenus subaeneus* Er. — C.: E. md. m. — P. n.: Ca. occ.  
*Euaesthetus fulvus* Motsch. — C.: Ca. — P. n.: R. m. (Twer).  
*Philonthus dimidiatus* Sahlb. a. *apicalis* Leinberg. — C.: F. — P. n.: R. (Oděsa).
- Atheta nigriventris* Thoms. — C.: A. Su. (Boh.). — P. n.: R. (Kijev).  
*A. hygrotopora* Kr. — C.: E. mont. — P. n.: Ca. occ.  
*Euryminiua crassa* Ep. — C.: G. Hu. Tr. — P. n.: Bos.  
*Euptectus carpathicus* Rtt. — C.: Tr. Sil. (Boh.). — P. n.: R. (Kijev).  
*Cephenium fossulatum* Lok. Č. Č. S. E. 1904, 40 de Carniolia in C. patria „Bohemia“ affectus est.
- Cantharis Erichsoni* Bach. — C.: Ga. G. — P. n.: Boh. Sil.  
*C. albomarginata* Märkl. — C.: Alp. — P. n.: In Bohemia frequens.  
*C. pellucida* F. v. *Rauterbergi* Rtt. — C.: Oldbg. — P. n.: E. med. tota.  
*C. figurata* Mannh. v. *luteola* Schil. — C.: Sil. — P. n.: Boh.  
*C. pallida* Goeze. — C.: G. — P. n.: Boh. Ga.  
*C. lateralis* L. — C.: Br. Ga. G. — P. n.: Boh., frequens.  
*C. discoidea* Ahr. — C.: G. Ga. Gr. — P. n.: Boh.  
*C. rufimana* Mén. — C.: Gr. R. — P. n.: Ca.  
*Rhagonycha signata* Germ. — *typus*. — C.: Ill. G. — P. n.: Boh. (Klet.).  
*R. translucida* Kryn. — C.: Ga. G. — P. n.: Boh. (Křivoklát).  
*R. lutea* Müll. — C.: G. Ga. Su. — P. n.: Boh.  
*R. lutea* Müll. a. *Mirkeli* Kiesw. — C.: G. — P. n.: Boh., abundans, typo frequentior.
- R. chlorotica* Gené. — C.: C. S. — P. n.: I.  
*R. viduata* Küst. — C.: D. Gr. — P. n.: Herceg.  
*Drilus concolor* Ahr. — C.: G. Su. Ga. — P. n.: Boh.  
*(Charops flavipes* Payk. — In „Catalogo“ deest synonymum *plumbeomicans* Goeze.)
- Hypebaeus flavipes* F. — C.: Ga. G. R. — P. n.: Ti. (Prutz). Carn. (Pokljuka.) Hu.
- Ebaeus appendiculatus* Er. — C.: A. E. — A. (= Austria) in E. (= Europa) reperitur.
- E. flavicornis* Er. — C.: G. R. — P. n.: Boh. Ti. Carn.  
*Abrinus limbatus* F. — *typus*. — C.: Ga. m. — P. n.: Hi.  
*Malachius affinis* Mént. — C.: R. m. II. — P. n.: Herceg.  
*Divales 4-pustulatus* F. — C.: I. Ga. — P. n.: C.  
*Haploenemus venustus* Schil. — C.: Circass. — P. n.: Ca. b.  
*Denops albofasciata* Charp. — C.: Ga. m. G. E. m. Tr. R. — P. n.: Ca. b.  
*Epuraca castanea* Duft. — C.: A. — Ganglb., K. E. III. 1899: Hu. St. Bos. Serb. F.
- Setaria scricca* Muls. — C.: C. Ga. m. — P. n.: Cephal.  
*Micrambe Perrisi* Bris. v. *umbripennis* Reitt. — C.: C. — P. n.: Ti.  
*Adonia variegata* Goeze v. *corsica* Reiche. — C.: E. m. Transs. — P. n.: R.  
*Coccinella conglobata* L. a. *variegata* J. Müll. — C.: D. — P. n.: Ga.  
*Bulaca Lichatschowi* Humm. — C.: R. — P. n.: Ist. (Grado.) Bulg.  
*Elater ferrugatus* Lac. a. *adumbratus* Buyss. — C.: Ga. — P. n.: Boh. Bos.  
*Anthaxia bicolor* Fald. — C.: Ca. R. m. — P. n.: Gr. Bulg.  
*A. vitidula* L. a. *signaticollis* Kryn — C.: Hu. T. — P. n.: R. med. Cri. Ca.  
*Aphanisticus pygmaeus* Luc. — C.: Hi. Ga. m. — P. n.: Gr. I. Si.

*Hedobia pubescens* Oliv. — C.: Ga. G. — P. n.: H. (Königl. Zool. Mus. Berlin.).

*Lasioderma Redtenbacheri* Bach. — C.: G. R. m. A. Ga. Ca. — P. n.: Si.

*Oedemera similis* Schmidt. — C.: Rumelia. — P. n.: Ganglbauer: „Best. Tab.“ I.: Gr. Ca. T. — R. m.

*Rhinosimus viridipennis* Latr. — C.: Br. Ga. I. G. — P. n.: Halicia. Bos. (Sarajevo, Vouásek leg.).

*Mordella perlata* Sulcer — *typus*. — C.: G. H. I. — P. n.: Bos. Sil.

*Mordellistena Milleri* Emery. — C.: Hu. — P. n.: Ca. or.

*Anaspis frontalis* L. a. *maculicollis* Motsch. — C.: R. — P. n.: D. (Ereeg novi).

*A. latipalpis* Schil. — C.: Rhenan. Frkft. — P. n.: A. i.

*A. Geoffroyi* Müll. a. *bipunctata* Rag. — C.: Si. — P. n.: Elba.

*A. labiata* Costa. — C.: Ga. Hi. I. S. — P. n.: D.

*Hymenalia graeca* Seidl. — C.: Gr. D. F. — P. n.: Herceg. (Mostarsko blato, 1 ♂).

*Gonodera ceramboides* L. v. *serrata* Chevr. — C.: G. Hu. — P. n.: Bos.

*G. subaenea* Küst. — C.: Gr. — P. n.: Herceg. (Glamoš, Vouásek leg.).

*Alphitobius testudineus* Pillier. — C.: E. m. — P. n.: Ca. b.

*Leptura dubia* Scop. a. *trianguliferum* Rtt. — C.: Capella. Ca. — P. n.: Bos. (Sarajevo, Vouásek leg.).

*L. 6-maculata* L. — C.: E. b. Alp. — P. n.: Boh. (Šumava, Děčín [Tetschen]).

*Rosalia alpina* L. a. *parvonotata* Rtt. — C.: Hu. — P. n.: Bos. (Vouásek leg.).

*R. alpina* L. a. *obliterata* Ph. Pic. — C.: Carn. Hu. — P. n.: Bos. (Vouásek leg.).

*Aromia moschata* L. a. *cuprata* Rtt. — C.: Bulg. U. (Mor. Boh.). — P. n.: Bos.

*Crioceris 5-punctata* Scop. — C.: G. R. — P. n.: Mor.

*Tituboea 6-maculata* F. — C.: Ga. m. Hi. m. — P. n.: Ca. b.

*Cryptocephalus laevicollis* Gebl. v. *viennensis* Ws. — C.: A. — P. n.: Mehadia. Ca. occ.

*C. pallifrons* Gyll. — C.: Ga. md. G. F. — P. n.: R. med. occ.

*C. 4-guttatus* Richter — *typus*. — C.: G. A. Hu. — P. n.: Ca. or.

*C. pygmaeus* F. — C.: S. Ga. — P. n.: Si.

*Eupales ulema* Germ. — C.: Hu. T. Gr. — P. n.: Bos. Herceg. Slav.

*Chrysomela lepida* Oliv. — C.: Ga. Hi. — P. n.: C.

*Podagrica Menetriesi* Fald. — C.: Ca. — P. n.: Slav.: Mitrovica (Heikertinger det.).

*Chaetocnema compressa* Letzn. — C.: G. A. Gr. R. m. — P. n.: Rumania.

*Psylliodes fusiformis* Illig. — C.: Ga. G. A. — P. n.: S. (Heikertinger det.).

*Thyamis Linnaei* Duft. v. *scrutator* Wse. — C.: Arax. — P. n.: S.

(Oristano).

*Phyllobius montanus* Mill. — C.: Gr. Ist. — P. n.: Herceg.

*Mesagroicus pilifer* Boh. — C.: Ca. occ. — P. n.: Cri.

*Sitona suturalis* Steph. — C.: E. — P. n.: Ca. occ.

*Brachycerus Pradei* Fairm. — C.: Ga. occ. Hi. — P. n.: S.

*Tropiphorus micans* Boh. v. *obesus* Fauv. — C.: Ill. Tr. R. m. — P. n.: R. med. occ. (Kijev).

*Aparopion costatum* Fahrs. — C.: A. G. Hu. Ga. mont. I. C. — P. n.: Ca. occ.

*Baris carbonaria* Boh. — C.: Tr. R. m. — P. n.: Ca. occ.

*Tychius genistae* Boh. — C.: Hi. — P. n.: R. med. occ. (Kyjev).

? *Orchestes subfasciatus* Gyll. — C.: R. m. Bos. — P. n.: „G.“ (Staudinger: „Coleopterenliste“ 1909).

*Gymnetron amictum* Germ. — C.: And. I. Gr. Ca. — P. n.: R. m.

*Miarus campanulae* L. v. *ursinus* Ab. — C.: G. Ill. Ist. — P. n.: Ca. occ.

*Rhynchites versicolor* Costa. — C.: I. Ga. Gr. T. R. m. Ca. — Europa mer. tota.

*Cryphalus Rybinskii* Reitt. — C.: Halic. Mor. — P. n.: Pol., Warszawa.

*Aphodius putridus* Herbst. v. *uliginosus* Hardy. — C.: Br. — P. n.: R., Jaroslav.

*Heptaulacus porcellus* Friv. — C.: A. Hu. — P. n.: Bos.

Fere omnia exemplaria reproducta auctoris collectio continet.

Příbram (Bohemia).

J. Roubal.

### D. *Bembidium nigricorne* Gyll. in der Senne.

Die Bestätigung der Annahme R. Heinemanns über das Vorkommen des *Bembidium nigricorne* Gyll. (Ent. Bl., VII. Jahrg., p. 18 u. VIII. Jahrg., p. 281) kann ich für die Senne bringen. Ich fing *Bembidium nigricorne* dort zuerst am 13. Juni 1913 in einem ♀ Exemplar beim Kreuzkrug (nördlich von Lippspringe). Am 10. Juli regnete es andauernd in kurzen Schauern, ich fand an diesem Tage das Tier ebendort in großer Anzahl, es lief auf abgeplagten Stellen frei herum. Später habe ich es auch in der Stagelager Senne in Menge gefunden, und zwar unter abgeschnittenem Heidekraut, das zum Trocknen aufgestapelt war, mit *Amara famelica* Zimmerm., *lunicollis* Schiödt., *Bradycellus similis* Dej., *collaris* Payk., *Calathus micropterus* und vielen anderen Läufern.

Blomberg i. L.

Dr. Koester.

### Referate und Rezensionen.

Die Herren Autoren von selbständig oder in Zeitschriften erscheinenden **coleopterologischen** Publikationen werden um gefl. Einsendung von Rezensionsexemplaren od. Sonderabdrücken gebeten. Selbstreferate der Herren Forstentomologen sind besonders erwünscht.

R. H. Francé, Wert und Unwert der Naturwissenschaft. (Probleme unserer Zeit, Beiträge zur Geschichte der Gegenwart. Herausgegeben von F. W. Schroeter. Nr. 6. München-Leipzig. Hans-Sachs-Verlag.)

Der Verfasser hat in diesem Hefte eine Rede erweitert und ausgearbeitet, welche er auf der ersten Jahresversammlung der Deutschen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft im Jahre 1912 in Leipzig gehalten hat. Im 1. Kapitel: „Das Versagen der Naturwissenschaft als Kulturfaktor“, weist er nach, daß, entgegen einer herrschenden Tagesmeinung, die Bildung unserer Zeit von Naturwissenschaft wenig beeinflußt ist. Unsere Schulbildung ist nur dem Anschein nach naturwissenschaftlich, in Wirklichkeit ist sie nach den Grundsätzen der Staatsraison, also nach konservativen Prinzipien, eingerichtet. Sie trägt in der Religionsstunde eine Welt schöpfungsgeschichte vor, die im naturgeschichtlichen Unterricht auch gegen den Willen des Lehrers sich von selbst widerlegen muß. Der biologische Unterricht ist erst vor kurzem allgemein eingeführt worden. Die ganze, jetzt wirkende und herrschende, Generation ist der Naturwissenschaft fast fremd geblieben. Dies zeigt sich auch darin, daß im politischen Leben fast jede Spur einer Anerkennung des Entwicklungsgesetzes fehlt, ebenso wie in der Psychologie und Ethik. Man verweigert einerseits die Anerkennung der Forderung der Weiterentwicklung staatlicher Verhältnisse, andererseits aber ebenso die Anerkennung der historischen Grundlage alles Bestehenden, während doch beides durch die Entwicklungslehre gefordert wird.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Roubal Jan, Köster [Koester] Wilhelm

Artikel/Article: [Kleinere Mitteilungen. \(C+D\) 257-260](#)