

Von Dr. Antonio d'Amore Fracassi in Anzahl eingesendet. „Abruzzi: M. S. Pietro. VII. 98.“ Ich widme diese Art meinem Freunde und Kollegen Sigm. Schenkling. Die v. *Fracassii* mh. (cf. Entom. Nachr. 1900. No. 5) mit mehr oder weniger gelbfleckten Flügeldecken gehört nicht zur *T. violaceonigra* Deg., sondern zur *T. Schenklingi* mh.

* * *

Berichtigung.

Im Artikel „Beitrag zur Coleopteren - Fauna Unter-Frankens“ (Entom. Nachr. 1900. No. 6) ist das über *Axinotarsus* Gesagte zu streichen. Statt Groningen lies Kronungen.

Wll. Meier.

Carabologische Notizen VII

von Dr. Roeschke - Berlin.

Coptolabrus Fruhlstorferi nov. sp.

Damast. rugipennis variationi cum capite thoraceque rubicundo primo intuitu simillimus sed characteribus subgeneris Coptolabri insignis; capite thoraceque rubroaureis, elytrorum nigrorum margine subviridi-aureo, elytris elongatis mucronatis tuberculis plus minusve oblongis tribus primariis, quatuor tenuioribus secundariis, tertiaris perparum conspicuis praeditis.

♂: 35 mm. thor. $6\frac{1}{2}$: $6\frac{1}{4}$ (lat.). el. 21: $10\frac{1}{2}$ mm.

♀: 38 mm. thor. 7: $6\frac{1}{2}$ (lat.) el. 24: 12 mm.

Caput undique fortiter rugoso-punctatum, porrectum, mandibulis longis, mento abbreviato squamam palpigeram non plane obtegente, dente medio brevi, gula setis carente, palpis labialibus bisetosis, maxillaribus maris multo plus quam feminae securiformibus, antennis longis simplicibus, scapo setoso, articulo quarto secundo paulo longiore.

Thorax latitudine paulo longior, inprimis in ♀, basi bisinuata latior quam apice vix exciso, supra perparum convexus, undique sat fortiter punctato-rugosus sulco longitudinali tenui; margine antico tenuiter calloso et inciso, laterali usque ad summam in medio latitudinem fere recto pone illam manifeste sinuato-angustato, postice paulo plus quam antice reflexo neque explanato, lobis posticis brevibus rotundatis parum productis extrorsumque divergentibus.

Setae duae laterales adsunt, altera in medio altera ante angulum posticum — quarum tamen illam in medio fixam in exemplari meo feminali unacum fossula utriusque lateris detegere non possum. Prothoracis episternum rubroaureum dense scrobiculatum, prosterni subcoerulei medium sparsim modo punctatum, fere laeve, latera transverse sulcata, processus determinate et partim purpureo-violaceo marginatus.

Elytra nigra, opaca, modice convexa, elongata, humeris prominulis rotundatis, ad summam latitudinem pone medium paulatim ampliata, dein attenuata et ante mucrones sat prominentes parumque divergentes sinuata, margine usque ad sinum apicalem anguste explanato-reflexo, viridi-aureo, basi circum scutellum suturaeque parte anteriore tenuissime rubro-cupreis. Sculptura composita est e tribus seriebus primariis oblongorum tuberculorum plus minusve elongatorum quae fossulis non profundis sejuncta tamen hic illic tenuibus costulis confluunt; item formatae sunt series secundariae paulo tenuiores et tertiaiae paene disparentes, interstitiis subtiliter satisque confertim granuloso-asperatis vel minute aciculatim tuberculatis. Metathoracis episterna latitudine multo longiora lateraque abdominis strigis ventralibus acutis et punctis ordinariis — uno in utroque latere — praediti crasse rugoso-punctata. Metacoxae seta anteriore carent. Subtus lateribus partim virescens vel coerulescens vel violescens.

Pedes elongati graciles. ♂ tarsis tribus anticis dilatatis subtusque spongiosis.

6 exemplaria huius pulcherrimae speciei ab excellente collectore Fruhstorfero mensibus Septembri et Octobri in japonica insula Tsushima prope Korean sita capta et in illius honorem nominata sunt.

Ueber einige Arten der Dynastidengattung *Heteronychus*.

Von Prof. H. Kolbe.

I.

Die meisten Arten der Gattung *Heteronychus* bewohnen das afrikanische, nur wenige das indische Gebiet. Sie sind alle ziemlich klein (7—23 mm lang), einige gehören zu den kleinsten Formen der Familie überhaupt. Die Gattung ist nahe verwandt mit *Ligyrus* und *Chalepus* Amerikas und mit *Pentodon* der östlichen Hemisphäre.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1900

Band/Volume: [26](#)

Autor(en)/Author(s): Roeschke H.

Artikel/Article: [Carabologische Notizen VII. 162-163](#)