

ENTOMOLOGISCHE ZEITSCHRIFT.

Central-Organ des
Entomologischen

Internationalen
Vereins.

Herausgegeben unter Mitwirkung hervorragender Entomologen und Naturforscher.

Die Entomologische Zeitschrift erscheint wöchentlich einmal. Insertionspreis pro dreigespaltene Petit-Zeile oder deren Raum 20 Pfg. — Mitglieder haben in entomologischen Angelegenheiten in jedem Vereinsjahre 100 Zeilen Inserate frei.

Inhalt: Ergebnis des Nachtfanges im Jahre 1907. — Literatur. — Angelegenheiten des I. E. V. — Inserate.

Ergebnis des Nachtfanges im Jahre 1907.

Auszug aus meinem entomologischen Tagebuche.

Von Fritz Hoffmann, Krieglachs (Steiermark).

(Schluss.)

	Köder	Licht
	Datum	Datum
Platenis subtusa F.		25/8
Orthosia lota Cl	21/9	
„ circellaris Hufn.	6—17/9	gemein
„ do. ab. ferruginea Hb.	11/9	
„ helvola L.	30/8—15/9	
„ nitida F.	19/8—11/9	häufig
„ litura L.	19/8—7/10	häufig
Xanthia fulvago L.	19/8—11/9	
Orrhodia vaccinii L.	9/5—22/5	häufig
„ rubiginea F.	21/9—7/10	
Scopelosoma satellitia L.	18/4—31/5	häufig
„ do. ab. brunnea Lampa	12/4—13/5 25/9	häufig
Xylina socia Rott.	12—23/4 21—24/9	häufig
„ fureifera Hufn.	12/4—22/5 11—24/9	häufig
„ ingrica H.-S.	3/5, 10/9	häufig
„ ornithopus Rott.	12/4—8/6	häufig
Calocampa vetusta Hbn.	12/4—1/5 18/4—13/4	
„ exoleta L.	21/9	
Xylomiges conspicularis L.	8/4—6/5	
„ ab. melaleuca View } ab. melaleuca View }	22/5	
Calophasia lunula ²⁾ Hufn.		15/6
Cueullia asteris Schiff.		13/6
„ umbratica L.		8/7
Heliolithis armigera Hb.	11/9	
Pyrrhia umbra Hufn.	26/6—4/7	13/6—11/7
„ do. ab. juncta Tutt.		14/6
Erastria deceptorica Sc.		14/6, ⁴⁾ 29/8
Rivula sericealis Sc.		häufig
Scoliopteryx libatrix L.	²⁾ 23/4 . . . 29/7, 7/10	häufig
Abrostola tripartita Hufn.		4/7
Plusia moneta F.		3/10
„ chrysis L.		4—7/7
„ do. ab. juncta Tutt.	16/6	13/6—26/8 häufig
„ chryson Esp.		28/7
Plusia bractea F.		7/7—8/8
„ pulchrina Hw.		30/6
„ ain Hoehenw.		8/7
Catocala fraxini L.	17—21/9	
„ electa Bkh.	19/8	
„ nupta L.	30/8—21/9	
Toxocampa viciae Hb.	11/6—2/7	11/6—8/7 häufig
Laspeyria flexula Schiff.	23/7	
Zanclognatha tarsipennalis Tr.	29/7	
„ tarsierinalis Knoch.	26/6	11—30/6

	Köder	Licht
	Datum	Datum
Madopa salicalis Schiff.		11—14/6
Hermia tentacularia L.		6/7
Bomolocha fontis Thub.	29/7	
Hypena proboscidalis L.	22/7	30/6
Habrosyne derasa L.	13/6—20/7	
Thyatira batis L.	3/6—4/7 ¹⁾ 6/9	13/6
Cymatophora or F.	1—13/6	6/6—4/7 gemein
„ fluctuosa Hb.		8/7
„ duplaris L.	22—29/7	15/6
Geometra papilionaria L.		8/8
„ vernaria Hb.		30/6
Acidalia aversata L. ab. spoli- ata Stg.	22, 23/7	8/7
„ incanata L.		13/6—13/8
„ punctata Sc.		1/7
„ ornata Sc.		11—15/6
Ortholita cervinata Schiff.		3—11/10
„ limitata Sc. ³⁾	26/5	15/6—8/7, 17/9
„ moeniata Sc.		28/8
„ bipunctaria Schiff.		2/8
Minoa murinata Sc.		14/6
Oedezia atrata L.		18—20/6 häufig
Anaitis praeformata Hb.		21/6... 20/8 häufig
Triphosa dubitata L.		30/6
Eucosmia certata Hb.	3—23/	gemein
Lygris prunata L.		30/6—8/8
„ populata L.	20/7—15/9	19/6—28/8
Larentia dotata L.	22/8	1... i0/7
„ fulvata Forst.		10/7—8/8
„ ocellata L.		15/6... 2/8 häufig
„ immanata Hw.	14/9	28/8... 5/10
„ aptata Hb.		30/6... 17/7
„ olivata Bkh.		19/7
„ viridaria F.		11—15/6
„ turbata Hb.		6—14/6
„ vespertaria Bkh.	3/9	28/8
„ montanata Schiff.		13/6—11/7
„ quadrifasciaria Cl.		30/6
„ ferrugata Cl.	15/4	6/6... 25/8 häufig
„ do. ab. spadicearia Bkh.		15/6, 8/8
„ unidentaria Hw.	26/7	
„ caesiata Lang.		19/7
„ cuculata Hufn.		13/6... 17/7
„ rivata Hb.		1/7
„ sociata Bkh.		2/8
„ albicillata L.	26/6	30/6
„ procellata F.		15/6—6/7
„ lugubrata Stgr.		8/8
„ tristata L.		6/6
„ alchemillata L.		30/6, 1/7

¹⁾ Zweite Generation.

²⁾ Alles überwinterte Exemplare.

³⁾ Hier der gemeinste Spanner.

	Köder	Licht
	Datum	Datum
<i>Larentia adaequata</i> Borkh.		30/6... 11/7, 29/8
" <i>albulata</i> Schiff.		13/6
" <i>luteata</i> Schiff.		30/6
" <i>bilineata</i> L.	19/7	häufig
" ¹⁾ <i>sordidata</i> F. ab. unofuscata Dou.		19/7
" <i>autumnalis</i> Ström.		15—30/6
" <i>capitata</i> H.-S.		13/6
" <i>siliceata</i> Hb.		13/6
" <i>berberata</i> Schiff.		14/6—8/7, 29/8
<i>Tepbrocystia pusillata</i> F.	15/4	
" <i>denotata</i> Hb.		8/8
" <i>castigata</i> Hb.		14/6
" <i>lanceata</i>	4/5	
<i>Abraxas marginata</i> L.		6—22/6
" <i>adustata</i> Schiff.		27/4—4/8
<i>Deilinia pusaria</i> L.	27/7	18/6
<i>Numeria pulveraria</i> L.		22/6
<i>Ennomos autumnaria</i> Wernb.		26/9—3/10
" <i>fuscantaria</i> Hw.		11/9—5/10 häufig
" <i>erosaria</i> Hb.		
<i>Seleuia bilunaria</i> Esp.		10/6
" <i>lunaria</i> Schiff.		13/6
<i>Himera pennaria</i> L.		7/10
<i>Crocallis elinguararia</i> L.		8/8
<i>Angerona prunaria</i> L.		30/6 ♀
" do. ab. <i>sordidata</i> Fuessl.		15/6
<i>Eurymene dolabraria</i> L.		5—15/6
<i>Opistograptis luteolata</i> L.		11/6
<i>Epione apicaria</i> Schiff.	29/8	6/7
<i>Semiothisa alternaria</i> Hb.		13—15/6
" <i>signaria</i> Hb.		30/6
" <i>liturata</i> Cl.		15/6—7/7
<i>Amphidasis betularia</i> L.		15/6
<i>Boarmia einctaria</i> Schiff.	4—30/6	häufig
" <i>secundaria</i> Esp.	3/9	8—26/8
" <i>ribeata</i> Cl.	23/7	
" <i>repandata</i> L.	21/5... 27/6	8/8—25/9 häufig
" do. ab. <i>maculata</i> Stgr.		8/8
" <i>crepuscularia</i> Hb.	9—23/5	häufig
<i>Gnophos dilucidaria</i> Hb.		13/6—4/7
<i>Thamnonoma wanaria</i> L.		30/6, 1/7
" <i>brunneata</i> Thub.		7/7
<i>Phasiana elathrata</i> L.	22/5—5/6	6—15/6 häufig
<i>Scoria lineata</i> Sc.		6—19/6 häufig
<i>Spilosoma lubricipeda</i> L.		11/6—6/7
" <i>menthastri</i> Esp.		6/6—8/7 gemein
<i>Rhyparia purpurata</i> L.		29/6—4/7
<i>Diacrisia sanio</i> L.		1/7
<i>Arctia caja</i> L.		10/7—26/8
" <i>villica</i> L.		13/6
<i>Cybosia mesomella</i> L.		10/7
<i>Gnophria rubricollis</i> L.		8/7
<i>Oeconistis quadra</i> L.		13/8—12/10
<i>Lithosia lurideola</i> Zinck.		1—8/7 häufig
" <i>complanata</i> L.		8/8
" <i>sororecula</i> Hufn.	23/5—5/6	6—10/6
" <i>cereola</i> Hb.		8/8
<i>Sterrhopterix standfussi</i> H.-S.		13/6
<i>Cossus cossus</i> L.		8/7
<i>Aphomia sociella</i> L.		8/7
<i>Crambus inquinatellus</i> Schiff.	26/8	
" <i>tristellus</i> F.		25/8
" <i>perlellus</i> Sc.		8—31/7 häufig
" <i>myellus</i> Hb.		30/6... 29/8
" <i>hortuellus</i> Hb.		6/6, 2—8/8
" <i>dumetellus</i> Hb.		30/6, 11/7
" <i>pascuellus</i> L.		11/7
<i>Hyphantidium terebrella</i> Zk.		25/8
<i>Hypochalcia achenella</i> Hb.		8/7
<i>Salebria betulae</i> Göze		1/7
" <i>obductella</i> Z.		14/6, 29/8
" <i>semirubella</i> Sc.		8/7, 8/8
<i>Diorycetria abietella</i> F.	26/8	
²⁾ <i>Myelois cribrella</i> Hb.		23/6
<i>Pyalis farinalis</i> L.		27/6
<i>Herculia glaucinalis</i> L.		17/7—25/8

¹⁾ Muss eine Lokalform (subspecies) sein, die Falter flogen in Menge nur an einem Ort, und nur die rotbraune Form unofuscata Dou. Im Staudinger-Rebel-Katalog steht: ab. (et v.?).

²⁾ Heschhütte am Hochofer, Ennstal 1650 m.

	Köder	Licht
	Datum	Datum
<i>Psammotis hyalinalis</i> Hb.		27—30/6, häufig
<i>Scoparia zelleri</i> Wek.		6/7
" <i>dubitalis</i> Hb.		11/6—1/7
<i>Sylepta ruralis</i> Sc.		8/8
<i>Nomophita noctuella</i> Schiff.		17/7, 3—7/10
<i>Phlytaenodes verticalis</i> L.		11/6
<i>Diasemia litterata</i> Sc.		6—15/6
<i>Pionea pandalis</i> Hb.		6—10/6 häufig
" <i>prunalis</i> Schiff.		1/7
" <i>stachydalis</i> Germ.		14—30/6
" <i>lutealis</i> Hb.	22/7	16—31/7
<i>Pyrausta terrealis</i> Tr.		15/6
" ¹⁾ <i>alpinalis</i> Schiff.		23/6
" <i>cespitalis</i> Schiff.		6—8/7
" <i>purpuralis</i> L.		8/8
" <i>funebri</i> Ström ab. <i>trigutta</i> Esp.		14/6
<i>Platyptilia gonodactyla</i> Schiff.		17/7—25/8
<i>Alucita tetradaactyla</i> L.		30/6
<i>Pterophorus osteodactylus</i> Z.		31/7
<i>Cacoecia piceana</i> L.	20/7	8/7
" <i>podana</i> Sc.		8, 17/7
" <i>semialbana</i> Gn.		17/7
<i>Pandemis corylana</i> F.	26/8	29/8
" <i>cinnamomeana</i> Tr.		8/8
" <i>heparana</i> Schiff.		29/8
<i>Tortrix viridana</i> L.		30/6
" <i>steimeriana</i> Hb.		13/8
<i>Cnephassa argentana</i> Cl.		15/6 häufig
<i>Euxanthus zөгana</i> L.		16/7—8/8
<i>Olethreutes salicella</i> L.		1/7
" <i>variegana</i> Hb.		30/6, 6/7
" <i>dimidiana</i> Sodof.		27—30/6
" <i>striana</i> Schiff.		8/7
" <i>rivulana</i> Sc.		31/7
<i>Semasia hypericana</i> Hb.		30/6, 6/7
<i>Notocelia roborana</i> Tr.		30/6
<i>Ypsolophus limosellus</i> Schläg.		17/7 [Raupe
<i>Pseccadia pusiella</i> Roemer		15/7 häufig als

Die Bezeichnungen »häufig« und »gemein« sind nur bei denjenigen Arten beigesetzt, für welche sie im wahren Sinne des Wortes anzuwenden sind. Die Reihenfolge und Benennung ist die des Staudinger-Rebel-Kataloges vom Jahre 1901, mit Ausnahme von *Grammesia trigrammica* Hufn. ab. *approximans* Hw. und *Plusia chrysitis* L. ab. *juncta* Tutt., welche in diesem Kataloge noch nicht enthalten sind und dem Spuler'schen Schmetterlingswerke entnommen sind.

Literatur.

A. Koch's Sammlungsverzeichnis für europäische Grossschmetterlinge ist schon wiederholt besprochen und mit Recht empfohlen worden. Aber man findet immer neue Punkte heraus, die es als nützlich erscheinen lassen. Für sehr viele Freunde der Entomologie ist das Sammeln ausschliesslich Liebhaberei und als Studium wollen und können die meisten es nicht betreiben. So kommt es, dass Futterpflanze und Verbreitungskreis immer und immer wieder vergessen werden, was niemanden öfter Verlegenheit bereitet als dem vergesslichen Sammler selbst, der stets von neuem nachschlagen muss. Durch Koch's Verzeichnis lernt man, ohne zu wollen, allerhand auswendig. Bei dem Zwang, bei jeder Eintragung die Erscheinungszeit, Futterpflanze, den Autor etc. durchlesen zu müssen, prägt sich allerhand mühelos ein, was von Nutzen ist. Der Hauptnutzen besteht natürlich darin, dass infolge der Fortführung des Verzeichnisses die Eintragungen überhaupt veranlasst werden, die bei beruflich stark occupierten Sammlern sonst oft ganz unterbleiben. — Bezüglich der verschiedenen Vorteile, die das Ver-

¹⁾ Hotel Bodenbauer am Hochschwab.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: [22](#)

Autor(en)/Author(s): Hoffmann Fritz

Artikel/Article: [Ergebnis des Nachtanges im Jahre 1907 - Schluss 25-26](#)