Bestimmungstabelle der Brenthidae.

Von R. Kleine, Stettin.

(Fortsetung.)

	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Callipareius Senna.		
1.	El. am Ab. nicht abgerundet, sondern zugespitt	
	El. gemeinsam abgerundet	
0	Rotbraun, Prot. nur am Halse u. Hntr. dunkel, lettes Ab-	
2.	dominalsegment grubig vertieft Feae Senna K., R., F. und Prot. braunschwarz bis schwarz, lettes Abdominalsegment nicht grubig vertieft, höchstens leicht punktiert (3) oder glatt (2) foveatus Senna	
Orthopareía Kln.		
	Nur eine Art idonea Kln.	
	Asaphepterum Kln.*)	
	Nur eine Art formosanum Kln.	
Sebasius Lacord.		
1.	Prot. unpunktiert	
2.	Prot. bis dicht am Halse gefurcht u. durch eine Querfurche abgeschlossen, El. schwarzbraun	
	Stilbonotus Kln.	
	Nur eine Art Strohmeyeri Kln.	
	Podozemius Kolbe	
1.	Prot. tief u. durchgehend gefurcht Conradti Kolbe Prot. zart u. nur im Basalteil gefurcht mustus Kolbe	
	Caenosebus Kln.	
	Nur eine Art fraudator Kln.	
Microsebus Kolbe		
1.	Vdschk. gezähnt dentipes Kln. Alle Schk. ungezähnt	
	Alle Schk. ungezähnt	
2.	Grundfarbe schwarz oder schwarzbraun	
3.	Unters. des ganzen Körpers u. die B. rotbraun, afrikanische	
	Art	

^{*)} Die Gattung ist mit **Callipareius** nicht zu identifizieren, wie Calabresi meint: die Rippenbildung ist bei beiden Gattungen ganz verschieden.

4.	El. mit schwarzen Makeln Loríae Senna El. ohne Makeln	
5.	El. ohne Makeln	
	Kl. zarte Arten von rotbrauner oder kastanienbrauner	
6.	Farbe	
	Metat. grubig vertieft oder gefurcht	
	2. Ri. nicht erhaben, breit	
8.	Prot. tief u. breit gefurcht, Furche gegen den Hals erweitert	
	Prot. norm. gefurcht	
9.	Beborstung des ganzen Tieres schwach compressithorax Senna Beborstung sehr stark u. dicht setosellus Kolbe	
Megalosebus Kolbe.		
	9. u. 10. Fgl. breiter als lang, oder quadratisch	
2.	K. am Hntr. nicht in der Mitte grubig vertieft sondern gerade, Metasternum u. Abdomen tief gefurcht	
	bidenticulatus Kolbe K. am Hntr. in der Mitte tief eingedrückt, nur das Metasternum	
	schmal gefurcht fallaciosus Kolbe	
5.	K. unterseits durch eine breite Furche getrennt, daher von backenartiger Gestalt separabilis Kolbe K. unterseits gewölbt	
4.	K. oberseits am Hntr. gerade, wenig behaarte Art	
	comparabilis Kolbe K. in der Mitte eingedrückt, Behaarung stark . togonicus Kolbe	
	Protosebus Kln.	
	Nur eine Art piceus Kln.	
	Exostenus Kln.	
	Nur eine Art hospiton Kln.	
Opísthenoxys Kln.		
	2. Ri. auf den El. verkürzt, Prot. tief gefurcht, überall lang, zart behaart famulus Kln. 2. Ri. nicht verkürzt, Prot. nicht tief gefurcht, Behaarung kurz oder fehlend	
2.	3. Fgl. am längsten, alle Gl. länger als breit ochraceus Kln. 2. Fgl. am längsten, mittlere Gl. perlig 3	
.5.	K. tief dreieckig eingekerbt, stark beborstet Boettcheri Kln. K. nicht dreieckig eingekerbt, nicht beborstet arrogans Kln.	
	Fortsetjung folgt.	

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1928/29

Band/Volume: 42

Autor(en)/Author(s): Kleine R.

Artikel/Article: Bestimmungstabelle der Brenthidae. (Fortsetzung)

<u>41-42</u>