

Nachtrag.

a) Neue Funde:

1. *Acronycta cuspis* Hb. Von Herrn Hbgr. im Dillinger Wald gefunden 23. VI. - Wiesbaden, R. öfter auf Erlen. Sie kommt auch bei Frankfurt und Selters vor. Rss. - Mainz, die seltene R. auf Erlen, auch bei Weßlar. Rch. - Sp. Taf. 31, Fig. 16.
2. *Agrotis saucia* Hb. Drei Falter am K. - Karlsbrücke Homburg-Kirdorf 6., 15., 22. IX. Hbgr. - Koch erwähnt *saucia* von Wiesbaden. - R. und Falter gefunden Rss. - In 2 Generationen bei Wiesbaden und im Rheingau. Rch. - Sp. Taf. 35, Fig. 12.
3. *Epineuronia popularis* F. 1 St. ans L. Rödelheim VIII. 1930. - Zahlreich am L. VIII Karl-brücke. Hbgr. - Vilbeler Wald. Koch. - Wiesbaden, an Laternen und L. in Häusern. Rss. - Mainz, desgl. an L. Rch. - Sp. Taf. 36, Fig. 6.
4. *Miana ophiogramma* Esp. Am L. Ffm. Stadt. Prior-Lommaßsch. - Wiesbaden, ohne Fundplatz und Sammler. Rss. - Auch bei Mainz selten. Rch. Sp. Taf. 41, Fig. 5.
5. *Celaena matura* Hufn. Ffm. Oberrad L., Sammler Schaeffer, Gewährsmann Lommaßsch. - Wiesbaden, an Heideblüte. Rss. - Mainz am K. Rch. - Sp. Taf. 39, Fig. 18.
6. *Tapinostola fulva* Hb. Am K. 6. IX., Karlsbrücke, an Gras, 14. und 31. VIII, Homburg-Kirdorf. Hbgr. - Wiesbaden, abends an Carex-Arten. Rss. -, bestätigt Rss. - Sp. Taf. 42, Fig. 21.

b) Schriftennachweis:

1. A. Hepp, *Macrolepidopterologica* 1925. Ein Beitrag zur Falterfauna von Frankfurt (Main). E. Z. 40, 1925, p. 305.
 — *Hypa rectilinea* bei Wiesbaden. E. Z. 41, 1927, p. 361.
 — Aus der Großschmetterlingsfauna von Frankfurt (M.). Lepidopt. Rundschau 1, 1927, p. 175.
 — *Heliothis peltigera* bei Frankfurt (Main). E. Z. 42, 1928, p. 187.
2. Dr. A. Rößler, Die Schuppenflügler des Kgl. Regierungsbezirks Wiesbaden. 1881.
3. W. v. Reichenau, Einiges über die Macrolepidopteren unseres Gebiets (Mainz). 1904.
4. G. Koch, Die Schmetterlinge des südwestlichen Deutschlands insbesondere der Umgebung von Frankfurt, Nassau und der hessischen Staaten. 1856.
5. Dr. A. Spuler, Die Schmetterlinge Europas. 1908.
6. Dr. O. Staudinger und Dr. H. Rebel, Katalog der Lepidopteren des paläarktischen Faunengebiets. 1901.
7. Dr. J. Preiß, Die Schmetterlingsfauna des unteren Werratal. 1929.

Kleine Mitteilungen.

Plusia gutta. Ich habe vergangenen Sommer Gelegenheit gehabt, an einer blühenden Buddleia einige *Plusia gutta* (Schafgarben-Höckereule) zu fangen. Die Tropfflecken im Mittelfelde der Vorderflügel sind von herrlichem Silberglanze. Die Tiere kommen von der ersten Dämmerung an bis 10 Uhr abends, dann ist es mit dem Anfluge vorbei.

Es sind gewiß seltene Tiere?

A. Hochreuther, Edenkoben, (Pfalz).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1931/32

Band/Volume: [45](#)

Autor(en)/Author(s): diverse , Hochreuther A.

Artikel/Article: [Nachtrag. Kleine Mitteilungen. 15](#)