

sur les Diptères d'Europe de la tribu Tachinaires (Suite). E. Desmarest: Bulletin entomologique (3e trimestre de 1850). Règlement de la société entomologique nouvellement révisé.

Gegenseitiger Austausch.

C. A. Dohrn.

Wissenschaftliche Mittheilungen.

Epitomatische Uebersicht der Monographie de l'ancien genre *Cis*

des auteurs par M. G. Mellié.

(Annales de la société entomol. de France II. Tom. VI. 1848.)

vom

Seminarlehrer **Strübing** in Erfurt, (Forts.)

2. *Elytris rugulosis, striatis.*

A. Prothorax postice marginatus.

a. 16. Pubescentia aequalis hispidus.

b. Pubescentia in striis.

* Prothorax angulis anticis fere rectis

17. Corpus depressum, pubescentia fere nulla, striis interpunctatis interpunctatus.

18. Corpus oblongum, rugulosum, striis punctatis striatulus.

19. Subtiliter striatus et punctatus flavipes.

20. Novem striis obsolete emarginatus.

** Prothorax angulis posticis late rotundatis.

21. Brunneo-pubescentia comptus.

22. Fusco-testaceus, brevi pubescens . . . quadridens.

B. Prothorax postice immarginatus.

23. Minus convexus, angulis prothoracis leviter rotundatis fuscipes.

24. Angulis prothoracis fere rectis dubius.

25. Proth. quadratus, corpus oblongum, depressum elongatus.

16. *Cis hispidus*. Pkl. Fusco-piceus, subcylindricus, pube brevissima, rigida aequaliter et dense adpersus; antennae pedesque rufotestacei. Prothorax aequalis, antice subsinuatus, lateribus basique marginatus. Elytra subrugosa, obsolete punctata striata. Lg. 0,0025—0,0020 mill.

Anobium micans Kug. p. 331, 7.

Anobium hispidum Pkl. p. 310 f. 1.

Cis hispidus Gyll. 3,380. 3.

Ptinus ruficornis Mrsh. p. 87.

In polyporus in Frankreich gemein. Deutschland. Durch die kurze Pubescenz ausgezeichnet.

17. *C. interpunctatus* Mellié. Nigro-piceus, depressus, elongatus, pube aureata brevissima seriatim adpersus; antennae pedesque ferruginei. Prothorax aequalis, lateribus et anguste basi marginatus, angulis anticis obtuse truncatus. Elytra subrugosa, striata et interpunctata. Maris caput bituberculatum. Lg. 0,0018 mill.

2 Stück aus Bourbon.

18. *C. striatulus* Mellié. Fuscus, subcylindricus, pube brevissima rigida parce et seriatim adpersus; antennae pedesque ferruginei aut testacei. Prothorax aequalis, antice oblique truncatus, lateribus basique marginatus. Elytra subrugosa, punctato-striata. Maris caput bituberculatum. Lg. 0,0020 mill.

Ein Pärchen aus dem südl. Frankreich.

19. *C. flavipes* Lucas. Piceus, subcylindricus pube brevissima, rigida parce et seriatim adpersus, antennae pedesque ferruginei. Prothorax aequalis, depressus, antice oblique truncatus, lateribus basique anguste marginatus. Elytra subrugosa punctulata, striata. Maris caput bituberculatum. Lg. 0,0020 mill.

Bei Nimes und von Lucas in Algier im Winter in den Häusern, auch 2 Stücke aus Texas.

C. pubescens Dej. Cat. p. 335. *C. flavipes* Lucas exp. en Alg. pl. 40. fig. 3. t. 2. 470. No. 1251.

20. *C. emarginatus* Klug. Testaceus subcylindricus, pube brevi, rigida seriatim adpersus. Prothorax aequalis, convexus, antice subrecte truncatus, lateribus basique marginatus. Elytra laeviuscula, punctulato-striata. Lg. 0,0015 mill.

Ein Stück aus Columbien in Reiche's Sammlung, von Klug benannt und herstammend.

21. *C. comptus* Gyll. (4. 655.) Fusco-piceus, oblongus et crassus, pube brevi, rigida, parce et seriatim adpersus, antennae pedesque testacei. Prothorax aequalis, convexus, antice oblique truncatus, lateribus et postice rotundato-ampliatum, his et basi marginatus. Elytra subrugosa, punctato-striata. Maris caput bituberculatum. Lg. 0,0020 mill.

Deutschland, Schweiz, Frankreich, Sicilien, Schweden.

22. *C. quadridens* Chevrier. Fusco-testaceus, nitidus, crassus, pube brevissima, rigida parce et seriatim conspersus

antennae pedesque testacei, maris caput antice reflexum. Prothorax maris antice reflexus et bicornutus, feminae aequalis, antice oblique truncatus, lateribus et angulis posticis rotundato-ampliatis, his et basi marginatus. Elytra subrugosa et laeve punctato-striata. Lg. 0,0020 mill.

Schweiz und Frankreich.

23. *C. fuscipes* Chev. Fusco-piceus, oblongo-convexus, pube brevi, rigida, aureata seriatim adpersus, antennae pedesque ferruginei. Prothorax aequalis, angulis subrotundatis truncatus, lateribus late marginatus. Elytra rugosa, substriato-punctata. Maris caput bituberculatum. Lg. 0,0025 mill.

Boston. Madeira.

24. *C. dubius* Mellié. Nigro-piceus, oblongus, convexus, pube brevissima, rigida seriatim conspersus; antennae pedesque ferruginei. Prothorax aequalis, angulis subrectis, truncatus, lateribus marginatus. Elytra rugosa, substriato-punctulata. Lg. 0,0018 mill.

Neu-Orleans. 2 Stück in der Sammlung von Sallé.

25. *C. elongatulus* Gyll. (4. 627.) Brunneus, lineari-elongatus, subdepressus, pube brevissima, nitida seriatim adpersus. Prothorax aequalis, quadrangulus, lateribus marginatus, subtilissime punctatus. Elytra substriato-punctata. Lg. 0,0015 mill.

Schweden. (Ein schlecht erhaltenes Stück.)

3. *Elytris simplicibus.*

A. Corpore lato, elytris pubescentibus.

a. Prothorace angulis anticis non acutis,

26. angulis anticis obtusis late marginato. . . . fulvipes.

27. angulis anticis fere rectis, corpore, subtiliter punctato fissicornis.

28. ang. ant. rotundatis, corpore punctato. . . . laminatus.

b. Angulis anticis acutis, ad oculos productis.

29. flavus, in disco thoracis macula nigra rhomboidali. granarius.

30. Nigre, elytris ad apicem flavis. grossus.

B. Corpore oblongo

c. Angulis anticis prothoracis acutis, ad oculos productis.

aa. Elytris pubescentibus.

31. Elytris nitidus, breviter pubescentibus, prothorace antice lato bidentatus.

32. Elytris opacis, longius pubescentibus, prothorace antice angusto dentatus.

bb. Elytris glabris.

33. Prothorace lato, antice prominulo nitidus.

d. Angulis anticis prothoracis non acutis.

cc. Elytris glabris.

34. ang. ant. fere rectis, corpore aequaliter punctato brunneus
35. ang. ant. fere rectis, corpore inaequaliter punctato Jacquemartii.
36. ang. ant. obtusis, fere rotundatis, inaequaliter punctatus. glabratus.
37. Subtilissime et vage punctatus. diadematus.
38. Subtiliter, aequaliter et seriatim punctatus, elytris, fere laevibus picens.
39. Niger parvus, elytris vix punctulatis . . . punicatus.
40. Niger. elytris rubris, nitidis, fortius quam thorace punctatis nitidulus.
41. minor, vage et subtiliter punctatus. minutissimus.
42. Crassus, densius et fortius punctatus obesus.
43. Elytris striato-punctatis. lineato-cribratus.
44. Angulis prothoracis fere rectis, satura sub-obsulcata punctatus.

dd. Elytris pubescentibus.

45. Angulis prothoracis rectis, minus pubescens alni.
46. Ang. anterioribus obtusis, posterioribus fere rectis, longius pubescens, oblongus, opacus, subtiliter punctulatus, subrugulosus oblongus.
47. Ang. ant. fere rectis, post., rotundatis, oblongus, fere glaber, dense substriato-punctatus tristis.
48. brevis, subtiliter punctatus, prothorace transverse impresso. punctifer.
49. Elongatus, subcylindricus, longius pubescens, prothorace transverse impresso punctulatus.
50. Convexus, subtiliter punctatus, dense pubescens, proth. transverse impresso sericeus.
51. Capite thoraceque brunneo, elytris brunneo-flavis, angul. proth., rotundatis, punctatus, aureo-pubescens alpinus.
52. Brevis, punctatus, aureo-pubescens, rufus; angulis proth. obtuse rotundatis muriceus.
53. Nitidus, convexus, ovalis, forte punctatus. festivus.
54. Subdepressus, subtiliter punctulatus castaneus.
55. Subelongatus, parallelus, subtiliter, punctulatus fuscatus.
56. Elongatus, vix et vage punctulatus subtilis.

57. Subconvexus, punctulatus, longius pubescens vestitus.
 58. Rufus, antice, angustatus, subtilissime punctulatus. laricinus.
 59. Niger, opacus, aureo-pubescens, subtilissime punctulatus. bicornis.

ee. Elytris seriatim pubescentibus et punctatis.

60. Subtiliter punctulatus creberrimus.
 61. Subtilissime punctulatus. puberulus.
 62. Brevis, convexus, interrupte punctatus . . . convexus.

A. Corpore lato, elytris pubescentibus.

a.

26. *Cis fulvipes* Reiche i. l. Niger, forte convexus, latus, paulo depressus, pube brevi adpersus. Prothorax aequalis, angulis anticis fere acutis, elytraque crebre et forte punctulata. Lg. 0,0020 mill.

Ein Stück aus Bahia in Reiche's Samml.

27. *C. fissicornis* Motsch. i. l. Castaneus, latus, pube brevi aurata adpersus. Caput maris lamina parva fissicornuta ornatum. Prothorax aequalis, latus, convexus, antice angustatus, angulis anticis subrectis, posticis rotundatis. Elytra crebre, concinne punctulata. Lg. 0,0020 mill.

Ein ♂ aus Russland in Polyp. suaveolus von Motschulski gefunden.

28. *C. laminatus* Erichs. i. l. Fusco-piceus, convexus, latus, pube grisea adpersus. Caput maris lamina erecta et quadridentata ornatum. Prothorax aequalis, transversus, angulis rotundatis. Elytra crebre concinneque punctata. Lg. 0,0020 mill.

Bei Toulon von Guerin - Meneville gefunden. Ich besitze Stücke aus der Mark Brandenburg.

b.

29. *C. granarius* Lacord. in l. Flavus, convexus, latus, pube brevi rigida adpersus. Caput nigrum, maris antice quadridentato projectum. Prothorax aequalis, transversus, medio niger maris antice bicornutus, ♀ regulariter arcuatus, angulis anticis acutis, subrectis, posticis rotundatis. Elytra lateribus nigra, vage punctulata. Lg. 9,0035 mill.

Cayenne.

20. *C. grossus* Chevr. i. l. Fusco-niger, dimidia parte elytrorum posterius flava, grossus, latus, pube brevi adpersus. Prothorax aequalis, transversus; angulis anticis acute projectis. Elytra crebre punctulata. Lg. 0,0028 mill.

Ein ♀ aus Demerara in Chevrol. S.

B. Corpore oblongo.

c.

aa.

31. *C. bidentatus* Oliv. Niger, pube brevissima adspersus, subnitidus, elongato convexus. Prothorax aequalis, transversus, maris antice bidentatus, angulis anticis acute prominulis, posticis rotundatis. Elytra creberrime et concinne punctata. Lg. 0,0025 — 0,0018 mill.

Anobium bidentatum Olio. 2. 16. pl. 2. fig. 5.

Ptinus bidentatus Mrsh. p. 86. 17 ♂

— inermis Mrsh. p. 87. 18 ♀

Cis bidentatus Gyll. 3. 383. Curtis vol. 2. F. L. 5.

Schweiz, Frankreich, England auf *Boletus auriculatus* und Weissdorn. Schweden, Deutschland in Bergwäldern.

32. *C. dentatus* Gacogne i. l. Nigro-piceus, convexus, oblongus, pubescens. Prothorax aequalis, ♂ antice protensus et bidentatus, angulis anticis subacutis, posticis, rotundatis, Elytra creberrime et subtiliter punctata. Lg. 0,0022 — 0,0018 mill.

Von Gacogne an der grande Chartreuse gefunden, auch in der Schweiz.

bb.

33. *C. nitidus* Host. Piceus nitidus, convexus, glaber. Prothorax aequalis, crassus angulis anticis acute prominulis, posticis rotundatis, lateribus et postice marginatus. Elytra inaequaliter et vage punctata. Maris caput obsolete bidentatum. Lg 0,0020 mill.

Anobium nitidum Kb. vol. 5. p. 17. 8. f. 45. 8.

Fab. 5. 1. 238. El. 1. 324. 15. Pnz. f. 10. f. 9.

Pkl. p. 311. 10.

Cis nitidus Gyll. 3. 382. Steph. 3. 347.

Schweden, Frankreich, Schweiz, Deutschland.

(Gehört bestimmt zur Gattung *Orophius* Rdtb. Bei Erfurt in Eichenschwämmen nicht selten, Abends umherfliegend.)

d.

cc.

34. *C. brunneus* Mellié. Piceus, nitidus, elongato-convexus, glaber. Prothorax aequalis, angulis anticis subrectis, posticis rotundatis, truncatus, lateribus et postice marginatus. Elytra aequaliter punctata. Lg. 0,0022 mill.

Aus Caraccas, aus einem *Polyporus* von Sallé gesammelt.

35. *C. Jacquemartii* Mellié. Piceus nitidus, oblongiusculus, glaber. Prothorax aequalis, angulis anticis subrectis, truncatus, posticis rotundatis, lateribus et postice marginatus.

Elytra inaequaliter et vage punctulata. ♂ caput absolute bidentatum. Lg. 0,0020 mill.

Aus *Fistulina buglossoides* Bull. bei N. Germain von Jacquemart in Menge gezogen. Steht in der Mitte zwischen *nitidus* und *glabratus* und unterscheidet sich durch den Prothorax.

36. *C. glabratus* dej. (cat. p. 335.) Piceus, nitidus, oblongiusculus, glaber. Prothorax aequalis, angulis anticis obtuse truncatus, posticis rotundatis; lateribus et postice marginatus. Elytra inaequaliter et vage punctulata. Maris caput obsolete bidentatum. Lg. 0,0020 mill.

An der grande Chartreuse von Gacogne gesammelt. Schweiz, Schweden, Piemont.

37. *C. diadematus* Reiche i. l. Testaceus, convexus, subcylindricus, glaber. Prothorax aequalis, angulis anticis subrectis truncatus, lateribus et postice marginatus, subtilissime punctulatus. Elytra vage punctulata. Maris lamina projecta capitis et prothoracis distinctus. Lg. 0,0011 mill.

Ein Pärchen in Reiche's Samml. aus Bahia.

38. *C. piceus* Mellié. Piceus nitidulus, oblongiusculus, glaber. Prothorax aequalis, angulis anticis obtuse truncatus, posticis rotundatis, lateribus et postice marginatus. Elytra aequaliter et creberrime punctulata. Lg. 0,0020 mill.

Ein Stück aus Melly's Samml. aus Peru.

39. *C. punicatus* Mellié. Nigro-piceus, convexus, glaber. Prothorax aequalis, angulis anticis obtuse, posticis rotundatis, truncatus, lateribus et postice marginatus. Elytra subtilissime punctulata, punicata. Lg. 0,0014 mill.

Ein Stück aus Neu-Orleans.

40. *C. nitidulus* Reiche i. l. Caput et prothorax niger; elytra rubra; nitidus, glaber. Prothorax aequalis, angulis fere rotundatis truncatus, lateribus et postice marginatus. Elytra crebre punctulata. Lg. 0,0015 mill.

Aus der Lombardei in Reiche's Sammlung.

41. *C. minutissimus* Mellié. Piceus, convexus, nitidus, glaber. Prothorax aequalis; angulis anticis obtuse, posticis rotundatis truncatus. Elytra vage concinne et subtilissime punctulata. Lg. 0,0008 mill.

Ein Stück aus Boston in Chevrolat's Samml.

42. *C. obesus* Knze. i. l. Piceus nitidulus obesus, complanatus, glaber. Prothorax aequalis, angulis anticis obtuse, posticis rotundatis. Elytra creberrime punctata. Maris caput bituberculatum. Lg. 0,0015 mill.

Nord-Amerika, in Melly's S. ein ♂, in Reiche's ein ♀

43. *C. lineato-cribratus* Chevrier. Fulvo-piceus, nitidus, convexus, glaber. Prothorax aequalis anticis obtuse, posticis rotundatis truncatus, lateribus et postice marginatus. Elytra striato-punctata. Lg. 0,0018 mill.

Von Chevrier in der Schweiz gefunden und benannt; auch am grande Chartereuse in Schwämmen an der Tanne.

44. *C. punctatus* Dej. (cat. 335.) Fusco-piceus, nitidus, subcylindricus, glaber. Os, antennae pedesque dilute ferruginei. Prothorax aequalis, angulis subrectis truncatus, lateribus basique marginatus. Elytra leviter punctata. Lg. 0,0025 mill.

Nord-Amerika. 1 Stück. Dej. S.

dd.

45. *C. alni* Gyll. Nigro-piceus, nitidus; pube brevissima adpersus, Os, antennae pedesque dilute testacei. Prothorax aequalis, angulis subrectis truncatus, lateribus late et basi marginatus. Elytra laevia crebre punctulata. Lg. 0,0030—0,0018 mill.

C. alni Gyll. 3. 386.

C. punctulatus Lucas expl. sc. en Alg. Oliv. pl. 40. fig. 4.

Europa.

46. *C. oblongus* Schw. i. l. Niger, opacus, oblongiusculus; pube brevi micanti adpersus. Antenne pedesque dilute ferruginei. Prothorax aequalis, angulis anticis obtuse et postice subrectis, truncatus, lateribus late basique anguste marginatus. Elytra creberrime subtiliter et vage punctulata. Maris caput bituberculatum. Lg. 0,0020—0,0018 mill.

Frankreich, an gefällten Bäumen im Walde von N. Germain gesammelt. Dem *C. festivus* und *alni* sehr nahe stehend.

47. *C. tristis* Mellié. Nigro-piceus, nitidus, oblongiusculus, pube brevissima adpersus, fere glaber. Antennae pedesque obscure ferruginei. Prothorax aequalis, angulis anticis subrectis truncatus, posticis rotundatis, lateribus et marginatus. Elytra creberrime et confertissime punctulata. Lg. 0,0016 mill.

Ein Stück aus N.-Orleans in Chevrol. S.

48. *C. punctifer* Mellié. Niger, nitidus brevis, pube brevissima adpersus. Prothorax aequalis, lateribus et anguste basi marginatus, ibique transversim costatus. Elytra creberrime punctata. Lg. 0,0018 mill.

Von Chevrier bei Genf gefunden. Von *C. oblongus*, durch kürzere Gestalt, stärkere Punktirung und kürzere Pubescenz verschieden.

49. *C. punctulatus* Gyll. (4. 625.) Fusco-testaceus, elongatus, subcylindricus, longe et dense pubescens. Prothorax aequalis, angulis subrectis truncatus, lateribus et anguste basi margi-

natus, ibique transversim impressus. Elytra confertim punctata. Maris caput subbituberculatum. Lg. 0,0026 mill.

Europa. Von *festivus* durch dickere und längere Pubescenz breitere Form, kürzeres Halsschild verschieden.

50. *C. muriceus* Mellié. Fusco-testaceus, nitidulus, convexus, squamulis aureis adpersus. Prothorax aequalis, angulis obtuse rotundatis truncatus, lateribus et basi marginatus. Elytra punctata. Lg. 0,0015.

Ein Stück in Chevrolat's Samml. vom Kap der guten Hoffnung von Dr. Schaum herstammend.

51. *C. festivus* Pnz. Fusco-testaceus, nitidulus, convexus, ovatulus, dense pubescens. Prothorax aequalis, angulis obtuse truncatus, lateribus late et basi marginatus. Elytra creberrime et vage punctulata, ad suturam obsulcata. Maris caput bituberculatum. Lg. 0,0020 mill.

Anobium festivum Pnz. Ent. 1. 111. 13. fn. 6. 7.

Cis festivus Gyll. 3. 381.

Von Frankreich bis Russland, besonders in Berggegendern. Bei Erfurt einmal auch im Schwamm des Wallnussbaumes.

52. *C. castaneus* Mellié. Castaneus, paulo depressus, pube brevi micanti adpersus. Prothorax aequalis, angulis obtuse truncatus, lateribus et basi marginatus. Elytra creberrime punctulata, in medio ad suturam depressa. Maris caput bituberculatum. Lg. 0,0016 mill.

Bei Paris in Schwämmen der Nussbäume, und in anderen Gegenden Frankreichs, auch in Schwämmen der Kastanie.

53. *C. fuscatus* Mellié. Fuscus, longulus, pube brevissima micanti adpersus. Prothorax aequalis, angulis obtuse truncatus, lateribus et basi marginatus. Elytra creberrime punctulata. Maris caput bituberculatum. Lg. 0,0018 mill.

Aus der Gegend von Bordeaux in *polyporus igniarius* Fries. Durch die Bildung des Halsschildes der Flügeldecken und die Pubescenz von *castaneus* verschieden.

54. *C. subtilis* Mellié. Fuscus, longulus, pube brevissima micanti adpersus. Prothorax aequalis subrotundatis. Elytra subtilissime et vage punctulata. Lg. 0,0015 mill.

Ein Stück in Reiche's Samml. aus N.-Amerika.

55. *C. vestitus* Mellié. Fusco-testaceus convexiusculus, subcylindricus, pube longiore micanti vestitus. Prothorax aequalis, angulis obtuse truncatus, lateribus et basi marginatus. Elytra crebre punctulata. Maris caput bituberculatum. Lg. 0,0015 — 0,0012 mill.

Bei St. Germain im Juli an gefällten Bäumen.

56. *C. laricinus* Reichenb. Fusco-ruber, oblongiusculus antice angustatus, pube brevissima adpersus. Prothorax aequalis, angulis subrotundatis, obtuse truncatus, lateribus et basi anguste marginatus. Elytra creberrime et subtilissime punctulata. Maris caput bituberculatum. Lg. 0,0015 mill.

Deutschland. Frankreich.

57. *C. bicornis* Guillebeau i. l. Niger, opacus, pube brevissima aurea adpersus, antennae pedesque testacei. Prothorax aequalis, maris bicornutus, angulis anticis subrectis, posticis rotundatis, truncatus. Elytra subtilissime punctulata. Lg. 0,0010 mill.

Bei Paris im Mai, bei Lyon an Weiden und in der Schweiz gefunden.

ee.

58. *C. creberrimus* Reiche i. l. Fusco-piceus, elongatus, paulo depressus; pube brevi aurea seriatim adpersus. Prothorax aequalis, antice rectangulus. Elytra laevia, crebre concinneque punctulata. Lg. 0,0018 mill.

Aus N.-Orleans und Luisiana.

59. *C. puberulus* Klug i. l. Fuscus, longulus, paulo depressus, pube brevissima seriatim adpersus. Prothorax aequalis, antice rectangulus. Elytra creberrime concinneque punctulata. Lg. 0,0022 mill.

Ein Stück aus St. Thomas in Reiche's S.

60. *C. convexus* Mellié. Niger nitidus, convexus, pube aurea seriatim adpersus. Prothorax aequalis, angulis anticis obtuse, posticis rotundatis truncatus. Elytra non crebre punctata. Lg. 0,0015 mill.

Ein Stück aus Caraccas, aus dem Hochgebirge in Sallé's Sammlung. (Forts. folgt.)

Beschreibung zwei neuer Arten der Gattung *Aleurodes*

von

J. Fr. Bouché.

Diese, mit Recht von Burmeister zu den Scharlachläusen (*Coccina*) gestellte Gattung ist nur arm an Arten.

Burmeister, in seinem Handbuche der Entomologie Band II. p. 83. stellt nur eine Art *A. chelidonii* Taf. 2. fig. 7 auf, und zweifelt, ob deren noch mehrere existiren.

Ich habe noch die beiden folgenden beobachtet, die im Wesentlichen jener sehr ähnlich sind, aber im specifischen bedeutend

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1851

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Strübing

Artikel/Article: [Epitomatische Uebersicht der Monographie de l'ancien genre Cis 99-108](#)