

10. Die Farbe in zerstreuten Atomen, welche glanzlose kahle Flächen berühren, ist das schwächste Produkt der Farbezeugenden Kräfte.

Es wäre von Interesse, nach diesen Normen zunächst die Mediterran Fauna zu sichten.

Nachträge

zum Käfer-Verzeichniss der Nieder-Elbe.

Von

B. Endrulat in Hamburg.

So mancherlei Mängel das von mir und H. Tessien im vorigen Jahre herausgegebene Verzeichniss der um Hamburg bisher gefundenen Käfer auch haben mag, so hat es in einer Beziehung doch schon unseren Absichten zu entsprechen angefangen. Es ist unleugbar seit seinem Erscheinen namentlich unter den jüngeren hiesigen Entomologen ein grösserer Eifer bemerkbar geworden, der sich natürlich zunächst nur auf die äusserliche Feststellung unsrer Käfer-Fauna erstrecken kann. In Folge dessen sind mir manche Funde mitgetheilt worden, von deren Richtigkeit ich mich überzeugt habe, manche Art ist auch von mir und meinen näheren Freunden neuerdings hier aufgefunden und endlich manche schon früher gefundene mit Sicherheit bestimmt worden. Die in der Februar-Nummer der Zeitung enthaltene Bemerkung unseres verehrten Vereinsmitgliedes Herrn Fr. Boie über *Mesosa*, die eine Beziehung auf unsern Katalog enthielt, veranlasste mich zunächst dazu, ihm mitzutheilen, dass auch hier im verflossenen Hochsommer zwei Exemplare von *Mesosa nebulosa* Fabr. an verschiedenen Orten gefangen sind, und veranlasst mich weiter zur Veröffentlichung sämmtlicher nachträglich hier aufgefundenen Arten, in der Meinung, dass, da ausser unserm Verzeichnisse meines Wissens kein anderer Anhalt für die hiesige Käferfauna vorhanden ist, eine solche Mittheilung nicht ohne einiges Interesse für die Gesamtheit sein möchte.

Nachzutragen sind:

- Amara brunnea* Gyll. (*Acrodon* Zimm.)
- Trechus palpalis* Dej.
- Bembidium nigricolle* Redt. (*Peryphus* Meg.)
- — *lunatum* Dfl. (*Peryphus* Meg.)
- — *ephippium* Marsh. (*Notaphus* Meg.)
- Laccophilus variegatus* Germ.

- Hydroporus bilineatus* Sturm.
Halipus fulvus Fabr.
Megasternum boletophagum Marsh.
Catops anisotomoides Spence.
Seydmaenus collaris M. et K.
 — — *tarsatus* M. et K.
Bryaxis Lefeburei Aubé.
 — — *impressa* Panz.
Bythinus nodicornis Aubé.
Trimium brevipenne Chand.
Euplectus signatus Reich.
Myrmedonia humeralis Grav. Unter Ameisen.
Gymnusa laticollis Er.
Conurus bipustulatus Grav.
Staphylinus chalcocephalus Panz. Unter Kuhmist und Laub.
Ocytus falcifer Nordm.
Philonthus splendidulus Grav.
Bledius dissimilis Er.
Anthophagus abbreviatus Fabr.
Hister 14—*striatus* Gyll.
Saprinus virescens Payk. Ausschliesslich unter trockenem Menschen-
 koth in Sandgegenden.
Abraeus granulum Er.
Brachypterus gravidus Ill.
Carpophilus 4—*signatus* Er.
Eपुरaea silacea Herbst.
 — — *melina* Er.
 — — *pygmaea* Gyll.
Rhizophagus nitidulus Fabr.
 — — *politus* Kelln.
 — — *parvulus* Payk.
Cryptophagus scanicus Linn.
Atomaria pusilla Payk.
Ephistemus dimidiatus Sturm. Im Moose.
Agrilus quercinus Redt.
Microrhagus pygmaeus Fabr. Bei Holzstapeln fliegend gefangen.
Cardiophorus cinereus Herbst.
Diacanthus metallicus Payk. Von *Sorbus aucuparia* Linn.
Cyphon deflexicollis Müll.
Charopus pallipes Oliv.
Hypophloeus linearis Gyl.
Hypulus bifasciatus Fabr. 1 Exemplar an einem morschen mit
 Schwämmen bedeckten Weidenstamm.
Pyrochroa rubens Fabr.
Bruchus variegatus Germ.
Tropideres sepicola Herbst. Auf Eichengebüsch.

- Rhamphus flavicornis* Clairv.
Sitones medicaginis Redt.
 — — *discoideus* Schönh.
 — — *promptus* Schh.
Phyllobius calcaratus Fabr.
Lixus turbatus Schh.
Eirrhinus scirpi Fabr.
Hydronomus alismatis Marsh.
Elleschus scanicus Payk.
Sibynes canus Herbst.
Acalyptus carpini Herbst.
Phytobius granatus Schh.
Orchestes fagi Linn.
 — — *stigma* Germ.
Styphlus setiger Germ.
Baridius chloris Fabr.
Coeliodes rubicundus Payk.
 — — *guttula* Fabr.
Acalles lemur Germ.
Sitophilus oryzae Linn.
Hylurgus ligniperda Fabr.
Bostrichus curvidens Germ.
 — — *chalcographus* Linn.
Pogonocherus ovalis Gyll.
Mesosa nebulosa Fabr.
Stenostola nigripes Fabr. Von jungen Linden und Sahlweiden
 (*Salix caprea* L.)
Oberea pupillata Schh.
 — — *linearis* Linn. Auf Haselsträuchern.
Toxotus meridianus Linn.
Leptura scutellata Fabr. Mehrfach auf Brombeerblüthen, auch
 auf Holzstapeln.
Sphaeroderma testacea Panz.
 — — *cardui* Gyll.
Exochomus auritus Scriba.
Scymnus marginalis Rossi.
Halycia 12-guttata. Pod. (*Vibidia* Muls.) Von Eichen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1855

Band/Volume: [16](#)

Autor(en)/Author(s): Endrulat B.

Artikel/Article: [Nachträge zum Käfer-Verzeichniss der Nieder-Elbe. 185-187](#)