

ein Paar blaue Fleckchen vor der rothen Hinterflügelbinde schwach angedeutet, während dieselben bei allen mir von Zeller aus Italien mitgetheilten Exemplaren, auch bei einem meiner schlesischen Gebirgsexemplare deutlich sichtbar sind. Bedeutende Verdüsterung und Ansatz zu einem Schwänzchen zeigt auch ein bei Bellinzona in Tessin am 8. Juli gefangenes Exemplar, doch bleiben nach Meyer-Dür's Erfahrungen in Verlängerung des Hinterflügelzahnes die Exemplare auch der südlichsten Schweiz weit hinter denen aus Sicilien, Spanien, Kleinasien zurück. Die Mittheilung Zeller's, dass *Phlaeas* von Mitte Februar die ganze wärmere Jahreszeit hindurch überall in Italien sehr gewöhnlich sei, kann ich dahin vervollständigen, dass er bei Palermo wohl kaum zu fliegen aufhört, da ich von dort 13 Exemplare auch aus den Monaten Dezember und Januar erhielt. Diese sind von unserem gewöhnlichen *Phlaeas* in Nichts abweichend.

25. *Thecla Roboris*. Zwei Weibchen bei Granada Mitte Juni gefangen. Sie stimmen mit einander überein bis auf den Umstand, dass auf der Oberseite der Hinterflügel das eine Exemplar am Hinterwinkel drei, am Vorderwinkel einen, das andere nur am Hinterwinkel zwei blaue Randflecke hat. Die Hübnersche Abbildung des Weibchens (tab. 73, fig. 366) hat viel zu spitzige Vorderflügel, auch ist an meinen beiden Exemplaren die blausilberne Randlinie auf der Unterseite der Hinterflügel nicht so zusammenhängend, wie auf jenem Bilde. Von meinen beiden Männchen hat das eine, angeblich aus Frankreich, eben so wie die spanischen Weibchen, eine graue Unterseite, nur etwas dunkler, als diese, das andere aber, unbestimmten Vaterlandes, eine schmutzig gelblich braune.

(Fortsetzung folgt.)

Katalogs - Notizen.

I.

1. *Amara Quenseli*, Heer. muss heißen Schönherr. (Syn. 1. 201. 190.)
2. *Amara communis* Gyll. m. h. Illiger. (Käf. Pr. 163. 34.)
3. *Anisodaetylus binotatus* Dj. m. h. Fabr. (S. El. 1. 193. 126.)
4. *Harpalus hirtipes* Illig. m. h. Panzer (Faun. germ. 38. 5.)
5. *Halipilus obliquus* Gyll. m. h. Fabr. (S. El. 1. 270. 69.)
6. *Gyrinus distinctus* Aubé muss als dunkle Abänderung zu *colymbus* Er. gestellt werden. cf. Ent. Zeit. 1847. 208.
7. *Anisotoma dubia* Illig. m. h. Kugellan. (Schneid. N. Mag. 540. 9.)

8. *Claviger foveolatus*. Preyßler m. h. *C. testaceus* Preyß.
(Ent. Zeit. 1853. 165.)
9. *Dendrophilus punctatus* E. H. m. h. Herbst. (Käfer. IV.
41. 16.)
10. *Meligethes solidus*. Illig. m. h. Kugellan (Schneid. N. Mag.
530. 19.)
11. *Laemophloeus monilis*. Fabr. m. h. *denticulatus* Preyß.
(Ent. Zeit. 1853. 165.)
12. *Cryptophagus bimaculatus* Gyll. m. h. Panzer. (Fauna
germ. 57. 7.)
13. *Atomaria rhenana* Kraatz m. h. *rhenonum* Kraatz.*) (Ent.
Zeit. 1853. 96. 3.)
14. *Atomaria impressa* Märk. m. h. Er. (Käfer Deutschl. III.
389. 19.)
15. *Geotrupes fossor* Walzl und *G. subarmatus* Fairm. sind
identisch cf. Schaum Bericht pro 1848. pag. 54.
16. *Aegialia globosa* Illig. m. h. Kugellan. (Schneid. N. Mag.
514. 31.)
17. *Glaresis rufa* Friv. m. h. *Friwaldskii* Westwood. (Trans.
ent. soc. II. 1852).
18. *Anthaxia Hanaki* Küst. ist identisch mit *senicula* Schrank.
und als solche Varietät der *A. aurulenta*. Fabr., cf.
Schaum Bericht. 52. pag. 70.
19. *Colotes nigripennis* Küster ist zu streichen, da er bereits
zu *Charopus punctatus* Er. als synonym gestellt ist.
20. *Phaleria hemisphaerica* Dj. m. h. Küster (Heft 24.)
21. *Hypophloeus linearis*. Gyll. m. h. Fabr. (El. 559. 4.)
22. *Rhynchites aethiops*. Creutzer. m. h. Bach. (Käfer II.
172. 3.)
23. *Otiorhynchus Chevrolati* Schönherr ist nach Giraud, Ver-
handlungen des zool.-botan. Vereins in Wien I. 133
eine eigene von *picipes* verschiedene Art, daher das
Verbindungszeichen zu streichen.
24. *Otiorhynchus fissicornis*. Walton m. h. *fissirostris* Walt.
(Ent. Zeit. 1848. 350. 16); (neuerdings von Bach als
Caenopsis Bachi Först. beschrieben).
25. *Coeliodes punctulum*. Germar. m. h. Herbst. (Käfer VI.
407. 387.)
26. *Ceuthorhynchus hirtulus*. Schh. m. h. Germar. (ins. spec.
236. 364).
27. *Ceuthorhynchus troglodytes*. Germar m. h. Fabr. (S. E. II.
485. 223).

*) *rhenonum* war Schreibfehler statt *rhenanorum* und ist vom
Autor nachträglich in *rhenana* umgeändert. C. A. D.

28. *Gymnaetron graminis*. Seh. m. h. Gyll. (ins. suec. III. 210. 120.)
29. *Rhyncolus elongatus*. Schönh. m. h. Gyll. (ins. suec. IV. 606. 3—4.)
30. *Doreadion tomentosum*. Küst. m. h. Sturm. (Catalog p. 355 tab. 6. fig. 3.)
31. *Phytoecia graeca* Küst. m. h. Sturm. (ebenda fig. 6.)
32. *Phytoecia flavicans*. Muls. m. h. *flavescens* (Annal. de la soc. roy. agricult. de Lyon VI. pag. 283.)
33. *Chrysomela sanguinolenta* L. und *C. lucidicollis* Küster sind nach Mannerheim Ent. Zeit. 54. 48 identisch.
34. *Chrysomela stachydis*. Suffr. m. h. Gén. (memor. della acad. di Torino XXXIX.)
35. *Apeistus Rondanii*. Motsch. m. h. Villa. (C. eur. dupl. 1833.)
36. *Monotoma picipes*. Payk. m. h. Herbst (Käfer. V. 24. 2. tab. 46. 2.)
37. *Scydmaenus pumilio*. Schaum. *exilis* Chaud. m. h. *pumilio* Schaum. *minutus* Chaud. (cf. Er. Bericht 1845 40. (224.)

II.

Es fehlen im Katalog:

1. *Cymindis fascipennis*. Küst. (Heft 7. 12.)
2. *Cymindis sabulosa* Chaud. Bull. de Mosc. III. Astrachan.
3. *Cymindis cruciata*. Fisch. kommt in Russland vor.
4. *Dyschirius maritimus*. Boh. Kon. Vet. akad. 1849. 198. Gotthland.
5. *Chlaenius terminatus*. Dj. von Radde neuerdings in der Krimm gesammelt.
6. *Sphodrus longicollis*. Fisch. aus dem südlichen Russland
7. *Argutor maritimus*. Gaubil. Frankreich.
8. *Eutroctes moestus*. Küster. (IX. 12.) südöst. Russland.
9. *Daptus Komineckii*. Bielz. Siebenbürgen.
10. *Stenolophus affinis* Bach. Käferfauna I. 380. 16.
11. *Trechus distigma*. Kiesenw. Ann. d. l. Soc. ent. 1849. 388. Pyrenäen.
12. *Bembidium infuscatum*. Schilling.) Arbeiten der Schles.
13. „ *planum* Schilling.) Gesellsch. 1846. S. 86.
14. „ *transsylvanicum*. Bielz. Mitth. d. Herrmanst. Vereins 52. S. 14.
15. „ *bisulcatum* (Leja) Chaud. Bull. Mosc. 1844. Kiesenw.
16. *Lissotarsus canaliculatus*. Chaud. Bull. Mosc. 43. p. 671. Sicilien.

17. zu *Bembidium pygmaeum* fehlt Variet. *bilunatum*. Bielz. Mitth. des Hermanst. Vereins 1852. S. 15.
18. *Cybister lepidus*. Apetz. Küst. Käferf. 24. 34. Dalmatien.
19. *Agabus abdominalis*. Costa. am angeführten Orte. Neapel.
20. *Laccophilus pictus* Küst. Heft 23. 9. Sardinien.
21. *Hyphydrus* (?) *minor*. Costa. am angef. Orte. Neapel.
22. *Hydroporus oblique-striatus*. Bielz. Mitth. d. Herm. Ver. 52. S. 16.
23. *Gyrinus distinctus*. Suffr. *rivularis* Stéven. Ent. Zeitung 1847. 208.
24. *Helophorus nivalis*. Giraud. Miller; Verhandlungen des zool.-bot. Vereins in Wien 1852. S. 92 und 109. österreichische Alpen.
25. *Hydrochus flavipennis*. Küst. Heft 23. Dalmatien.
26. *Ochthebius 4-collis*. Muls. Korsika.
27. *Hydrobius nitidus* Heer. Fauna col. Helv. 485. 8.
28. *Colin spinipes* Haliday. Entomologist 190. Irland.
29. *Catops arenarius* Hampe. Mitth. des Hermanst. Vereins 1852. 140.
30. *Adelops khevenhülleri* Miller. Verhand. des zoologisch-botanischen Vereins in Wien. I. 131.
31. *Ocalea rivularis*. Miller. Ebenda 110.
32. *Aleochara nidicola*. Fairm. Ann. de la soc. ent. de fr. 52. 687.
33. *Pronomaea dalmatina*. Sachse. Ent. Zeit. 1852. 119.
34. *Othius myrmecophilus*. Kiesenw. Ent. Zeit. 1843. 308.
35. *Quedius irideus* Miller. Verhand. des zool.-bot. Vereins in Wien I. 110.
36. *Hister distinctus* Heer. Fauna col. Helv. 455. 7.
37. *Abraeus punctum*. Aubé. Ann. de la soc. ent. de France XI. pag. 231.
38. *Trichopteryx flavicornis*. Maeklin. Bull. Mosc. 1846. IX. 1. Finnland.
39. *Olibrus aenescens* Küst. }
40. " *discoideus* Küst. } Käfer Heft 25. Sardinien.
41. *Meligethes flavicornis*. Miller. }
42. " *lepidii*. Miller. } Verhandl. des zoolog.-
43. " *khevenhülleri* Miller. } botan. Vereins in Wien
44. *Corticus foveicollis* Costa. loco citato. 150. Neapel.
45. *Georyssus bisulcatus* Motsch. Monogr. du genre *Georyssus*. Liefland.
46. *Parnus niveus* Heer. Fauna col. Helv. 467. 4.
47. *Pentodon bispinosus*. Küst. Heft. 24. Sardinien.
48. *Geotrupes subarmatus*. Er. Käfer Deutschlands 727.
49. *Aphodius subalpinus*. Hardy. Ann. nat. hist. XIX. 380. England.

50. *Aphodius uliginosus*. Hardy. Ebenda 328. England.
51. *Lampra decipiens*. Mannerh. Bull. de Mosc. 1852. Nr. 4.
Sarepta.
52. *Coraeus robustus*. Küster. Süd-Russland. }
53. " *parvulus*. Küster. Orenburg. } Heft 23.
54. " *chalybaeus*. Küster. Griechenland. }
55. *Anthaxia lucens*. Küster. Heft 23. Dalmatien.
56. *Cratomerus sitta*. Küster. }
57. " *adoxus*. Küster. } Heft 23. Süd-Russland.
58. *Microrhagus longicornis*. Hampe. Verhandl. des zoolog.-
botan. Vereins. I. 160.
59. *Cratonychus longipennis*. Küst. Heft 14. 25. Siebenbürgen.
60. *Athous Zebei*. Bach. Käfer II. 32. 11.
61. " *picipennis*. Bach. Ebenda 12.
62. *Limonius maritimus*. Curtis. Annal. of nat. hist. V. 278.
England.
63. *Limonius forticornis*. Bach II. 34. 6.
64. *Limonius minuseulus*. Bach II. 35. 9.
65. *Cardiophorus pictus*. Germar. Fauna europae. 23. 6.
Türkei.
66. *Ampedus rufitarsis*. Desvignes. Entomologist 326. England.
67. *Cryptohypnus crux*. Küster. Sardinien.
68. " *4-signatus*. Küster. Südl. Europa.
69. *Cantharis denticollis*. Schummel. Arbeiten des Vereins der
Schlesischen Gesellschaft 43. p. 19. 3.
70. *Cantharis cyanipennis* Bach II. 64. 3.
71. *Cantharis Erichsoni*. Bach II. 68. 26.
72. *Rhagonycha translucida*. Bach. II. 74. 10.
73. " *atricapilla*. Kiesenw. Ent. Zeitung 50. 224.
74. *Malthinus crassicornis*. Macklin. Bull. de Mosc. 1846.
179. Finnland.
75. *Malthinus obscurus*. Bach. II. 74. 10.
76. *Malachius bicornis*. Costa. Annal. d'ell acad. degli aspir.
2. Ser. 1. Neapel.
77. *Ebaeus alpinus*. Giraud. Verhandl. des zool.-botan. Ver-
eins in Wien. I. 131. Gastein.
78. *Charopus nitidus*. Küster. Heft IX. 18. Sardinien.
79. *Dasytes cusanensis*. Costa. loco citato. Neapel.
80. " *communimacula*. Costa. l. c. Neapel.
81. " *calabrus*. Costa, l. c. Calabrien.
82. " *griseus*. Küster. Heft 12. Dalmatien.
83. " *erythromelas*. Küster. } Sicilien.
84. " *coeruleseens*. Küster. } Heft 24. Sardinien.
85. *Ptilinus impressifrons*. Küst. Heft 9. 42. 45. Montenegro.
86. *Xyletinus Redtenbacheri*. Bach. testaceus Redtbch. Bach.
Käfer II. 115. 4.

87. *Pandarus strigosus*. Costa. l. c. Neapel.
 88. *Phaleria acuminata*. Küster. Sardinien. }
 89. „ *oblonga*. Küster. Spanien. } Heft 24.
 90. *Crypticus helvolus*. Küster. Sicilien. }
 91. *Tetratoma pallida*. Curtis. Annal. of nat. histor. V. 221.
 England.
 92. *Cnemeplatia atropos*. Costa. l. c. S. 146. Neapel.
 93. *Helops metallescens*. Küster. Heft 7. 47. Sardinien.
 94. *Omophlus dispar*. Costa. {
 95. „ *tibialis*. Costa. { loco citato. Neapel.
 96. „ *alpinus* Miller. Verh. des zoolog.-botan. Ver-
 eins I. 112 vom Schneeberge.
 97. *Cistela flava*. Küster. }
 98. „ *icteropa* Küster. } Heft 24. Schweiz.
 99. *Mylabris lacera*. Küster. Heft 7. 49. Italien und Dal-
 matien.
 100. „ *decora*. Küster. Heft 24. 85. Türkei.
 101. „ *floralis*. Pallas. In der Krimm von Radde ge-
 sammelt.
 102. *Asclera Blossenvillei*. Guérin. Revue zoolog. pag 93. Sa-
 voyen.
 103. *Tropideres inornatus*. Bach II. 168. 5.
 104. *Rhynchites longirostris*. Bach. II. 175. 13.
 105. *Apion opeticum*. Bach. II. 188. 3.
 106. „ *tumidicolle*. Bach. II. 201. 55.
 107. „ *Schmidti*. Bach. II. 206. 78.
 108. „ *dentirostre*. Gerstäcker. Ent. Zeitung 1854. 236.
 Andalusien.
 109. „ *armatum*. Gerstäcker. Ebenda 237. Nord-Deutsch-
 land.
 110. *Cneorhinus tubericollis*. Fairm. Annal. de la Soc. ent.
 de Fr. 1852. 86.
 111. *Sitones intermedius*. Küst. Heft 9. 66. Ragusa.
 112. *Cleonus Helferri*. Guérin. iconog. du regn. anim. pag. 144.
 Sicilien.
 113. *Cleonus callosus*. Bach. II. 230. 7.
 114. *Liophloeus Brucki*. Bach. II. 236. 7.
 115. *Adexius rudis*. Küst. Heft 24. Steyermark u. Schlesien.
 116. *Phytonomus variegatus*. Bach. II. 254. 28.
 117. *Coenopsis fissirostris* Walton; Bachi. Bach II. 269. 1.
 118. *Otiorynchus rotundatus*. Siebold. Neue Preuss. Pro-
 vinzial-Blätter Bd. III. Heft 6. 1847.
 119. *Otiorynchus subdentatus*. Bach. II. 279. 38.
 120. *Lixus marginemaculatus*. Bach. II. 284. 11.
 121. *Pissodes pygmaeus*, Curtis. Ann. of nat. hist. V. 220.
 England.

122. *Magdalinus heros*. Küster. Türkei. }
 123. " *punctipennis*. Küster. Siebenb. } Heft 24.
 124. " *claviger*. Küster. Sardinien. }
125. *Eirrhinus moestus*. Bach. II. 296. 2.
 126. *Eirrhinus Riehli*. Bach II. 298. 14.
 127. *Bradybatus Kellneri*. Bach. II. 306. 2.
 128. *Anthonomus brunnipennis*. Curtis. Ann. of Nat. hist. V. S. 220. England.
 129. *Myorhinus Brullei*. Guérin. iconogr., 154. Griechenland.
 130. *Coeliodes trifasciatus*. Bach. II. 332. 4.
 131. *Ceuthorhynchus metallinus*. Fairm. Ann. de la soc. de France. 1852. Madrid.
 132. *Acalles plagiato-fasciatus*. Costa. I. c. S. 157. Neapel.
 133. *Nanophyes angustipennis*. Bach. II. 386. 6.
 134. " *stramineus*. Bach. II. 386. 7.
 135. *Rhyncolus pilosus*. Bach. II. 386. 7.
 136. *Hylesinus suturalis*. Redtenbacher. Quaedam genera et spec. col. Aust. 21. 18.
 137. *Eccoptogaster amygdali*. Guérin. Ann. de la soc. ent-de Fr. S. XLIV.
 138. *Hammatochaerus dux*. Falderm. Faun. transc. auch in der Krimm.
 139. *Hammatochaerus nerii*. Küster. Heft 2. 49.
 140. *Clytus barbipes*. Küster. Heft 8. 87. Ungarn u. Siebenbürgen.
 141. *Stenopterus decorus*. Géné. Mem. della R. acad. di Torino XXXIX. Sardinien.
 142. *Molorehus ulmi*. Chevrol, Silbermann. Revue ent, 1838. Paris.
 143. *Astynomus Edmondi*. Fairm. Bull. de la soc. ent. 1852. S. LXIII. Sicilien.
 144. *Dorcadion lusitanicum*. Chevr. Revue zoolog. 1840. 16. Portugal.
 145. " *pusillum*. Küster. Heft 8. 90. Podolien und Griechenland.
 146. " *convexicollis* Küster. }
 147. " *rudum*. Küster. } Heft 24. } Türkei.
 148. " *condensatum* Küster. } Ungarn.
149. *Phytoecia anchusae*. Fuss. Mittheilung. des Hermanst. Vereins 1852. S. 138.
 150. *Pachyta picta*. Macklin. Bull. de Mosc. II. 549. Finnland.
 151. zu *Leptura rufa* Br. fehlt var. *tresignata*. Fairm. Ann. de la soc. ent. 1852. S. 92.
 152. *Grammoptera nigroflava*. Fuss. Mittheil. des Hermanst. Vereins. 1852. S. 75.

153. *Clythra thoracica*. Küster. Heft 5. 99.
 154. *Coptocephala melanocephala*. Küster. Heft 9. 100. Dalmatien.
 155. *Chrysomela melancholica*. Heer. Ueber die obersten Grenzen des thier. Lebens. 17.
 156. *Chrysomela sanguinolenta*. Küster. Suffr. Ent. Zeitung 1854. 48.
 157. *Helodes Suffriani*. Küster. Heft 25. Sardinien.
 158. *Adimonia scutellata*. Chevrol. Rev. zoolog. 1840. S. 17. Portugal.
 159. *Timarcha gallaeciana*. Chevrol. Revue zool. 1840. S. 17. Gallizien.
 160. *Haltica caricis*. Märkel. Ent. Zeit. 1847. 86.
 161. *Argopus discolor*. Bielz. Mittheil. des Hermst. Vereins 1852. S. 16.
 162. *Cassida seladonia*. Gyll. Ins. sues. IV. 644. 3—4.
 163. *Coccinella distincta*. Redtenbacher. Germ. Zeitschrift. V. 129.
 164. *Coccinella agnata*. Rosenh. Beiträge 64. Ungarn.
 165. *Exochomus collaris*. Küster. Heft. 18. 82. Dalmatien.
 166. *Seymnus affinis*. Redtenb. Germ. Zeitsch. V. 124. 12.
 167. „ *flavicollis*. Redtenb. desgl. 13.
 168. „ *bisbisignatus*. Redtenb. desgl. 18.
 169. „ *basalis*. Redtenb. desgl. 125. 18.
 170. *Monotoma bicolor*. Villa. Kunze; Germ. Zeitsch. I. 385.
 171. „ *trapezicollis*. Chaud. Bull. Mosc. II. 209. Kiew.

DR. STEFFAHNY, Putzig.

Bostrichus Alni,

ein neu entdeckter Käfer.

Bei dem jetzigen Stande der Entomologie und den eifrigen entomologischen Bestrebungen so vieler Forstmänner sollte man kaum glauben, dass es möglich wäre, in den Forsten Deutschlands noch einen neuen Borkenkäfer aufzufinden. Trotzdem habe ich Ende August in einem Ellernbruche einen noch nicht beschriebenen *Bostrichus* entdeckt. Derselbe lebt an der Eller und macht bis 5 Zoll lange, etwas geschlängelte Lothgänge. Der Entwicklungszustand war von der kleinsten Larve bis zum reifen Käfer

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1856

Band/Volume: [17](#)

Autor(en)/Author(s): Steffahn

Artikel/Article: [Katalogs-Notizen. 52-59](#)