

## Sparostes africanus,

beschrieben von **J. Putzeys.**

Ater nitidissimus, palpis antennisque brunneis. Clypeus truncatus, lobis lateralibus late rotundatis. Caput in medio anguste et longe foveolatum, utrinque longitudinaliter multistrigosum. Oculi prominuli nec distincte petiolati. Prothorax brevissime transversus, lateribus parallelis, margine antico emarginato, angulis prominulis rotundatis; ante basim rotundatus, supra convexus, antice transversim sulcatus, foveolis basalibus nullis. Elytra elongata, basi truncata humeris subdentatis, apice angustata; punctato-striata, interstitio 3. pone striam 3. trifoveolato; stria praescutellari longa, suturae parallela.

Long. 20 — El. 11. — Lat. 6 Mill.

Au premier aspect, il ressemble beaucoup au Sp. brevicollis. Comme j'ai décrit cette espèce fort longuement (Rév. gén. des Clivin. p. 27) je me bornerai à signaler ici les différences.

Les élytres sont plus rétrécies à l'extrémité; la dent humérale est moins marquée; entre la suture et la première strie, il existe une strie préscutellaire longue et droite; les stries sont un peu moins profondes, plus distinctement ponctuées; on ne distingue que les 3 gros points postérieurs sur le 3. intervalle. Le corselet est moins échancré au bord antérieur qui est longé par un sillon profond où s'arrête le sillon longitudinal; les angles antérieurs sont moins avancés. De chaque côté des yeux, on ne remarque qu'une seule carène, droite, et non terminée par un tubercule en arrière des yeux; ceux-ci sont également saillans, mais plus grands et beaucoup moins enchâssés postérieurement. L'épistome est plus nettement tronqué et ses prolongemens latéraux sont moins avancés, bien moins anguleux et même arrondis: chez le brevicollis, ils dépassent le labre; ici ils sont beaucoup plus courts. La dent du menton est complètement arrondie et les lobes latéraux sont moins tronqués. L'abdomen est plus ponctué; de même que chez le brevicollis, les trois derniers segmens sont longés par une ligne enfoncée, un peu anguleuse vers le milieu. Les trochanters postérieurs sont également atténués à leur extrémité.

Zambèse. 2 ind. communiqués par Mr. Dohrn.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1876

Band/Volume: [37](#)

Autor(en)/Author(s): Putzeys J.

Artikel/Article: [Sparostes africanus, 447](#)