

38. *Raphidia Ophiopsis* Schummel, von Duar.
 39. *Limnophilus digitatus* Schrank, von Rhodus.
 40. *Sericostoma flavicorne* nov. spec. ♂ von Kellenisch.

Nigrum; palpis maxillaribus cochleiformibus, capiti adpressis; occipite thoraceque nigro-hirtis; antennis crassis, flavis, basi obscurioribus; alis anticis densissime obscure cupreo-pilosis; pedibus flavis, femoribus infuscatis.
 Long. corp. cumalis. 6'''.

Dem *S. collare* Pict. nahe verwandt, jedoch schon durch den schwarzhhaarigen Kopf und Thorax von jenem verschieden.

Die Neuroptera der Linnéischen Sammlung.

Mittheilung von Dr. H. Hagen.

Leider mangelt noch für die Neuropteren eine vergleichende Arbeit, welche über die in Linné's Sammlung vorhandenen Typen geeigneten Aufschluss giebt. In den umfassenden Werken von Curtis und Stephens wird nirgends erwähnt, dass jene Sammlung verglichen sei, und ich habe Grund zu vermuthen, dass eine Vergleichung der Linneischen Typen durch jene Herren nicht stattgefunden habe.

Hr. Buchhändler Dr. J. R. Schulz in London hat auf meine Bitte die Güte gehabt, an Ort und Stelle die noch vorhandenen Arten zu notiren. Seiner gefälligen Mittheilung verdanke ich folgende Bemerkungen:

In Linné's eigenem Exemplar der ed. XII. der Syst. naturae sind folgende Arten mit Tinte von Linné unterstrichen und sämmtlich noch vorhanden. Die Etiquetten sind nach dem Ausspruch des Hrn. Richard Hippist, Sekretair der Linnean Society, ebenfalls sicher von Linné's eigener Hand.

Libellula:	Ephemer a:	Myrmeleon
4 - maculata,	nigra,	Libelluloides,
flaveola,		Formicarium,
vulgata,	Phryganea:	Formicalynx,
rubicunda,	bicaudata.	barbarum.
depressa,		
vulgatissima,	Hemerobius:	Panorpa:
cancellata,	pectinicornis,	communis,
aenea,	Perla,	germanica,
juncea,		hyemalis,

forcipata,
Carolina,
variegata,
virgo,
puella,

albus,
Chrysops,
Phalanoides,
hirtus,
lutarius.

Coa.
Raphidia:
ophiopsis,
cornuta.

33 Arten.

Ausserdem sind im selben Buche mit Bleifeder unterstrichen und mit Etiquetten, welche wahrscheinlich vom Käufer der Linné'schen Sammlung, Hrn. Smith herrühren und den gelegentlichen Zusatz: E descriptione Linn. führen, noch folgende 17 Arten vorhanden:

Libellula:	Pdryganea:	Myrmeleon:
fasciata.	nebulosa,	longicornis.
Ephemera:	phalaenoides,	
vulgata,	reticulata,	
marginata,	striata,	
culiciformis,	grisea,	
diptera.	grandis,	
	rhombica,	
	bimaculata,	
	nigra,	
	longicornis,	
	albifrons.	

Es finden sich also von den in der ed. XII. Syst. nat. beschriebenen 83 Arten in der Linnéischen Sammlung 50.

Von den europäischen Libellen fehlt nur *L. grandis*.

Leider konnte ich über die Insecten selbst keine nähere Auskunft erhalten.

E. Eversmann Fauna lepidopter. volgo-uralensis. Casan 1844.

Angezeigt vom Professor **Hering**.

Eine erfreuliche Bereicherung seiner Bibliothek erhielt der entomologische Verein durch das im vorigen Jahr erschienene, in der Ueberschrift bezeichnete Werk des Herrn Professor Dr. Eversmann zu Casan. Es eröffnet den Entomologen des westlichen Europa einen umfassenderen Blick in die Lepidopteren-Fauna des südöstlichen Russlands, als

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1845

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Hagen Hermann August

Artikel/Article: [Die Neuroptera der Linnéischen Sammlung 155-156](#)